







STORIA PRAMMATICA Car. Ruttacle Malus

DELLA MEDICINA

DEL SIG.

CURZIO SPRENGEL

PROFESSOR NELL' UNIVERSITA' D' HALLA

TRADUZIONE DAL TEDESCO

TOMO VL



NAPOLI
PRESSO GENNARO PALMA

1826.

Sales of the sales

And the state of t

.

CONTINUAZIONE

DELLA SEZIONE XV.

SCUOLE DINAMICHE

DEL SECOLO XVIII.

I.

Irritabilità Halleriana.

Enast arrivato finora a comprendere semprepiù, che la cagione degli effetti corporei, ossia la forza fondamentale del corpo non consiste nel meccanismo e molto meno nel mescuglio delle parti. In tale persuasione avuto ricorso parte al principio metafisico dell'anima, parte a quello seminatariale degli spiriti vitali, onde ripetere dall'influenza del medesimo i movimenti del corpo. Il solo Glisson conobbe la necessità di ammettere una forza fondamentale delle fibre, la quale indipendentemente dall'influenza degli spiriti vitali operi la contradizione delle medesime; e Gorter fu d'avviso di non circoscriverla ai muscoli, ma di estenderla a tutte le parti del corpo vivente.

Non erano però ancora note le leggi di cotesta forza, nè stabilite le norme per distinguerla dalla elasticità, o per conoscere il modo di renderla attiva. Non per anco si avevano instituite osservazioni ed esperienze atte a mettere in piena luce il di lei rapporto colle altre forze del corpo; e mancava tuttavia la determinazione della vera sua sede, ed m. appoggio per rilevare la differenza graduale della medesima nelle diverse parti del corpo. A dir breve, la necessità di ammettere una forza a fatta corrispondeva all'intima convinzione che si avea intorno all'attività sempre accidentale della materia. Non si potè però a meno di ritenerla per una qualità occulta, fino a tanto che Alberto d'Haller con innumerevoli esperienze e fondate osservazioni espose in tutto il suo lume gli attributi di ciascuna forza del corpo animale.

2. Haller fin dal 1739. considerò l'irritabilità qual cagion prima del moto muscolare (1), e ripetè la stessa proposizione nel 1743. (2). Dopo il 1747. s'occupò con maggior attenzione a riconoscere le proprietà dell'irritabilità e a distinguerla da qualsisia effetto dei nervi. Nella prima edizione della sua fisiologia che comparve appunto in quell' anno, attribuì a' muscoli tre specie di forza, cioè la morta, la congenita e la nervosa. La prima non differisce punto dalla elasticità delle parti morte e sussiste anche dopo la morte; la seconda non dura che per brevissimo spazio di tempo dopo la morte medesima, e si manifesta specialmente colle oscillazioni alternative e con movimenti più vivaci della semplice elasticità, siccome eccitata non da distensione nè da pressione nè da veruna alterazione meccanica; ma da stimoli; finalmente la terza proviene dai nervi, e mantiene l'irritabilità, la quale,

⁽¹⁾ Comment. ad Boerhaav. paelect. n. 187.

⁽²⁾ Comment. tom. IV. p. 587.

benchè non possa a lungo agire senza l'influenza della forza nervosa, n'è tuttavia essenzialmente diversa.

Nell' anno 1752. Haller espose alla società di Gottinga i risultati di 190 esperienze, per determinare le parti dotate d'irritabilità e forza nervosa (1). Egli nega ogni sensibilità al periostio, al peritoneo, alla pleura, ai legamenti, alle capsule delle articolazioni, alla cornea, al parenchima dei visceri, ai tendini ed alle meningi. Un intestino separato dal corpo, un muscolo reciso è irritabile ma non sensibile ; ed all' opposto sono sensibili ma non îrritabili i nervi, perchè un nervo irritato ed agitante il suo muscolo non appalesa il menomo movimento. Gli è per tal motivo che l'irritabilità non deriva dai nervi , poiche questi non possono dare ciò che non hanno. L'irritabilità rimane per qualche intervallo di tempo nei muscoli anche recisi, e gode una maggiore estensione; dei nervi. La cute, il parenchima, il tessuto gellulare, i tendini, i tegamenti, le arterie e le vene non sono irritabili ; all' incontro questa proprietà è comune a tutti gli organi forniti di fibre muscolari, non meno che all'utero.

3. Haller esaminò specialmente la diversità graduale di questa forza nelle diverse parti. Secondo lui il cuono possiede il massimo grado d'irritabilità e la conserva più a lungo dopo la morte. Il ventricolo posteriore è più irritabile dell' anteriore; ed il sangue è] l'unico stimolo atto a mettere in moto il cuore (2). All'incontro manca

⁽¹⁾ Comment. societ. Goett. tom. II. pa. 114. Mémoires sur la nature sensible et irritable des parties du corps animal, tom. I. Lausanne 1756. 8.

⁽²⁾ Comment. societ. Gotting. tom. I. p. 263.

quasi intieramente di sensibilità, come si deduce anche dagli esperimenti di Bellini, dietro i quali il diaframma s'agita e si contrae, ogni qualvolta si lega o si taglia il nervo frenico, ma non percepisce alcuna sensazione. In alcuni casi assai rari certi muscoli mantengono più a lungo del cuore la loro oscillazione (1); loccliè dee esseré risguardato come un'eccezione alla regola generale, per cui anche tutti gli animali a sangue freddo manifestano coritrazioni spasmodiche più lunghe nel cuore che in qualsisia altro muscolo (2). Al cnor succedono gl'intestini , dipoi il diaframma e gli altri muscoli. Ecco perchè queste parti soggiacciono anche durante il sonno a movimenti alternativi, specialmente se risentano un'azione continua di stimoli; ecco perchè i muscoli volontari non agiscono del continuo, siccome dotati d'un grado minore d'irritabilità e bisognevoli di più forti impulsi della volontà e degli oggetti esteriori per mettersi in attività , laddove ai muscoli involontari basta il concorso degli umori e l'impressione degli stimoli ordinari.

Siceome, dietro l'asserzione d'Haller, l'irritabilità è propria soltanto delle fibre muscolari : rimane da sapersi, in qual composizione o in quai principi delle fibre essa risieda. Per rispondere a questa ricerca, che ci sembra instille, Haller accenna la gelatina, ossia il glutine, dalla di cui combinazione con particelle terrestri risultano le fibre. La gelatina possiede di già una forza morta che si manifesta col tremore. Oltracciò si sa che i zoofiti gelatinosi, come sarebbero i polipi, abbondano talmente d'ir-

⁽¹⁾ Jac. EBERH. ANDREAE de irritabilitate, animali p. 25. Tubing. 1758. 4:

⁽²⁾ Elementa physiologiae, tom. IV. p. 463.

ritabilità che si contraggono secondo Trembley fino alla dodicisima parte della lero l'umghezza. Swammerdam poi sostiene che i muscoli nella loro origine sono composti di pura gelatina, e che tale è pure il cuore del pulciuo, allorquando appunto dimostra la più grande mobilità. Chi animali tanto più ridondano di gelatina , quanto più sono giovani; e proporzionatamente s'accresce la loro irritabilità (1). In appresso, avendo Whytt e Gaubio esposto dei dubbi contro una tale ipotesi , Haller dichiarò indifferente quest'idea sulla sede dell'irritabilità (2).

Nell' uovo materno l' irritabilità dorme, e non si sviluppa che mediante lo stimolo dello sperma maschile. La nutrizione ed il vigore vitale ne promuovono l' incremento, mentre al contrario l'oppio, i rilassanti, e la ceccssiva distensione la estinguono (3).

Haller avea già osservato che certi organi hanno la suscettibilità di alcuni stimoli e, non di altri; d' ondo ri sulta l'idea della icritabilità specifica (4). I diversi gradi di questa proprietà hanno poscia somministrato i fondamenti d'una nuova teoria dei temperamenti. Un grado, leggiero accompagnato da robustezza delle fibre costituisce il sanguigno, e unito a debolezza forma il flemmatico; all'inceptro un grado maggiore di suscettibilità associato all'energia dei muscoli produce il temperamento colerico, Questo però non è che un saggio sulla dottrina dei temperamenti y mentre in ciascun individuo riscontrasi una

⁽¹⁾ Memoires sur les parties sensibles et irritables, p. 79. 80.

⁽²⁾ HALLER. Elem. physiol. to. IV. p. 465.

⁽³⁾ Ivi.

⁽⁴⁾ Ivi p. 466.

speciale combinazione di sensibilità e d'irritabilità. La propagazione dell'irritamento delle fibre da una parte ad un' altra dipende e dalla connessione dei nervi e dal tessuto cellulare.

4. In appresso Haller esaminò attentamente la distinzione dell'irritabilità muscolare dalla forza nervosa. Quest' ultima soggiace intieramente alla volontà, mentre la prima agisce incessantemente. I fenomeni cagionati da un eccitamento della forza nervosa rassomighano agli effetti dell'irritabilità, colla sola differenza che il nervo irritato produce contrazioni più forti e più celeri di quello che si osservano nel muscolo immediatamente affetto da qualche stimolo. Haller riporta poscia un' infinità di esperimenti per descrivere le apparenze di un muscolo irritato, il quale, com' ei si esprime, s'increspa e palpita, s'accorcia e si gonfia, nè s'impallidisce durante la contrazione, come opinarono Swammerdam ed Hamberger, e per dimostrare che i tendini seguono puramente le contrazioni dei muscoli senza risentirle da per se stessi, e mancano d'irritabilità, per cui non riescono mai pericolose le ferite dei medesimi (1). Risguardò pure per insensibile il periostio, rimanendo incerto su quello del cranio, perchò tra sette animali tre manifestarono dolore nella lesione di questa membrana. Negò ogni sensibilità e irritabilità alle capsule articolari (2), e in 14. osservazioni trovò insensibile la dura meninge distruggendo per tal modo le teorie di Baglivo e di Fed. Hoffmann toccanti l'influenza di questa membrana sul consenso delle parti (3). Con altre 16.

⁽¹⁾ Opp. minora, tom. I. p. 333-34e.

⁽²⁾ Ivi p. 340. 345.

⁽³⁾ Ivi p. 345-348.

sperienze riconobbe anche l'iride per non irritabile e mancante del fondamento necessario per la sua contrazione sotto lo su' molo della luce, dipendendo anzi il di lei moto dalla sensazione, perchè l'oppio, che indebolisce tutte le sensazioni, toglie anche all'iride la facoltà di contraersi. Ora codesta sensazione occupa la membrana midollare, di cuiperò non si conosce punto il modo, ond'essa esercita un'
azione sull'iride medesima (1).

5. Haller institul in progresso nuove ricerche per determinare più esattamente l' irritabilità dei vasi. Quantunque le membrane delle arterie contengano delle fibre muscolari; tuttavla i movimenti suscitati dall'applicazione degli stimoli appena si possono percepire, stante l'ostacolo del tessuto cellulare. La somma tenerezza di queste fibre, e la tenuità della sensazione non permettono di attribuire alle arterie una grande irritabilità.; Nel 1760. Haller era d'avviso di non poter ammettere per dimostrato che il sangue affluisca alle parti infiammate mercè l'irritabilità accresciuta, come supponeva Whytt, e che piuttosto l'accumulamento del sangue medesimo dipendeva da un ristringimento delle vene. Non nega però di dover prendere in considerazione la contrazione delle arterie nei fenomeni della derivazione, dove tuttavia agisce puramente la forza morta delle tonache cellulari e la cessazione di qualche resistenza (2). Sostenne altresì contro le obbiezioni di Verschui la sua asserzione relativamente alla tenua irritabilità delle arterie distinguendo amendue le forze fondamentali , cioè la contrattilità morta e l'irritabilità vivente (3). Ma non era in istato di applicare in tutta la

⁽¹⁾ Ivi p. 374.

⁽²⁾ Elem. physiol. tom. II. p. 21.

⁽³⁾ Opp. min. tom. III. p. 279.

sua estensione alla etiologia dell'infiammazione la dottrina dell'irritabilità, essendo ancora troppo ligio all'accennata distinzione, e si limitò a dimostrare, che tale affezione non dipende assolutamente da ostruzione o ristagno (1).

6. Haller essminò poi minutamente e fondatamente l'ipotesi, che regnava ancora in parte a' suoi giorni intorno
al tremore e alla tensione dei nervi. Egli trovò che vi si
oppone la loro natura, essendo piuttosto molli e ben diversi dalle corde tese. E quand' anche i nervi potessero
tremare, i gangli impedirebbero il progresso di tali vibrazioni. In oltre, se durante la sensazione i movimenti tremuli dirigonsi al cervello, sembra che eguali vibrazioni
potessero propagarsi dal cervello agli organi, come acçade in tutte le corde soggette ad oscillazione. Finalmente le
vibrazioni motriei, che dal cervello discendono alle membra, dovrebbero d'fasiire e riflettesi sopra un altro-organo, il che non si osserva.

All'incontro Haller protegge è sostiene l'esistenza del filialo nervoso, ossia degli spiriti vitali. S' attenne quindi alle osservazioni di Leeuwenoechio, d' Hill e di Ledermuller sulla struttura permeabile dei nervi, non che sull'attitudine dei fluidi ai movimenti più celeri, le considerò come il più sicuro fondamento per riconoscere ed appoggiare la realtà di questi umori i più volatili fra tutti quelli del corpo animale (2).

Anche negli ultimi anni della sua vita pubblicò una difesa delle sue scoperte sopra l'irritabilità e sensibilità delle parti contro innumerevoli obbiezioni fattegli da parec-

⁽¹⁾ Elem. physiol. tom. I. p. t.

⁽²⁾ Ivi tom. IV. p. 380.

chi fisiologi (1). Egli continuò a ritenere per insensibili i tendini, specialmente perchè macerati si sciolgono in tessuto cellulare, locchè non si ottiene nei nervi. Oltracciò i primi superano in durezza tutte le altre parti del corpo, e negli uccelli sembrano di natura pressochè ossea. La sensibilità, di cui talvolta manifestano qualche indizio, deesi attribuire unicamente ai filamenti nervosi, che li circondano. Del pari nega qualsisia grado di sensibilità a tutti gli altri organi già da lui dichiarati anche in addietro insensibili, riportandosi per ciò che concerne la dura meninge a Gio. Feder. Lobstein, il quale dimostrò che questa membrana è totalmente priva di nervi (2). Ogni qualvolta in istato di malattia si manifesta dolore nei tendini o legamenti, ciò dipende da un'affezione dei nervi, e nessuna parte può essere sensibile nello stato patologico, quando non sia tale anche nel fisiologico. La famosa operazione eseguita da Gio. Feder. Meckel sopra il celebre Zimmermann gli cagionò i dolori più atroci, avvegnachè non fosse stata tagliata che della cellulare (3), perchè rimasero lacerati o compressi dei filamenti nervosi. Distiugue in oltre esattamente la contrattilità del tessuto cellulare, qual forza d'ordine inferiore, dall'irritabilità, e questa dalla forza nervosa, inferendone la diversità dagli spasmi indolenti, che accompagnano talvolta le malattie, e dall'insensibilità ne' movimenti del corpo animale.

⁽¹⁾ Nov. comment. societ. Gotting. tom. III. p. 1. tom. IV. p. 1.

⁽²⁾ LOBSTEIN, diss. de nervis durae matris. Argent. 1772. 4.

⁽³⁾ MECKEL de morbo hernioso congenito, Berol. 1772. 8.

7. Ecco esposti brevemente i risultati delle ricerche instituite dall'illustre Haller sulle forze foudamentali del corpo. Non si può non attribuirgli il merito d'aver enunciato colla maggier precisione le modificazioni della forza organica nei corpi animali, quantunque amerebbesi, ch'es remo ligio alla sua distinzione si fosse sollevato sopra un punto più stabile e più sublime, ed avesse considerato la contactitià del tessuto cellalare non per una forza morta puramente, mentre è dessa propriamente che distingue il regno organico dall'inorganico. Ora vedremo, ru qual maniera siensi adoprati i contemporanei e successori d'Haller per coltivare la conoscenza di sì importanti forze fondamentali del corpo animale, e per promuoverne l'applicazione alla teoria e alla pratica.

Feler. Winter professore in Francker, e potcia in Leiden, ristabili quasi contemporaneamente all'Islaler l'irritabilità Glissoniana (1). Egli pure, al pari del fisiologo di Berna, risguardò questa forza come l'unica cegione primordiale di tutti i movimenti, ed attribuì all'influenza dei nervi soltanto la facoltà di eccitarii e di renderia attivi, estendendo però la prima a tutto le fibre del corpo animale.

Poco appresso, uno degli uditori di Winter per nome Gio. Lups di Mosca dimostrò ancor più positivamente, che l'irritabilità non dipende punto dall'influenz degli spiriti vitali, e ch'essa appartiene originariamente alla natura delle fibre. F fu quasi il primo a far vedere che, oltre i polipi, anche i vegetabili manifestano dei fenomeni che deconsi unicamente ripetere dall'irritabilità delle loro

⁽¹⁾ De certitudine in medicina practica. Franck-1746. fol.

parti; alludendo specialmente alla celerità, con cui le autere ad ogni contatto emettono il loro polline (1).

Due altri scolari di Winter , Lamberto Bicker (2) , ed Iman Jacopo Van-den-Bos (3), s'accinsero a maggiormente illustrare l'opinione del loro maestro. Il primo definì la natura del corpo umano pel complesso delle forze inerenti al medesimo, e provò che l'irritabilità si distingue evidentemente dalla forza nervosa. I vapori solforici sopprimono la prima, e non distruggono punto la sensibilità, e la legatura dei nervi toglie alle parti quest'ultima', ma non l'irritabilità. Tutte le parti del corpo animale sono dotate d'irritabilità, la di cui attività serve a spiegare il calore animale. Van-den-Bos poi cercò di dimostrare contro l' Haller l' universalità dell' accennata proprietà, rivendicandola specialmente alle arterie; e contraddisse allo stesso relativamente all'insensibilità dei tendini e delle membrane, in cui riscontrò indizi di una debole sì, ma percettibile sensazione.

Dalla scuola di Winter uscì intorno al medesimo argomento un' operetta di Gio. Volfango Manizio, dove si annoverano le diversità naturali dell' irritabilità secondo la maniera di vivere e i temperamenti, e vi sostiene l'indipendenza di questa forza dai nervi. Egli opina, che il freddo stimoli l'irritabilità in egual grado che il ealore; fa vedere come la consuetudine agisca nell'accrescerla o diminuirla; finalmente sostiene, che l'irritarione può sussistere anche dopo rimessa la cagione stimolante, il che

(3) De vivis humani corporis solidis. Leid. 1757. 4.

⁽¹⁾ De irritabilitate. Leid. 1748. 4.

⁽²⁾ De natura hominis, quae medicorum est. Leid. 1757. 4.

realmente riscontrasi riguardo alle potenze esistenti fuori del corpo. Per altro, se tra gli stimoli si aunoverano tutte le potenze, nou eccettuate nemmeno le interno, e le azioni del corpo; non si può assolutamente immaginare alcun eccitamento senza cagione, cioè senza l'attualità d'uno stimolo (i).

S. Gio. Giorgio Zimmermann ripetè l'esperienze di Haller, e ne confermò i risultati (a). Dimostrò oltracciò, che le arterie, le vene ed il condotto toracico possegono egualmente dell'irritabilità. Fece poi vedere, che l'irritabilità dei nervi non deve attribuirsi alle membrane dei medesimi ; le quali sono composte puramente di cellulare, ma alla midolla, e che l'esperimento di Bellini non comprova punto la dipendenza dell'irritabilità medesima dall'influenza dei nervi. Egli riscontrò più abbondante questa proprietà negli animali a sangue freddo, specialmente nel coure e negli intestini tenui. Non osò per altro determinare le cagioni primitive dell'irritabilità, contentandosi di ammetterla non solo negli animali, ma eziandio in diversi vegetabili.

Un altro uditore d'Haller per nome Giorgio Crist. Oeder, che si distinse in seguito come valente botanico, assoggettò quasi contemporaneamente a Zimmermann, la nuova dottrina ad un'attenta e scrupolosa disamina (3). Rilevò egli prima d'ognaltro la legge dell'irritabilità, che

⁽¹⁾ De idiosyncrasia, ex diversa solidorum corporis humani irritabilitate optime dijudicanda. Leid. 1749. 4.

⁽²⁾ Diss. de irritabilitate.. Gotting. 1751. 4. Fabris opuscoli raccolti, v. I. p. 74-125.

⁽³⁾ De irritabilitate; Hafn. 1752. 4. FABBRI opuscoli, vol. III. p. 127-143.

lo stimolo ossia l'irritazione la ésaurisca, ed osservò elle un nervo irritato e svelto dal corpo eccita tuttavia della convutsioni nel suo muscolo. Del rimanente siccome ripone il fondamento dell'irritabilità nell'influenza dei nervi, e non nell'organizzazione delle parti; perciò sostiene che l'esercizio, atteso il consumamento degli spiriti vitali, tende costamemente a diminuirla.

Pictro Castell parimenti scolare di Ilaller cercò di comprovare con nuovi tentativi le esperienze del suo maestro intorno all'insensibilità, dei tendini (1); e trovò che non solo questi, ma anco i legamenti e le capsule articolari non appalesano la menoma sensazione per quanto vengano irritati. Non altrimenti si mostrarono insensibili il periostio, le meningi, la pleura ed il peritoneo.

Contemporaneamente Giorgio Heuermann confermò le asserzioni di Haller relativamente all'insensibilità di certe parti e specialmente del tessuto cellulare (a), derivando tuttavia l'irritabilità specialmente dall'influeuza dei nervi (3). Ma Gugliemo di Magny definì con maggior precisione l'irritabilità medesima per una conseguenza del passaggio delle minime estremità o papille nervose nelle fibre muscolari, ed attribuì alle affecioni di essa l'origine di tutte le malattie (4). Anche Erman Gerardo Oosterdyk Schach, ripelè l'irritabilità dai nervi, convecando però con Haller

⁽¹⁾ Experimenta, quibus varias humani corporis partes sentiendi facultate carere constitit. Gott. 1752. 4.-FABBRI opuscoli, vol. I. p. 125-163.

⁽²⁾ Physiologia, P. III. p. 158.

⁽³⁾ Ivi. p. 114.

⁽⁴⁾ Quaestio medica: An a vasorum aucta aut immi nuta irritabilitate omnis morbus? Paris. 1752. 4.

che i tendini, i legamenti e le membrane non posseggano alcun grado di sensibilità, e che i muscoli durante l'azione non diventino pallidi (1).

9. Il programma dell'accademia delle scienze di Berlino l'anno 1753., sul principio dell'azione dei muscoli, occasionò alcune dissertazioni, delle quali alcune si allontanarono grandemente dalla dottrina d'Haller, ed altre la combatterono. Claudio Nicola le Cat (§. 46.) si sforzò, come ho accennato più sopra, di dimostrare la dipendenza del moto muscolare dal fluido nervoso; avvegnachè accordasse, che anche il sangue debb'essere annoverato fra le cagioni eccitanti del medesimo. È poi d'avviso, che il fluido nervoso sia composto di spirito vitale e di linfa nutriente (2). Dichiarossi avversario d' Haller ammettendo la sensibilità delle membrane e dei tendini (3); confessando nulladimeno che siccome il nervo si distende e forma una larga membrana , la sensazione diventa men percettibile, e che non pochi de'suoi esperimenti fornirono risultati niente diversi da quelli dell'Haller. Porta però in campo le già note e triviali osservazioni di febbri, di manie, di cesalee e di convulsioni cagionate da serite e lesioni della dura meninge, o da ossificazioni e prominenze che occupano od alterano una porzione della medesima (4). Vuole eziandio che il tetano dipenda da infiammazione e suppurazione di questa stessa membrana, asserendo d'a-

⁽¹⁾ De motu musculari Trajecti 1754. 4.

⁽²⁾ Dissertation, qui a remporté le prix etc. p. 35. FABBRI opuscoli raccolti, v. III. P. II. p. 7 p. 117.

⁽³⁾ FABBRI raccolta d'opusculi, suppl. p. 8.-Dissert. sur la sensibilité des meninges, p. 85.

⁽⁴⁾ Dissert. qui a remporté le prix, p. 113. 114.

verne rilevato la prova in diverse sezioni di cadaveri (1). Finalmente riflette, che non si debbono instituire simili estperienze sopra i bruti, le di cui grida rimangono sempre un segno dubbioso della sensibilità delle parti offese, e che quelle verificate negli uomini hanno ripetutamente dimostrato appartenere si fatta proprietà, non solo sile meningi, ma ben anco alla selerotica, al periostio, e a tutte le membrane, del corpo (2).

Un altro aspirante al premio dell'accademia di Berlino considerò il fluido nervoso per unum et idem dell' elettrico. Quest' ultimo si mescola al sangue nei polmoni, quindi passa al cervello, dove si combina colle particelle sulfuree più grossolane inerenti alle fibre nervose ; la qual combinazione appunto costituisce il fludio nervoso, la di eni influenza sui muscoli, ed il moto successivo dei medesimi dipende unicamente da un'azione meccanica (3). Non altrimenti opiuò un terzo anonimo intorno al proposto programma, e contemporaneamente Gerardo Andrea Muller professore a Giessen, pubblicò una teoria della cooperazione dei nervi nel moto muscolare, supponendo una rassomiglianza tra lo sperma ed il fluido nervoso, ed ammettendo in ciascun movimento dei muscoli due forze attive , l' elasticità irritabile attraente, e la facoltà espulsiva, dalle quali è composta la forza nervosa (4). Il movimento tremulo dei nervi dev'essere paragonato al tremo-

⁽¹⁾ Ivi p. 117.

⁽²⁾ Ivi p. 120.

⁽³⁾ Ivi p. 103. e seg.

⁽⁴⁾ Considerazioni sul mado onde concorrono i neroi nelle contrazioni dei muscoli. Francf. sul Meno, 1754. 8.

Tom. VI.

re della gelatina, amzichè alle oscillazioni delle corde tese. Quantunque i muscoli ricevano la loro forza vitale generalmente dai nervi; tuttavia questi non posseggono la forza muscolare, ma un'altra interamente diversa, la quale però soggiace a qualche mutazione, tostochè viene comunicata alle fibre muscolari.

tori all'irritabilità Halleriana, fu Arrigo Fed. Delio professore nell'università di Erlangen (1). Ei combattè specialmente i risultati, che Haller avea dedotti dall'especialmente propose nella fibra morta una capacità niente diversa dal tuono, e possede oltre il carattere della contrazione, anche quello della elasticità. Rigettò poi, ma senza l'appoggio d'alcun esperimento o convicente raziocino, l'ipotesi del fluido nervoso, il quale come tale non è instato di soffrire o di produrre la menoma contrazione, e negò conseguentemente anco l'insensibilità dei tendini e delle membrase.

Urbano Tosetti in difesa die quest'ultimo punto di tecno Ilalleriana; diede alla luce l'una dopo l'altra quattro lettere dirette a Giuseppe Valdambrini, dove accenna i risultati di numerose esperienze ed osservazioni (2). Egli deriva dalle loro tuniche vaginali: la sensazione, che si manifesta nelle lesioni dei tendini. Vi possono in oltre contribuire i filamenti nervosi che scortono lungo i ten-

⁽¹⁾ Animadversiones in doctrinam de irritabilitate, tono, sensatione, et motu corporis humani. Erlang. 1752.
4. — FABBR Opuscoli raggolti, vol. III. p. 53. 73.

⁽²⁾ FABBRI opuscoli raccolti sull'insensitività ed irritabilità Halleriana, vol. I. p. 166-201. 237.

dini medesimi. Concorsero nello stesso parere Riccardo Brocklesby (1) e Toussaint Bordenave (2). Ma la più soda e fondata apologia sull' argomento in quistione ce la fornì in quell' anno medesimo il sig., Leopoldo M. A. Caldani professore di Padova, avendo dimostrato l'insensibilità dei tendini con 83. esperienze, fra le quali soltanto quattro manifestarono indizi di sensazione, forse dipendente dall' intieramente mancarvi gl' involucri esteriori. Egli confermò l'assoluta mancanza di nervi nella dura meninge, negò all' iride fibre muscolari ed ogu' irritabilità, e dimostrò gli errori commessi dagli avversari nell' esperienze, mentre coi tendini tag'iavano sovente e nervi e vasi. Quanto al periostio, scorgesi nel distaccare i membri , ch' esso non è dotato d'alcuna sensibilità , laddove il cervello, malgrado la sua molfezza, si mostra estremamente sensibile (3).

"11. Il più imponente avversario della dottrina Hallerrian di certamente il più volte memotava Roberto Whytt;
el e armi, ord egli combattè l'esperienze e i risultati del
fisiologo di Berna, corrispondevano ai talenti e alla dottrima, che appalesò ne varj rami della scienza medica.
Soprattutto mise in dubbio gli esperimenti instituti negli
animali martirizzati, perchè il dolore cagionato dal taglio
della cute e delle altre parti dee superare incontrastabilmente quello che nasce da un semplice contatto del tendine snudato o della membrana interna; sicchè non mani-

⁽¹⁾ Philosoph. transact. vol. XLIX. P. I. p. 240.-246.

⁽²⁾ Remarques su l'insensibilité de quelques parties. Paris 1756. 12.

⁽³⁾ FABBRI, opuscoli, vol. I. p. 269-337.

festandosi dolore in quest' ultimo caso, non si può tuttavia dedurre una perfetta insensibilità (†). Il toccamento
della cornoa e della conjuntiva cagiona sempre dei dolore,
il quale non può derivare unicamente dai nervi (a). I reni sono incontrastabilmente assai sensibili, come lo dimostrano i dolori calcolosi; nè si possono opporre a tale asserzione gli esperimenti instituiti sopra i bruti (3). Anche
le atterie sono dotate di sensibilità ed irritabilità, poichè
altrimenti non soggiacerebbero, ad inflammazioni (4). Certi
organi che in istato di sanità appena riseutono le impressio il esteriori, si appalesano estremamente sensibili durante una qualche indisposizione (5). Nel panereccio il periotio è oltremodo doletate (6); nell'artritide le articolazioni
vengono tormentate da dolori atrosi (7), come anche la
pleura nella pleuritide (8).

Nemmeno sembra ammissibile, secondo Whytt, lalimitazione, che Haller attribuisce all'irritabilità sopra determinati organi. La cute è evidentemente irritabile, non solo perchà il dattos de testicoli si contrae, ma eziandio perchè tutte le sostanze acri irritano e stimolano la superficie del corpo (9). Whytt nega l'indipendenza dell'irritabilità dalla forta nervea, perchè il cuore mostra poca

⁽¹⁾ WHYTT, opere teoretiche, p. 452.

⁽²⁾ Iri p. 454.(3) Ivi p. 458.

⁽³⁾ Ivi p. 458.

⁽⁴⁾ Ivi p. 461. (5) Ivi p. 463.

⁽⁶⁾ Ivi p. 467.

⁽⁷⁾ Ivi p. 469.

⁽⁸⁾ Ivi p. 473.

⁽⁹⁾ Ivi p. 487.

sensibilità, soltanto allorquando trovasi rivestito de' suoi involucri e stimolato dagli ordinari suoi stimoli (1). Quindi però si contraddice dichiarando quasi insensibili i tendini (2). Siccome i movimenti dei muscoli non cessano per la legatura dei nervi, quindi, s'inferisce, che ogui contrazione non esige un nuovo afflusso di fluido nervoso (3). L'irritabilità non può essere una proprietà della gelatina animale; altrimenti converrebbe attribuire il senso, cioè un'alterazione immateriale, alla materia (4). Gli effetti della prima, ossia dell' irritabilità, non differiscono mai da quelli del secondo (5), cioè del senso.

Carlo Crist. Krause professore in Lipsia proferì un giudizio niente dissimile intorno alla nuovo dottrina (6). Egli derivò ogni movimento dall' influenza dei nervi, fin anche quello che si riscontra nelle parti separate dal tronco. Nè basta che gli animali non gridino, per dichiarare insensibili i tendini e le membrane. Piuttosto i fenomeni delle malattie ci somministrano risultati di maggior couclusione e certezza. Del rimaneute l'irritabilità è una qualità occulta, che non giova a spiegar nulla. Tutte le parti del corpo, non eccettuato le ossa; la cellulare, la midolla , sono sensibili.

12. Di minor pregio ed importanza riuscirono le obbiezioni che parecchi Italiani animati dalla stessa gara si

⁽¹⁾ Ivi p. 491.

⁽²⁾ Ivi p. 495.

⁽³⁾ Ivi p. 496. (4) Ivi p. 513.

⁽⁵⁾ Ivi p. 531.

⁽⁶⁾ Esame della dissertazione del sign. LECAT intorno al moto muscolare. Lispi 1755. 4.

accinsero ad opporre tra il 1755. e il 1757. contro le scoperte dell' Haller. Infra gli altri si distinse Gio. Battista Bianchi (1), il quale sostenne, che il sistema del mentovato fisiologo non era nuovo, e che l'applicazione dello stesso alla medicina potea cagionarvi la più significante confusione. Biasimò inoltre l'esperienze instituite nei bruti, siccome inette a dimostrare le proposte asserzioni, e considerò in vece i sintomi morbosi, dai quali risulta il contrario (2). Qualsisia lesione della dura madre dà origine ai dolori più atroci, e alle più violente convulsioni: la cornea , la conjuntiva , non che il periostio , posseggono evidentemente un non impercettibile grado di sensi. bilità. Nemmeno Haller lo negò propriamente ; ma attribuì quest'effetto ai nervi sparsi sopra le accennate membrane. Anche i nervi e le arterie soggiacciono a convulsioni, e tutto il corpo è irritabile.

Giacinto Bartol. Fabbri si contentò di ammetter riervi nella dura madre e di ritenarla come dotata di sensibilità (3); ma Tommaso Laghi professore di Bologan fece fin anche incidere questi nervi, come ramificazioni del quinto pajo (4). Huber e Vicq d'Azyr li riscontrarono in appresso, ma Lobstein e Soemmering non arrivarono mai a discropriril e a riconoscerli. Laghi opinò tuttavia; che la detta membrana possegga in istato di sanità un tenuissimo grado di sensibilità; è d all'incontro elevatissimo in

⁽¹⁾ N. a Torino 1681.; fu ivi professore, e m. nel 1761.

⁽²⁾ Fabbri, opuscoli raccoli, vol. II. p. 1. vol. III. P. II. p. 81.

⁽³⁾ Ivi vol. I. p. 201.

⁽²⁾ Ivi vol. II. p. 113.

stato di malattia, come si osserva nelle infiammazioni. Riguardo ai tendini, non li trovò sensibili, che toccandoli col ferro rovente (1). Non altrimenti opinarono Gio. Michele Lamberti chirugo in Alessandria e Gaetano Rossi professore di Modena (2).

Domenico Sanseverino di Napoli accorda che gli animali martirizzati non provino una forte sensazione, ove vengano toccati i loro tendini spogliati de'propri involucri; ma vuole, che negli uomini addivenga altrimenti, come si scorge dalle giornalicre osservazioni delle malattie (3) secome il cervello atseso appalesa pochissima seusibilità, quando anche se ne recida qualche considerevole porzione, e tuttavia mon si può negare ai nervi una grandissima essibilità, duopo è che questi la ripetano intieramente dalle meniogi (4). Per altro la contrattilità s'annovera fa le proprietà originarie della materia, e per conseguenza appartiene indistintamente a tutte le parti del corpo (5).

Un anonimo Padre lettore illustrò con molta sodezza e perspicacia quest' ultima proposizione (6). Se l' irritabilità, dic'egli, non fosse una forza originaria della materia, converrebbe assegnarie una speciale a ciascuna parte del corpo, nel qual caso si ritornerebbe alla barbarie del medio evo, quando si ammettevano le qualità occulte per cagioni di tutti gli effetti. All'incontro s'essa è una forza dipendente dagli elementi del corpo, non può essere

⁽¹⁾ Ivi p. 326.

⁽²⁾ Ivi p. 56. 307 2345, vol. III. P. II. p. 97.

⁽³⁾ Ivi p. 70. (4) Ivi p. 73.

⁽⁴⁾ In p. 73.

⁽⁵⁾ Ivi p. 77.

⁽⁶⁾ Ivi vol. I. p. 212.

che generale e comune agli altri esseri, perchè le sostanze primigenie del corpo animale riscontransi pure in tutta quanta la natura.

13. Anna Carlo Lorry sostenne contro l' Haller che l' irritabilità dipende originariamente e riceve il suo mantenimento dai nervi (1), riducendo nello stesso tempo ogni azione del tessuto cellulare e dei nervi medesimi ad irritazione e contrazione (2). Dichiarò poi, che la sensibilità è diversa nelle diverse parti considerevole nella dura madre e nelle tonache interne dei visceri; leggiera all'incontro nelle esterne, non che nelle arterie, nella pleura e nel peritoneo.

Anche Antonio Arrigoni asserì di non poter separare l'irritabilità e la sensibilità l'una dall' altra (3). Volle altreà, che l'azione dei nervi consista in un movimento, avvegnachè non sempre con evidente, qual è quello dei muscoli; e che senza di esso non si possa concepira alcun progresso degli effetti nervosi. Tale fu pure l'opinione di Gio. Battista Fè Milanese (5), di Gius. Bertossi (4), e di un anonimo (6), i quali perè tutti non ci fornirono che inutili declamazioni.

Che in alcuni casi il toccamento o le lesioni di certe

⁽¹⁾ Prof. in Parigi, n. a Crosny presso Parigi 1725.
m. 1783.

⁽²⁾ Recueil périodique d'observat. de mèdecine par VANDERMONDE, tom. V. p. 330. tom, VI. p. 7.-F48BRI, opuscoli raccolti, vol. II. p. 178.

⁽³⁾ FABBRI vol. II. p. 137.

⁽⁴⁾ lei p. 141.

⁽⁵⁾ Ivi vol. III. P. II. p. 105

⁽⁶⁾ Ivi p. 133.

parti non producano dolore, ciò deriva, secondo l'opinione di Domenico Vandelli, dall'attenzione dell'anima ad alcuni oggetti, dall' inquietudine, dal timore degli animali martirizzati, e molto più dalla preponderanza dell'antecedente dolore (1). Il suddetto autore ripetè la sensibilità del tendine d' Achille dai nervi, ch' egli ha fatto anche delineare; su di che però Haller osservò, che tai nervi appartengono alla cute, non al tendine. Finalmente asserì, che il toccamento del periostio, della cornea, dei tendini, e dei legamenti col ferro rovente produce costantemente del dolore. Anche Carlo Michele Lotteri, professore in Torino, tenne dietro alla spiegazione di Vandelli riguardo 'all' apparente insensibilità di alcune parti ; e dalla morbosa sensibilità de' tendini e delle membrane arguit quella che debb' esistere in istato di sanità (2). Concorsero nello stesso sentimento Gaetano Petrioli (3) chirurgo in Roma sotto il nome di dottor fisico, e Giacinto Bartol. Fabbri (4); i quali al pari di Carlo Geille de s. Leger e Luigi Maria Girardo de Villars, quantunque non abbiano potuto giammai riscontrare alcun nervo nelle membrane, tuttavia in vista dei fenomeni morbosi non negarono ad esse un determinato grado di sensibilità (5).

 Uno de' più valenti difensori del nuovo sistema fu certamente Gio. Goffredo Zinn degno e rinomato allievo d' Haller (6). Egli esaminò più attentamente l' involu-

⁽¹⁾ Ivi vol. II. p. 231. vol. III. P. II. p. 79.

⁽²⁾ Ivi vol. II. p. 285.

⁽³⁾ Ivi p. 24q.

⁽⁴⁾ Ivi vol. III. P. II. p. 44.

⁽⁵⁾ Ivi vol. II. p. 202.

⁽⁶⁾ Storia della medic. Sez. XII, §. 161.

ero dei nervi, e lo riconobbe per vero tessuto cellulare; d'onde conchiuse, che la sede della sensazione è la midolla nervosa, e che tutte le membrane non sono irritabili thè sensibili (t). Migliorò pure il risultato dell'esperimento sovente citato di Bellini sul nervo frenico; facendo vedere, che si manifestano le convulsioni nel diaframma, anche quando il nervo viene irritato sotto la legatura. Anche Cesario Pozzi professore di matematica in Firenze (2), e Gio. Francesco Cigna professor di Torino (3), confermano l'esperienze d'Haller intorno alla sensibilità e irritabilità, come prerogative di certe parti. Il secondo indicò nello stesso tempo l'influenza di quest'ultima sulle secrezioni, ed assegnò a ciascun organo del corpo animale un' irritabilità specifica; idea sostenuta parimenti da Gio. Giorgio Roedener (4), che l'attribuì perfino alle parti mancanti di sangue rosso (5). Contemporaneamente Gio. Battista Verna di Torino (6), Orazio Maria Pagant e Camillo Bonioli (7), comprovarono con nuove espe-

⁽¹⁾ Mêm. de l'acad. de Berlin, a 1753. p. 130. L Fabra raccolta, vol. III. P. 1. p. 81. Experimenta circa corpus callosur, cerebellum, duram meningem, Gott. 1749. - Fabra vol. III. P. I. p. 94.

⁽²⁾ FABBRI vol. I. p. 230.

⁽³⁾ Ivi p. 337.

⁽⁴⁾ N. a Strasburgo 1725., fu professore in Gottinga, dove m. nel 7631.

⁽⁵⁾ Nonnulla momenta motus muscularis perlustrata.

Gott. 1755. 4.

⁽⁶⁾ FABBRI vol. III. P. I. p. 143.

⁽⁷⁾ Ivi p. 154.

rienze la dottrina dell'insensibilità dei tendini e delle membrane.

Parimenti Guglielmo Battie medico in Londra non si allontanò punto dai principi d' Haller nel definire la forza fondamentale de' muscoli (1). Egli la distinse dall'elasticità, sostenne la di lei indipendenza dall'influenza dei mervi - e riconobbe il fondamento del moto muscolare . qual forza inerente e propria dei muscoli (2). E quantunque la legatura de nervi tragga seco una paralisi dei muscoli, non si può perciò inferire, che il moto muscolare dipenda immediatamente dalla forza nervosa; come la paralisi nata dalla legatura dell'arteria non prova che il sangue sia l'unica cagione del moto muscolare (3). Se il sangue stagnante contribuisce in parte a paralizzare il muscolo , non altrimenti opererà probabilmente per la legatura dei nervi il ristagno del fluido nervoso (4). Ei trova i movimenti dei muscoli egualmente automatici, come quelli de' corpi celesti (5). Le fibre muscolari non risultano dalle estremità dei nervi, e le arterie non posseggono già una tunica muscolare; ma l'elasticità delle fibre medesime basta a promuovere la circolazione del sangue (6). Meritano d'esser lette nell'opera di Battie le applicazioni della elasticità e irritabilità animale alla teoria delle malattie; e convengono tutte ne' punti principali col mo-

⁽¹⁾ De principiis animalibus, exercitationes XXIV. Lond. 1757. 4,

⁽²⁾ Ivi p. 33.

⁽³⁾ Ivi p. 47.

⁽⁴⁾ Ivi p. 63.

⁽⁵⁾ Ivi p. 108.

⁽⁶⁾ Ivi p. 143, 147.

do di pensare o di ragionare dell'ill. Fed. Hoffmann. 14. Attorno a quest' epoca (1757) Felice Fontana, nativo di Roveredo e professore nell'università di Pisa, cominciò a sottoporre a nuovo esame la dottrina dell'irritabilità, di cui si rendette in seguito benemerito difensore ed illustratore. Annunzia egli in una lettera diretta ad Urbano Tosetti, che Laghi avea quasi abbandonata l'antica sua opinione, o che almeno dubitava grandemente della pretesa sensibilità dei tendini e delle membrane (1). Riporta in segnito le sue proprie esperienze comprovanti la dottrina Halleriana, ed asserisce d'avere sperimentato per dieci volte il ferro ed il fuoco sulla durameninge, anche negli uomini, e convinto per tal modo il Laghi della persetta insensibilità di questa membrana. Fece vedere che i supposti nervi di Laghi non erano che cellulare, che non vale alcuna irritazione dei nervi per destare il moto del cuore, e che il vino, anzichè l'oppio,

come pretendeva Whytt, diminuisce la foraa dei nervi. Investigò poacia le leggi dell'irritabilità, e paragonò i di lei effetti con quelli dell'elasticità (2), la quale continua le sue oscillazioni, quando anche sia stata rimossa la causa distendente, mentre la prima esige per ogni contrazione un nuovo stimolo prodotto sovente dal sangue o da altri umori. Dimostrò in oltre, che ogni eccitamento dell'irritabilità contribuisce a diminuirla, come la quiete a ristabilire l'attività della medesima (3). Del rimanente

⁽¹⁾ HALLER, memoir. sur les parties sensibles et irritables, tom. III. p. 40.

⁽²⁾ Atti dell' accademia delle scienze di Siena, vol. III. p. 209. Siena 1767. fol.

⁽³⁾ Ivi p. 219.

convenne con Haller nel credere, che il fluido nervoso debba essere risguardato come causa eccitante, ossia stimolo esterno, anzichè per un agente immediato e necessario dell'irritabilità (1).

Fontana illustrò viemaggiormente quest'ultima proposizione in un'altra opera classica pubblicata dappoi (2), dove riandò ancor più attentamente i momenti del moto del cuore per niente più tiritabile d'ognaltro organo, colla sola differenza, ch'esso viene stimolato più permanentemente, ed esercita la sua azione più a lungo. E nelle sue ricerche su i veleni animali sostenne, che questi uccidono mediante un subitaneo esaurimento dell' irritabilità (3).

15. Parimente Giovanni van-Geuns tento una veduta più generale delle sforze organiche, poichè fu quasi il primo ad assegnare al tessuto cellulare la forza fondamentale, di cui la potenza mascolare e nervoia sono semplici modificazioni (4). Dimostrò poscia contro l'opinione di Whytt, che l'anima non ha abuna parte immediata nei morimenti vitali. Anche Giorgio Gugl. Benefeld (5), e Giovanni Dav. Grau (6), appoggiarono l'universalità e dientità della forza fondamentale del corpo all'universalità

⁽¹⁾ Ivi p. 226.

⁽²⁾ Ricerche filosofiche sopra la fisica animale. Firenze 1775. 4. trad. da Hebenstrheit. 1785. 8.

⁽³⁾ Ricerche fisiche sopra il veleno della vipera. Lucca 1767. 8.

⁽⁴⁾ De co, quod vitam constituit in corpore animali.

Amstel. 1758. 4.

Amstet. 1758. 4.

(5) De habitu virum motricium corporis humani ad actionem medicamentorum, Gott. 1758. 4.

⁽⁶⁾ De vi vitali specimen primum, Gotting. 1758. 4.

del tessuto cellulare, e alla formazione delle altre parti dal melesimo. Il primo anzi ando tant'oltre, che accordò un certo grado di sensibilità a tutte le parti del corpo. A questa opinione s'avvicinò pure Jac. Valentino Andrea, il quale non separò il senso dal moto, ed attribuì una specie d'irritabilità alla cute, negaudola poi totalmente aitendini, non che alle glandule (1).

16. Intanto sì nella Germania che nella Francia insorscro nuovi oppositori della dottrina Halleriana. Le Cat, e Lorry aveano proceduto con onestà ed esattezza. Ma Gio. Pietro Jausserand ed un certo chirurgo Tandon furono accusati dall' Haller d'avere instituite dell' esperienze non senza spirito di partito (2). Eglino affermarono d'aver trovato sensibili i tendini e le membrane, e tuttavia accordarono, che il parenchima dei visceri irritato meccanicamente appalesa assai di rado alcuna sensazione (3). E G. P. Housset professore di Mompellieri li confutò entrambi (4), e s'occupò specialmente a provare, che le loro esperienze mancavano della dovuta circospezione e diligenza, e che alcune confermano anzi l'insensibilità delle indicate membrane. Della stessa infedeltà fu imputato il Fabbri, il quale annunciò d'aver rinvenuto i nervi della dura madre, e quando Fontana lo pregò d'indicarglieli, cercò pretesti e sutterfug i per giustificarsi (5).

⁽¹⁾ De irritabilitate animali. Tubing. 1758. 4.

⁽²⁾ Haller opera minora, tom. I. p. 454.

⁽³⁾ De irritabilitate et sensibilitate partium corporis humani. Monspell. 1758. 4.

⁽⁴⁾ Dissertation sur les parties sensibles du corps animal. Lausanne 1770. S.

⁽⁵⁾ FABBRI opuscoli raccolti, suppl. p. 7.

Fra i Tedeschi Antonio de Haen (1), fu certamente il più deciso e dichiarato avversario della dottrina Halleriana (2). Senza riportar mai alcuna esperienza in contrario, egli attacca Haller quasi sempre colle autorità. Lo biasima di non assegnar la sede del panereccio ne' tendini e nel periostio, mentre van Swieten non esitò a riconoscerla (3), e dura fatica a comprendere il perchè la dura meninge debba ritenersi per insensibile, dopochè le cefalee derivano per la massima parte da essa, e gli antichi temevano cotanto le lesioni di questa membrana (4). Vuole altresì, che il cuore sia dotato di molta sensibilità, siccome apparisce dalle storie delle malattie, nelle quali sembrò affetto il mentovato viscere (5); e nega, che l'irritabilità costituisca la cagione del suo movimento giacche la contrazione cessa anche durante l'irritazione (6) Altrove poi sostiene, che l'esperienze negli animali riescono fallaci, e che il cuore non si evacua del tutto, talchè ogni nuova contrazione non presuppone un nuovo stimolo (7). Dopo aver ripetuto in altra occasione gli stessi

⁽¹⁾ N. 1711., fu professore in Vienna, ed archiatro imperiale, m. 1776

⁽²⁾ Difficultates circa modernorum systema de sensibilitate et irritabilitate corporis humani. Vienn. 1761: 8.

⁽³⁾ Ivi p. 14.

⁽⁴⁾ Ivi p. 40.

⁽⁵⁾ Ivi p. 70.

⁽⁶⁾ Ivi p. 125.

⁽⁷⁾ Vindiciae difficultatum circa modernorum systema de sensibilitate et irritabilitate corporis apologia. Vienn. 1762. 8.

frivoli argomenti (1), ritornò finalmente in se, e confes, sò i sommi meriti dell'Haller verso la teoria della medicina (2).

Ancora più insignificanti furono le obbiezioni di Gugl. Macneven contro l'insensibilità dei tendini e delle membraue, a vendo egli estesa la sensibilità a tatto il tessuto cellulare. (3). Queste obbiezioni, non che quelle di de Haen vennero conditate almeno in parte da Enr. Nepomuceno Crantz professore nell' università di Vienna (4), il quale attribuì al cuore un'irritabilità diversa da quella degli altri muscoli soggetti alla volontà, dichiarò il movimento di esso dipendente unicamente dal sangue e da altri stimoli consimili, sostenne gli esperimenti instituiti negli animali, e dimostrò contro le Cat., che il predicato di qualità occulta non appartiene all'arritabilità in grado maggiore che alla sensibilità (5).

17. Io trovo in un opuscolo pubblicato attorno a quest' epoca da Gius. Luigi Roger. (θ), una nuova idea, che l'irritabilità contenga in se stessa soltanto la possibilità os-

⁽¹⁾ Rat. med. P. IX. p. 103. 194.

⁽²⁾ Ivi P. XII. p. 263.

⁽³⁾ Specimen experimentorum, quibus constitit, eas partes sensu esse praeditas, quibus Hallerus denegat Prag. 1756 4.

⁽⁴⁾ Solutiones difficultatum circa cordis irritabilitatem. Vienn. 1761. 8.

⁽⁵⁾ Ivi p. 36.

⁽⁶⁾ Specimen physiologicim de perpetua fibrarum muscularium palpitatione, novum phenomenon in corpore humano experimentis detectum et confirmatum. Gott. 1760. 12.

sia la disposizione ai movimenti, e non ne costituisca la cagion sufficiente; pensiero, che ha dato poscia origine ad altre utile e feconde idee. Per altro l'autore s'immagina d'aver fatto un' importantissima scoperta, laddove 'dice che tutte le fibbre muscolari del corpo si trovano iu una continua palpitazione.

. Al conte Gio. Battista dal Covolo di Firenze dobbiamo alcune interessanti osservazioni sull' irritabilità delle: antere e dei filamenti in molti fiori (1). Egli trovò, che di fatto le fibre dei filamenti si accorciano ogni qualvoltavengano irritate, e che questa irritabilità è propria specialmente dei fiori della classe singenesia, e non solamente dei filamenti , ma altresì dei pistilli , come inferì quasi nel tempo stesso Giuseppe Amed Kolventer (2). Intanto Carlo Abr. Gerhard ha somministrato muove ed utili applicazioni dell' irritabilità Halleriana ed alla patologia (3).

Uno de' più valenti disensori d' Haller su eziandio il celebre dott: Tissot di Losanno (4), l'editore appunto delle memorie d' Haller intorno a questo argomento, e il propugnatore dell' insensibilità de' tendini e delle membrane contro de Haen (5). Tale fu pure lo scopo degli espe-

- (1) Discorso dell' irritabilità d'alcuni fiori nuovamente scoperta. Firenze 1764. 8. Comm. Lips. vol. XIII. p. 307.
- (2) Seguito di osservazioni e d'esperienze concernenti alcune specie di piante, p. 125. Lipsia 1766. 8.
- (3) Tria dissertationum physico-medicarum. Berol. 1763. 8.
- (4) Nob. Zimmermanno de morbo nigro, etc. p. 45. Lausann. 1760, 12,
- (5) Lettere a Mr. HIRZEL sur quelques critiques de Mr. de Haen. Lausanne 1762. 12. Tom. VI.

rimenti istiniti da Luca Sichi, chi rurgo di Pisa, sull'irritabilità videl cinicre e sull'insensibilità del tea dine d'Actille (1). Lorenzo Massimi però negò quest'ultima prò posizione, ammettendo egli l'universalità del tessuto celulare e del nervi, non che l'irritazione del concreagionat dai nervi medesimi (2). Anche Gualtiero van-Dogveren cercò di dimostrare la sessibilità dei tendini è della dura madre in certi casi, avvegnache in riguardo all'irritabilità non dissenta dall'Heller, e confessi di non averani osservato alcun. sintoma in conseguenza delle ferite dei tendini stessi e dell'accennata membrana (3).

Il sig. Pietro Moscati professore nell'università d. Pavia avendo esattamente macerato dei tendini. nell'aceto, arrivò a somministrare alla' dottrina Hallerinan una lumosa conferma 'della loro inseusibilità. Egli trovò ch'essi di sciolgeno perfettamente in cellulare, e che le libre tendinose non provengono da assottigliamento graduale delle musconiri, ma piuttosto da una allangamento progressivo e cottinno dell'involucro celluloso dei muscoli (4). Ne riscottrò nei tendini alcana fibra aussociare o nervi ; i quali in generale si conservano più a lumgo e resistano alla putrefazione con maggior forza del tessuto cellulare.

18. Non può a meno di eccitare attenzione e maraviglia la modificazione tentata da Gualtero Virschuir

⁽¹⁾ De irritabilitate et sensibilitate. Pisis 1764. 4. No. (2) Esparienze anatomiche intorno ai nervi. Roma 1766. 4.

⁽³⁾ Esperienze sulla sensibilità ed irritabilità delle parti animali. Lipsia 1767. 4.

⁽⁴⁾ Atti dell'accademia delle scienze di Siena, vol. VI. p. 233. e seg. di con record dell'

intorno all'irritabilità Halleriana generale e particola re (1). Haller assegnato avea al cuore un'irritabilità preponderante ed un dominio speciale sopra tutta la citcolazione, negando, per conseguenza alle arterie qualsisia forza vitale, e considerandole pressoechè stromenti morti dell'impeto del cuore. Ora Verschuir s'accinse per la prima volta a dimostrare con diversi esperimenti la grande influenza, che la forza vitale delle avterie esercita, sulla circolazione del sangue, mostrando in ciò tanta sodezza e ragionevolezza, che il suo libro può essere risguardato come un vero capo d'opera. Lo stesso Haller rimase convinto degli argomenti di Verschuir; e perciò non solo proferisce un giudizio assai favorevole sulla di lui opera (2), ma dice anco 'espressamente, che le arterie maggiori gli sembrano formare generalmente un canale muscoloso continuato (3).

Haller però avea qualche tempo innenzi asserito di amurettere l'irritabilità delle arterie negli animali a sangue caldo (4). Ma Verschuir fece vedere, che anche i vasi di quelli a sangue freddo', perfino dopo reciso il cuore, posseggono un emínente grado d'irritabilità (5), e che l'azione delle arterie continua malgrado l'inerzia del cuore, e in istato di malattia riceve un aumento dagli stimóli locali. Codesta irritabilità vascolare spiega felicemente le

⁽¹⁾ Dissert inaugur de arteriarum et venarum vi irritabili ejusque in vasis axcessu, et inde oriunda san guinis directione abnormi. Groning. 1766.

⁽²⁾ De corporis humani fabrica, tom. III. p. 140.
(3) Ivi tom. VI. p. 81.

⁽⁴⁾ Opp. minora, vol. I. p. 379.

⁽⁵⁾ L. c. p. 82.

congestioni e i movimenti irregulari degli umori (1), some l'esperienza non-lascia luogo a dubbi sull'ineguaglianza del polto uelle diverse arterie del medesimo corpo ammalto (2).

Ecco il fondamento d'una nuova teoria delle febbri, la quale, tranne alcune modificazioni, non diversifica punto dalla Hoffmannian. Ogni febbre è preceduta da una contrazione spasmodica delle arterie cutaine, attesa l'accresciuta irritabilità del cuore e delle arterie maggiori, atternando tra loro il freddo ed il calore (3). Le conì dette intermittenti larvate sono affezioni piuttosto locali, e dipendono da uno spasmo partiale; nè si è fatta riflessione, che in queste febbri auche l'organismo manifesta una generale passività (4). Antonio Fracassani medico Veronese pubblicò contemporaneamente un'altra teoria delle febri affatto simile a quella di Verschuir. (5) Questi riscontò soveute anche uelle vene un soramo grado d'irritabilità che si appalesa con un movimento vermiforme, come nelle arterie (6).

Pictro Antonio Fabre professor Parigino dichiarossi ançor più positivamente intorno all'irritabilità dei vasi (7). Ammaestrato da osservazioni microscopiche nelle vene, ei

⁽¹⁾ Ivi p. 36:

⁽²⁾ Ivi p. 43.

⁽³⁾ Ivi p. 59.

⁽⁴⁾ Ivi p. 63.

⁽⁵⁾ Tractatus theoretico-practicus de febribus, ed altera. Veron. 1766. 4.

 ⁽⁶⁾ L. c. p. 91.
 (7) Essais sur différens points de physiologie, de pa-

⁽⁷⁾ Essais sur différens points de physiologie, de pathologie et de thérapeutique. Paris 1770, 8.

riflette assai giustamente, che il sangue ne conì detti vasi capillari muovesi in tutte le direzioni (in avanti nelle vecane, e indietto nelle arterie) come in un riflusso, soi seque punto le leggi della circolazione (i). Egli è per questo moto nelle più piccole ramificazioni vascolari, che il ristagno del sangue nei tronchi maggiori non ne impedisee gran fatto la circolazione, e che si può risguardare per un semplice effetto d'immagiuszione il condensamento degli umori ne minimi vasellini (a). Nella stessa guisa i fluidi muovonsi nel tessuto cellulare; e la forza, che preside a tai "movimenti, è e videntemente l' irritabilità. Questa proprietà appartiene non solo ai vasi, ma altreà a tutte le parti del corpo composte originariamente di tessuto cellulare (3).

Fabre ha fatto delle eccellenti applicazioni di queite sue ricerche alla spiegazione e couoscenza di diverse malattie. Egli confuta primieramente la teoria meccanica dell'infiammazione, secondo la quale la ostruzione de minimi vasellini n'è il fondamento, e prova, che l'jirritabilità accresciuta dei vasi costituisce la vera cagione
dell'indicata affecione, dimodochà essa non cessa sennonchè togliendo a, rimovendo gli istimolt. (4). La sua
teoria delle febbri corrisponde a queste idee, ma tuttavia riesce meno soddisfacente di quella delle infiammationi (5).

⁽¹⁾ L. c. p. 72.

⁽a) Ivi p. 74.

⁽³⁾ Ivi p. 77. 23. e seg

⁽⁴⁾ L. c. p. 115.

⁽⁵⁾ Ivi p. 407.

19. Parimenti Crist. Luigi Heffmanu cercò di dimostrare l'irritabilità de' minimi vasellini, mediante l'azione di sostanza carie e stimolanti (1). Egli osservò, che quando le arterie di un arto paralizzato non manifestano polso, il cuore non può assolutamente bastare a spingare il sangue nelle arterie, e one lo tesso oppio indebolisce la forza delle medesime. Anal quanto più sottili sono esse, tanto più s'accresce', secondo l'autore, la loro irritabilità.

In seguito comparvero in iscena Crist. Kramp (2), ed Eur. van-der-Bosch (3) per difendere l' Pirritabilità de de Iur. van-der-Bosch (3) per difendere l' Pirritabilità de minimi vasellini. Il primo adottò l'espressione di forza vitale per dinotare la forza organica universale, la quale compete in grado eminente alle arterie; perchè altrinenti a circolazione incontrerebbe troppi ostacoli, come. sarebbero il pesò dell' atmosfera, la tenapiù del sangue, le anastomosi e le frizioni. La velòcità poi si diminuisee, tostocchè il sangue entra in uno spazio maggiore. Non dovieva però l' autore distinguere nuovamente l' riritabilità dalla forza vitale negando alle arterie la prima ed accordando alle stesse in vece la seconda. Van-der-Bosch s' occupò specialmente in determinare l' riritabilità accresciata dei vasi capillari per cagion primitiva delle infianmazioni, delle congestioni e di molte aftre malattie.

Codeste asserzioni erano in aperta opposizione a quel-

⁽¹⁾ Della sensibilità ed irritabilità delle parti. Munstes

⁽²⁾ Diatribe de vi vitali arteriarum. Argentor. 1786. 8.

⁽³⁾ Riflessioni teoretiche e pratiche sulla potenza muscolare de vasi capillari. Munster 1786. 8.

le di Lazaro Spallauzani (a), di Nic. Jadelot (a) e di, Arthaud (3). Il prima derivò il moto oscillaterio, che naediante il micrascopio apparisce ne nitonimi, vascilladall'ansietà degli raimalai martirizzati; ed estese il doninio del cuòre alle vene più piecolo, perche, legando Daorta, cessa qualsiasi movimento delle medesime. Arthaud, poi nego alle, arterie le fibre muscolati, e per consegueriza anco ogni irritabilità.

20. L'applicazione del sistema Halleriano alla teoria dell'infiammazione riusci quanto facile altrettanto giovevole, e contribuì a bandire a peco a poco le antiche ipotesi dell'ostruzione. In ciò fu quasi il primo fra Tedeschi Crist. Luigi Hofiniana si quale din dal 1758, a scouse a combattere fondamente la itaccia il portinazione, riportando intto alle stimplo era i filosoo impedito del sangue, per le vene (4). La nuova spiegazione venne esposia ciuco-stanzistamente da Danc Mangenise (5), cui sembro (dietto l'essante dei sintoni estenziali y delle cagioni e conseguenze dell'infiammazione, non che del di lei trattamento) ch'essa tragga originar non da ossuvizione, ma da interima capita sontina conseguenze dell'infiammazione dell'infiammazione conseguenze dell'infia

⁽¹⁾ Dell'azione del cuore ne vasi sanguigni nuove osservazione, Modena 1763. 8.

osservazione, nioacna 1700. 6.

(2) Memoir sur la cause de la pulsation des artères.

Nancy 1771. 8.

⁽³⁾ Diss. sur la dilatation des artères et sur la sensibilité. Paris 1771: 81-1177.

⁽⁴⁾ Miscellanea d'opere mediche, P. L. p. St. Meu-

⁽⁵⁾ The doctrine of inflammation of founded upon reason and experiences. London 1768. 8 rad. Gouinga. 1776. 8.

ritazione del vasi. Agli stessi principi s'attenne G. M. Gaten hof professore nell'università d'Heidelberge (1), avvegnacche non esoluda interamente dalle infiammazioni una: certa tenacità e viscosità degli amori. E Gio. Battista Borsieri de Kanilfed fu il primo tra i moderni ad'applicare. con maggior esattezza e precisione l'irritabilità Halleriana alla teoria delle infiammazioni (2).

II. er einer ille e einer gefellen maren eine Hie

Had in a contract

.... Nuove teorie intorno ai nervi.

21. L'accordo della forza nervosa coll'irritabiltà Halleriana, e la dipendenza d'entrambe l'una dall'altra, furono dopo la metà del passato secolo un soggetto di continua ricerche, e conseguentemente un mezzo; cen cui si ar; rivò a meglio riconoscere la pote za fondamentale del corpo animale; quantunque dall'altro lato si considerasse troppo parzialmente l'attività del sistema nervoso, qual hase di tutte le funzioni del corpo, co facti del corpo,

Il primo, che abbia osato battere questo sentiero, fu Gio. Augusto Unzer, medico e filosofo perspicace e sommamente erudito. Senza rendersi ligio alla dottrina di Stahl, egli appalesò già per tempo la sua propensione a ripetere i moti corporei da forze nervose immateriali (3);

⁽¹⁾ GATTENHOF et ODENTHAL diss. quae inflammationis rationem. exhibet. Heidelb. 1793. - GATTENHOF et WENDT de inflammat. caussis etc. ib. 1775 4.

⁽²⁾ Institutiones medicinae practicae , vol. I. p. 32. Lipsiae 1787 8. miles i serve

⁽³⁾ Magazzino d' Amburgo , vol. X. p. 400.

e quivi fondò in seguito la sta fisiologia (1). Non si paò dimostrare, che tutti gli stimoli dei uervi vengono propagati fino all' anima; e perciò i movimenti animali non sono effetti dell'anima, a vvegnachè si debbauo derivare dalla forta nervea. Parecchi di questi stimoli, mentre si sollevano verso il cervello, ricevono una contraria direzione, e per tal modo si perdono attorno i. nervi medesimi, senza produre nell'anima alcuna sensazione o consapevolezza. Ciò accade specialmente con tutti gli stimoli nervosi naturali degli organi animali; cia souno dei qualti arreca da se indipendentemente dal cervello o dall'anima, un'impressione nei nervi e muscoli, e vi cecita dei movimenti, dond'emergono le attitudini e e sensazioni.

col meizo-di a fatta ipotesi Unizer addita il come un semovente, senza essere animato, aver possa moto e mobilità animale ed apparentemente aneo volontaria. Sir danno adunque diverse specie di animali meno perfettamente organizzati, che non sono animati. Quindi fa vedere, come succedano negli animali animati, e per couseguenza anco nel corpo umano, dei movimenti senza saputa dell'anima; e "specialmente come possano suscitarsi dopo morte, mediante lo stimolo, e continuare per qualche spazio di tempo, non solo ne muscoli animali, ma altren nei volontari. Codeste capacità costituiscono l' essenza della vera natura animale, e si combinano talvolta colle azioni dell'anima. Sicchè la nuova teoria non fu per quanto sembra che una modificazione dell' Hal-

⁽¹⁾ Primi sondamenti d'una fisiologia della natura propriumente animale. Lips. 1771. 8.

eriana, applicata a tutte le parti del corpo e fornita della denominazione di forza nervosa.

22. Malgrado i numerosi ed esatti esperimenti, coi quali il fisiologo di Berna domostrato avea l'indipendenza dell' irritabilità dalla forza nervosa, pare che sempre pila si sentisse la necessità di ammettere una potenza fondamentale sublime ed universale, cui fosse subordinata l' irritabilità , qual forza tutta propria delle fibre muscolari. Indi è , che infra gli altri Fil. Ambr. Marherr sostenne , che i nervi contribuiscono assolutamente al moto del cuore, e che questo diventa languido, ogui qualvolta vangono legati i primi (1). Crist. Everardo de Lille determinò la situazione di que' nervi, che dan moto al cuore tra le due grandi arterie, ed asserì parimenti, che una forte pressione sui nervi del cuore basta ad impedire qualsisia agitazione del medesimo (2). Fece perdere molta influenza alla forza del euore, attribuendo alle arterie un'irritabilità preponderante, atta a promuovere la circolazione del sangue; ed opino che il cervello, non il cuore, è il primo mobile nel corpo (3), ...

Anche Francesco Saverio Caspare Trzebiezhy portò in campo opposte esperienze per confutare d'indipendenza della forza del cuore dal esistena nervoso (4). Siccome Haller non potè accelerare il moto del cuore colla sola

⁽¹⁾ Praelectiones in BOERHAAVII institutiones medicas, tom. II. pag. 140. Vienn. 1772. 8.

⁽²⁾ Tract. de palpitatione cordis. Zwoll. 1755. 8.

⁽³⁾ Physiologicarum animadversionum secundum ordinem element, physiolog. Haller. Francker 1772. 4.

⁽⁴⁾ De irritabilitate et sensibilitate partium corporishumani. Præg. 1772. S.

irritazione del nervo della voce; egli crede, che ciò sia addiventto, perchè l'operazione fu eseguita troppo tardi, o perchè non si è colpito il vero nervo. Un cuore reciso continua a muoversi, perchè conserva ancora della forza nervosa, come si osserva lo stesso fenomeno ne' muscoli volontarj. Le fibre nervee s' insinuano finalmente per entro ai muscoli, è li reudono irritabili.

Jacopo Fed. Iscaflanna, scrittor elassico e professore in Erlaugen, considerò sotto lo stesso punto di vista l'irritabili mascolare, ritenendola come effetto della foria nervosa, dalla cui influenza non giudicò escuti nemmeno i tendini; perchè dotati assolutamente di qualche grado si sensibilià (1).

23. Con si fatte ricerche si gittarono le fondamenta della così detta etorica dei nervi, che andò diffondendosi dall' Irlandis ed bla Sociali, e trovbapoi nella Germania non pochi seguanti. Econoc la base. Tutti i finomeni della vita, in ispezialtà i movimenti dei solidi ed il mescupio dei fluidi, dipendono dalla forsa nervosa: per consequenza tutti gli eggetti esterni agenti sull'organismo producono inutazioni e diversi stati nei nervi; e tutte le mantici, le quali sembrano originate da corruzione degli umori, dipendono priamente da discordanze del sistema nervoso: finalmente le sostame medicamento de escrettano un'azione sui solidi dotati di forza nervosa, anziche sui finidi. Si scorge apertamente, che questa teoria è desunta in grau patte dal sistema Hoffmanniano, prechè anche il professore Hallense riattrafeiò nelle coal dette parti nervo-

⁽¹⁾ Saggio d'alcune riflessioni pratiche intorno ai nervi. Erlangm 1774. 8. Saggio d'alcune riflessioni pratiche sui muscoli. Ivi 1778. 8.

se il fondamento della maggior parte delle malattie, ammettendo tuttavia il concorso degli umori, e rappresentandoci le afferioni delle parti nervose in una maniera del tutto meccanica; cioè quasi movimenti irregolari riferibili a due specie, la prima di tensione, e la seconda di rilassatezza. La nuova teoria de nervi negò la possibilità delle malattie umorali, e determinò la deviazioni originarie della forta nervosa per dissonanze e mutazioni di senso; oppure, avuto riguardo nello stesso tempo all' irritabilità Halleriana, ne considerò le alterazioni per nuova sorgiente di fenomeni morbosi.

24. Guglielmo Callen professore in Edimburgo fu il primo, per quanto a me pare, che coll'applicazione dei principi d' Hoffmann alle move teorie, abbia foudato un vero sistema del solido vivo (solidum vivum) il Nella prefazione ai suoi Elementi di medicina pratica ei dice espressamente, che essendo stato educato nella scuola Boerhaaviana non cominciò che tardi a conoscerne gli errori, fra i quali uno de più madornali, si e quello di calcolar troppo le alterazioni ipotetiche e fors'anche ignote degli umori, e di considerare le malattie dei solidi unicamente come difetti fisici. Ond'è, che velle piuttosto adattarsi al sistema Hoffmanniano, e seguendo il sentiero dell'induzione, perfezionare possibilmente la teoria senza ricadere in nuove ipotesi.

Nella teoria delle febbri Cullen non esita a stabilire per massima fondamentale, che quasi tutte le cause febprili agiscano debilitando (1). A dir vero non si durera fatica a spiegare il modo, con cui le cause debilitanti

⁽¹⁾ Cullens first. lines of te practice of physic, vol. I. p. 32. Edimb. 1784. 8.

producono il freddo; ma non si comprenderà l'origine di tutti gli sintomi, se non mediante la legge universale della natura, per cui gli agenti nocevoli alla vita suscitano delle reazioni nell'organismo, ossia le così dette forze medicatrici della natura. Già da lungo tempo si avea ammesso, che il calore annoverar si debba fra i movimenti della natura medicatrice; ma ch'esso vi produca in parte anche i brividi febbrili, Cullen osa sostenerlo a dirittura, perchè questi diventano possibili soltanto mediante il calore, il quale sta d'ordinario in proporzione dei brividi precedenti (1). Durante l'accession fredda, uno spasmo generale occupa la superficie esteriore, di tutto il corpo, il che dà un nuovo stimolo all'attività del cuore e delle arterie. Pereiò questo spasmo è una parte dei consti della natura; ma l'atonia della superficie corporea, originata dalle cause febbrili , dura comunemente per tutto il corso della malattia (2).

Cullen s' avvede già, che questi principi non hanno molta connessione fra di essi, e che à fatta teoria non può riuscire del tutto soddisfacente. Laoude per sostenere la supposta atonia della cute, porta in campo dei fatti; gi quali dimostrano la debolerza dello stomaco - ed i, tutti gi organi digerenti. Ora siacome questi ultimi hanno un consenso col, sistema cutanoo, sembrava verosimile ch'esso in egual modo ne resterà affetto (3). Ma accordando anche i fatti, che somministrano un appoggio all'enunciato consenso, dovremo tuttavia ritenere come troppo limitata l'ipotesi, qualora, si voglia riptere le febbri unicamente

⁽¹⁾ Ivi p. 35.

⁽²⁾ Ivi p. 36. 37.

⁽³⁾ Ivi p. 40-43.

dall'atonia cutanea. Cullen va più oltre, cattribuisce l'origine di quest'ultima ad una diminuzione di energia nel cervello accompagnata da una specie di mania ; idea strana, dietro cui converrebbe supporre, che i deliri febbrili e la debolezza delle azioni dell'anima si manifestino nelle febbri più frequentemente e più presto di quello che si riscontri nelle osservazioni. E come mai poteva Cullen asserire, che le cause febbrili agiscano sedativamente o diminuiscano l'energia del cervello, mentre si danno innu-. merevoli febbri prodotte evidentemente da potenze stimofanti o dal più forte eccitamento del cervello? Nel qual caso però sembra disposto ad ammettere un aumento di tono nei vasi, ma altresì dello spasmo, siccome originato da atonia (1). Questo spasmo dura tanto più a lungo, quanto è più intenso il tono dei vasi o indebolita la reazione generale.

Quindi Cullen distingue le febbri in ragione dell'energia o dell'inerzia della reasione, dando alle prime il nome di sinoca, alle altre quello di tifo; limitando tale distinzione alle febbri continne, quanturque avesse potuto ridurre sotto la medesima elasse e divisione anche le intermittenti. Ne' climi di Scozia il più ordinerio tipo delle febbri continue sembra consistete in una precisa combinazione degli accennati due generi; e perciò fu determinato un genere inisto, dandoglisi il nome particolare di sinoco, persuaso che questo risulti dalle stesse cause del tifo (2).

24. Il tifo assume diverse forme, ed agisce in un modo affatto particolore sopra parecchi organi. Infra le altre

⁽¹⁾ lei p. 64.

⁽²⁾ Ivi p. 69. 70.

ella è pure un'accidentalità, quando è accompagnato da sevrabbondanza di bile, e quindi emerge una febbre bificas, la quale non è una specie, ma soltanto una varietà riferibile in parte anche alla sezione delle intermittenti (1). Nella stessa guias si combina talvolta uno stato o tendenza di corrazione riguardo ai fluidi in molte febbri, specialmente nel tifo, nel sinoco e nelle intermittenti, di maniera che la febbre putrida non può essere distinta dalle altre (2). Finalmente, nemmeno la febbre consuntiva costituisce una specie a parte, e sembra piuttosto un sintoma di un'affezione locale, e seguatamente della suppurazione di'un organo.

Tra le cause febbrili Cullen considera il freddo in parte come sedativo, in parte come eccitante a misura che agiuec con maggiore o mirore violenta. Ne dessi trasandare la virtà astringente del freddo medesimo, per cui diventa una potenza tonica (3). Generalmente favorisce i giorni critici; e rilette assai giustamente, che quindi dipende principalmente il tipo delle febbri; ma non può tuttavia persuadersi della verità dei singoli giorni critici, perchè non contempla nè calcola l'avanzamento o la remuissione del tipo (4).

Nella cura delle febbri Cullen pone ogni studio ed attenzione per evitare le evacuazioni e specialmente le addominali (5). Beusi apprezza grandemente l'uso dei toni-

⁽¹⁾ Ivi p. 71.

⁽²⁾ Ioi p. 73.

⁽³⁾ Ivi d. 94.

⁽⁴⁾ Ivi p. 118. 119.

⁽⁵⁾ Ivi p. 145.

ci e degli stimolanti, nominatamente della china e del vino (1).

25. La definizione dell'inflammazione data da Cullen no diversifica punto da quella di Magoniae e di altri. Ei confuta l'ipotesi Boerhaaviana, e considera soltanto lo simolo, ed il concorso quindi secresciuto degli umori (2); confessando tuttavia, che nello stesso tempo conviene amettere uno spasmo nelle minime arterie, onde risulti viemmaggiore l'incitamento del sangue, come si scorge apertamente nele reumatismo, e in cui è fondata propriamente anche la diatesi flogistica (3). Applica poi questi stessi principi al reumatismo, il quale non proviene nè da acrimonia nè da condensamento degli umori; na dallo spasmo delle fibre musocari, e dalla velocità accresciuta del sangue. Sì fatta affezione delle fibre musocolari spiega abbastanza i sintomi spasmodici che accompargano il reumatismo (4).

La teoria Culleniana della podagra è divenuta assai famosa, perchè si oppone a tutte le altre spiegazioni anteriori, colloca i siutomi della malattia sotto un miglior punto di vista e si applica con successo al metodo curativo. Confuta di poi l'esistenza d'una materia artiritea o podagrosa singolare, negando di averne gianmai riscontrato alcun vestigio negli umori, adducendo le contraddizioni sparse intoino alle qualità della medesima, sostemendo che l'indole ereditaria della malattia non può conformarvisi, e finalmente facendo vedere, chi essa non

⁽¹⁾ Ivi p. 192 193,

⁽²⁾ Ivi p. 216.

⁽³⁾ Ivi p. 223.

⁽⁴⁾ Ivi vol. II. p. 26. 27.

esercita la menoma influenza sul trattamento. Benà: la risguarda per una malattia universale tendente ad attaccare specialmente il sistema nervoso, e fondata nell'atonia degli organi digerenti, d'onde risultano reazioni periodiche, le quali occasionano le congestioni nelle articolazioni (1). Di fatto quest'è una teoria, che almeno soddista più di tutte quelle immaginate dai patologi umorali intorno alla stessa malattia.

Cullen trascurò l'etiologia di diverse altre malattie, e non di rado. s'alloutanò dal suo sistema. Per esempio trattando delle scrofole, indica precisamente un'acrimonia speciale dipendente da una singolare costituzione del s'stema liofatico (2).

26. Cullen nel suo tratato di materia medica suppone nei medicamenti un modo di agire niente diverso da
quello esposto nel sistema Hoffmanniano. Tutto ciò che
esercita una qualche azione sul corpo, agisse primieramente sulle parti sensibili dei irritabili, ed eccita un movimento del sistema nervoso. Noi non conosciamo la natura della maieria posta in moto dall' azione 'di sostanze
straniere, un apossiamo tuttavia apporte il nome di principio vitale' (3). Le cose esterne sembrano avere minore influcuza sugli umori, e le nostre cognizioni sullo stato degli umori son troppo ristrette, perchè si possa dire alcunchè con fondamento intorno a questo proposito (4). Cullen s' immagina un fluido nervoso estremamente elastico ed
intimamente unito alla sostanza midollare, il di cuj mo-

⁽¹⁾ Ivi p. 77-86.

⁽²⁾ Ioi vol. IV. p. 372.

⁽³⁾ Cullen, materia medica, p. 26.

⁽⁴⁾ Ivi p. 30.

Tom. VI.

vimento è tanto più celere, quanto è maggiore l'elasticità dei nervi (1). Dà poi una strana spiegazione dell'aumento di sensibilità ni istato di maggior debolezza. Il cervello, dic'egli, trovasi allora incapace a sostenere la dovuta densità e grossezza nell' estremità nervose; per lo chè s'accresce l'elasticità del fluido nervoso, e se ne accelerano le oscillazioni (2). Attribuisce al mentovato viscere una forza motrice, che col mezzo dei nervi si pregga à tutti i muscoli, anche senza l'intervento di precedente sensazione e volontà, e che viene da lui denominata irritabilità del sensorio. Il vigore del corpo dipenata dell'energia di questa irritabilità, e i temperamenti vengono facilmente determinati dalla diversa proporzione di essa rispettivamente alla densità ed elasticità del fluido nervoso.

Pressochè tutti i medicamenti agiscono dapprima sul ventricolo, indi da esso mediante una simpatia o consenso, e per conseguenza in un modo dinamico, non materiale, sopra le altre parti del corpo. Alcuni però producono anche nell'accennato viscere un'alterazione Iocale, che consiste nella decomposizione del succo gastrico (3).

Quanto ai singoli medicamenti, Cullen ne tratta secondo che agiscono o sul solido semplice, o sugli organi forniti di forza vitale, ovvero sugli umori, dove l'azione non è immediata, siccome fondata originariamente sopra un'alterazione dei solidi. La china attacca a dirittura il sistema nervoso, nè importa nelle intermittenti predisporre all'uso della medesima l'economia animale (4). I nar-

⁽¹⁾ Ivi p. 35.

⁽²⁾ Ivi p. 36.

⁽³⁾ Ivi p. 48. 49.

⁽⁴⁾ Ivi p. 242.

cotici indeholiscono l'attività del corpo, e quando appariscono stimolanti, non è ciò die un effetto dei conati saltarai della natura (1). Se Cullen ponora mente daddovero a questa asserzione, non avrebbe potuto a meno di accorgersi della contraddizione da sò incorsa nel negare all'oppio una virità stimolante, e nell'assegnargli di poi una facoltà di sollecitare gli sforzi salatari della natura, ossia quella resistenza e conseguente attività, onde l'animale economia è disposta ad opporsi ad ogni applicazionee che tende a nuocerla. Egli annovera fra i sedativi perfino la canfora (2).

Deriva la maggior parte delle affezioni convulsive da maneanza od alterazione di cnergia nel cervello, perlochio gli antispasmodici debbono agire principalmente su questo viscere (3). Cullen dimentica i suoi principi, dove tratta degli attenuanti, dei risolventi e di altre classi di medicamenti, riportandosi molto alla sua autrazione elettica (4), formando degli antisettici una classe speciale, e ripetendo l'azione dei sali mercuriali dall'affinità loro verso l'ammonicae (5).

Chiero dunque apparisce, che il sistema di Cullen si scosta assai poco da quello di Hoffmann, e che il primo ha certamente gli stessi, od anche dei maggiori difetti del secondo.

27. Un sentiero niente diverso fu battuto da Davide Macbride professor di Dublino, il di cui sistema non dif-

⁽¹⁾ Ivi p. 340. (2) Ivi p. 396.

⁽²⁾ Ivi p. 396. (3) Ivi p. 438.

⁽⁴⁾ Ivi p. 458.

⁽⁵⁾ Ivi p. 503.

ferisce da quello di Cullen, se non in quanto ch'egli calcola ancor più le mutazioni immateriali della forza nervosa e l'influenza dell'anima. I movimenti vitali succedono senza partecipazione della nostra coscienza, perchè l'anima vi è assneffatta fino dall'infanzia (1). Il corpo non è una semplice macchina, ma uno stromento, di. ui l'anima si serve, come di un violino il suonatore (2). Macbride giudica inutili le ricerche chimiche delle materie morbose, ed all'incontro necessaria la determinazione del grado nelle forze del corpo. Non deriva mai l'in fiammazione da ristagno, ma dallo stimolo, e dalla oscillazione accresciuta dei minimi vasellini (3). Sostiene ancora la virtà stimolante del freddo, ed accenna fin anche le particelle frigorifere dell' aria (4).

/ Tra i fondatori di questa nuova teoria dei nervi conviene annoverare criandio Jacopo Gregory professore d'Edimburgo. Quantunque egli non consideri le fibre muscolari per una propaggine delle nervee, tuttavia suppene tanto evidente la relazione tra muscoli e nervi, che crede di dover comprendere tutto il solido vivo sotto la denominazione di genere nervoso. Ma non determina, se i. nervi oscillino come corde, ovvero se il fluido contenutovi, forse in parte d'indole eterca, regoli tutte le funzioni (5). Sotto questo punto di vista distingue la viva-

⁽¹⁾ A methodical introduction to the theory and practice of physic, vol. 1. p. 30. Lond. 1772. 4. trad. Lipsia 1773. 8. p. 51.

⁽²⁾ Trad. p. 26. 30.

⁽³⁾ Ivi p. 250.

⁽⁴⁾ Ivi p. 234.

⁽⁵⁾ Conspectus medicinae theoreticae in usum academicum, vol. I. p. 57 Edimb. 1782. 8.

cità dall'energia delle azioni; distinzione posta oggidì nella sua vera luce dalla conoscenza dei due fattori dell'eccitabilità. L'aumento della prima consiste nel far succdere a stimoli leggieri le sensazioni e i movimenti più forti; stato che dipende dalle evacuazioni degli umori, dall'inerzia, e dalla giovinezza, anzichè dall'uso dei cibi nutrienti o da soverchia ripienezza dei vasi (1). Pel rimanente segue i principi di Fed. Hoffmann nel ripetere dal consenso l'origine e la spiegazione di parecchi fenomeni morbosi (2).

Gregory rigetta le acrimonie come cause di malattie; e quantunque accordi, che il corpo tenda alla eorrazione, nega tuttavia che possa essa verificarsi, perchè le continue secrezioni ed escrezioni l'arrestano, o la impediscono (3). Espone alcune sue riflessioni e dubbiezze sulla facoltà sedativa di alcuni medicamenti, senza decidere, se questi esercitino in origine un'azione stimulatio (4).

a8. Fra i moderni teoristi merita certamente un lungo distinto Samuele Musgrave, il quale cercò in un suo
opuscolo di derivare tutte le malattie da affezioni del sistema nervoso (5). Dimostrò altren l'importante influcuza
dell'attività nervea sul moto del guore o sulla circolazione del sangue; appoggiato specialmente all' azione delle
vene, che si manifesta nell'erezione del pene, non che

⁽¹⁾ Ivi p. 197.

⁽²⁾ Ivi p. 190. (3) Ivi p. 270.

⁽⁴⁾ Ivi vol. II. p. 350.

⁽⁵⁾ Speculations and conjectures on the qualitaties of the nerves. Lond. 1776. 8.

nel rossore e nella pallidezza del corpo. Confutò poscia l'opinione di coloro che ripetono il calore animale da un movimento interno del sangue, e dall'attrito de' globetti sanguigni; e lo deriva unicamente dai nervi, perchè riscontrasi nello stato delle passioni e dei dolori, e perchè i brividi presuppongono un'affezione nervosa, a cui attribuisce l'origine dell'idrope, segnatamente dello spasmodico o vago, e di molte altre malattie o putride o contagiose. Dedusse dagli esempi e dalle osservazioni, che i nervi mantengono il mescuglio degli umori, e che le loro lesioni od alterazioni producono la decomposizione dei medesimi. Finalmente sostenne, che tutti i medicamenti agiscono sul sistema nervoso, come apparisce singolarmente dalle piccole loro dosi, le quali appalesano una speciale attività, e le quali non possono effettuare immediatamente alcuna mutazione nelle rispettive combinazioni o mescolanze dei fluidi.

Non altrineuti opinò de la Roche nella sua operasulle funzioni del sistema nervoso (1). Egli arguisce l'importanza dell' attività nervea sopra tutte le parti del corpo specialmente dalla possanza delle passioni, ed attribuisce l'origine delle congestioni, dei tumori glaudulosi, e delle corruzioni umorali ai vizi della forza nervosa (2). Il principio vitale possiede una facoltà antizimica ed antisettica, per cui la puttefazione uno può estendersi nel corpo vivente (3). Le fibre muscolari non sono evidente-

⁽¹⁾ Analyse des fonctiones du système nerveux, tom.
1. 2. Genéve 1778. 8.

⁽²⁾ Ivi tom. I. p. 10-17.

⁽³⁾ Ivi p. 26.

mente propaggini dei nervi : nulladimeno de la Roche è d'avviso di comprendere tanto i muscoli quanto i nervi sotto la denominazione di genere nervoso , specialmente perchè ai può facilmente provare , che la forza muscolare e la nervosa obbediscono alle stesse leggi e sono di una medesima natura (1). Distingue poi al pari di Gregory la mobilità dall'intensione della forza vitale ; la prima eresce , quando scema la seconda ; quella viene eccitata dagli simolanti, l'altra dai tonici (2). Per altro egli ammette nei nervi l'esistenza d'un fluido etereo simile al-l'elettrico ; il di cui movimento contribuisce a generare il calore animale (3).

29. Dopo gli accennati scrittori la Germania ne fornè parecchi altri di non minore ingegno e riputazione.
Fra questi si distinse primieramente Alberto Thaer, primo medico in Zelle coll' eccellente sua dissertazione inaugurale (4). Egli stabili per principio fondamentale l'uniondiari su di esso la sua teoria delle febbri ed uno soltiarimento del consenso. Fa dunque consistere la febbre in
un eccitamento dei nervi degli organi vitali', e nel successivo aumento dell' irritabilità del cuore e delle arterie (5). Rillette poi giustamente dietro Baglivio, che la
cosà detta crudtà nelle febbri non è altro che una con-

⁽¹⁾ Ivi p. 235.

⁽²⁾ Ivi p. 254. 258.

⁽³⁾ Ivi tom. II. p. 293. 314.

⁽⁴⁾ De actione systematis nervosi in febribus. Gots.

⁽⁵⁾ Ivi p. 30.

trazione spasmodica ed irregolare, e che la coazione sta propriamente in una remissione dello spasmo (1).

Anche Cristoforo Federico Elsner, professore nell'università di Regiomonte, preparò una nuova e più corretta teoria delle febbri. Secondo lui la natura della febbre è una mutazione universale ed ineguale dell'irritabilità sollecitata il più delle volte da cause materiali, sena che agiscano costantemente o queste o gli stimoli immediati sui vasi e nervi (2). Sembra tuttavia, che la sede delle febbri, e che la differenza della materia ne modifichi o diversifichi il carattere. Quindi Elsner risguarda come persuadente e ragionevole l'opinion di Galeno, che derivo la terzana dalla bile, la quotidiana dalla piùta, la quartana dalla rische la quotidiana dalla piùta, la quartana dalla site al quotidiana dalla piùta, di difficiali di l'irritabilià (4).

Vent'anni addictro sembrò tanto generale ed evidente l'origine della felbère e dell'infianmazione dalle alterazioni morbose dell'irritabilità, che venne amnessa perfino ne compeudj più usuali di medicita pratica. Massimiliano Stoll, il quale certamente non si fece d'altronde conoscere come patologo solidare, asserisce ciò non ostante, ne suoi aforismi, che la febbre dipende da un cecitamento e rinforzo dell'irritabilità del cuore e delle arterie (5), ossia da un'alterazione di tutta la so-

⁽¹⁾ Ivi p. 87.

⁽²⁾ Supplement alla dottrina delle febbri, fasc. I.p. 17.

⁽³⁾ Ivi p. 62.

⁽⁴⁾ Ivi p. 75.

⁽⁵⁾ Aphorismi de cognosc, et curandis febribus , §.7. 8. 9. Vienn. 1786. 8.

sostanza solida, anziche d'alcun flatido. Cristof. Goffr. Selle, quantunque assai lontano dall'attribuire in patologia cotanta influenza ai solidi, oltrethè nemico in generale di ogni teoria, confessò tuttavolta, che la causa formale della febbre deve necessariamente constare in una particolare condizione del sistema nervoso (1).

30. Gio. Ulderico Amedeo Schaeffer medico di Ratisbona si rendette assai benemerito della teoria dei nervi ,
avendo instituito delle esperienze, che racchiudono i fondamenti più favorevoli della medesima (2). Opinò anche
egli , come Musgrave, che il calore animale sia il risultato dell' attività nervea, da cui debba altrea dipendere
il mescuglio degli umori. Dimostrò in seguito minutamente e fondatamente, che le febbri non provengono da corruziofte degli umori , nè da ostruzione dei vasi ; e dall' influenza delle passioni sullo stato degli umori argomentò l' azione, che può sui medesimi esercitare la forza
nervosa.

Secondo lui ogni malattia è una conseguenza d'un' irritazione pretrnaturale del sistema nervoso; e la febbre masce, ogni qualvolta vengano attaccate le parti più suscettive. La cozione costituisce il periodo del rilassamento, e la crudità quello dell'irritazione. L'evacuazioni critiche non bastano propriamente a decidere la malattia, ma sembrano effetti o contrassegni della crisi avvenuta. Anche nelle malattie croniche convien por mente piuttosto alle differenze de nervi affetti, di quello che alle acrimonie

⁽¹⁾ Rudimenta pyrethologide methodicae , p. 95. Berolin. 1789. 3.

⁽²⁾ Esperienze intorno alla medicina teorica, P. I. II. Lipsia 1782. 1784. S.

problematiche. L'azione dei medicamenti, è limitata alle particelle nervee, ed occasiona la simpatia. Questa, che riconosce pel suo principal organo il gran nervo intercostale, giova a spiegare la maggior parte dei fenomeni morbosi, e gli effetti dei medicamenti. Gli emetici, stante la simpatii dello stomaco colle altre parti agiscono come eccellenti stimolanti, per produrre uno scuotimento generale in tutto il corpo.

Oltracciò alla debolczza delle forze va unito sovente un aumento dell' attività nervea; e la dissenteria, non che l'apoplessia, derivano da un'affezione dei nervi, anzichè da veruna acrimonia o sovrabbondanza di umori. Quanto alla teoria della podagra Schaeffer concorre interamente nel sentimento di Cullen. L'attività nervea influisce perfino in quelle malattie denominate locali dalla moderna teoria dell'eccitamento; come p. e. le ulcere cancerose e le impetigini croniche provengono evidentemente da debolezza. Il concorso dell'affezione nervosa si manifesta anche nel contagio, cui spesso dà occassione il timore, e disposizione la mancanza di energia e robustezza. I contagi non entrano nella massa degli umori . ma agiscono sui nervi, ed eccitano in altri organi una discordanza, mediante la quale vengono separate sostanze simili, perchè il mescuglio degli umori corrisponde costantemente al grado dell' attività nervea. Ciò è dimostrato specialmente dall'esempio del vajuolo, che, malgrado lo stessissimo miasma, diventa benigno o maligno, secondo la diversa suscettibilità del corpo attaccato. Finalmente Schaeffer dubita della verità delle metastasi, nel senso in cui furono ammesse, e combatte specialmente le lattee, appoggiato alla qualità del fluido contenuto ne' tumori di questa natura ben diversa dal vero Litte.

- 31. Parimenti Giovanni Gardiner sviluppò con nolta penetrazione ed esattezza l'infinenza della forza netvoa sui fenomeni del corpo animale tanto in istato di sanità, quanto di malattia (i). Per tal modo portò un nuovo avanzamento alla teoria delle febbri, ed attribuì l'origine del catarro alle irritazioni cutanee comunicate ai canali aerei.
- C. G. van-den-Henvell fondò sulle diverse modificazioni della forza vitale un sistema patologico iugegnoso sì, ma troppo sofistico, perchè se ne potesse fare un'estesa applicazione (2). Egli stabilisce la diversità delle funzioni universali, che vengono alterate dalle cause morbose, per base della distinzione generica; e quella delle funzioni speciali per norma del carattere specifico. Quindi tratta in primo luogo delle malattie dipendenti da soverchia irritabilità. Queste si dividono in universali e locali, secondo che attaccano i muscoli volontari, o i vasi linfatici o i sanguigni. Uno spasmo ne' vasellini capillari cagiona un maggior afflusso di sangue c conseguentemente la febbre. Van-den-Heuvell confuta, senza fornirne una migliore, la teoria di Cullen sull' atonia, qual causa dello spasmo cutaneo. Per ridurre sotto il suo sistema tutte le malattie, risguarda l'amavrosi per una conseguenza degli spasmi , che le congestioni producono nei vasi dell'occhio. Annovera, ma senza fondamento, fra le affezioni dipendenti

⁽¹⁾ Ricerche sulla natura del corpo animale, nor che sulle cause e sulla cura delle malattie, trad. Lipsia 1786. 8.

⁽²⁾ Tentamen nosologicum sistens morborum a vitio vis vitalis divisionem et dispositionem practicam, Lugd. Bat. 1787, 8.

da irritabilità soppressa, l'itterizia e la rachitide; e stabilisce un'altra classe di malattie provenienti da un'azione morbosa della forza vitale, nel qual numero colloca la suppurazione, gli esantemi, la plica polonica, la lue venerea e le scrofole. Quando anche si volesse trasandare tutte le altre divisioni e classificazioni ipotetiche, è poi sempre vero, che l'ultima classe testè accennata manca interamente d'un fondamento razionale o logico, perchè l'azione morbosa consisterà sempre in un eccitamento accresciuto o diminuito.

32. Entra pure nel novero dei moderni patologi solidistici Francesco Vaccà Berlinghieri professore nell'università di Pisa (1). Quantunque ei s'annunzi come avversario di Cullen ed imputi a questo scrittore diverse contraddizioni; tuttavia, ne' punti essenziali, s' accorda colla teoria del professor d'Edimburgo. Berlinghieri stabilisce per principio fondamentale, che non conoscendo noi le particelle costituenti degli umori, non siamo nemmeno in istato di giudicare positivamente delle loro alterazioni; motivo, per cui dobbiamo attenerci piuttosto alle apparenti deviazioni dei solidi e delle loro proprietà. Gli umori circolanti, secondo lui, non possono soggiacere ad alcuna corruzione, mentre questa non può verificarsi che fuori dei vasi. Talvolta le malattie, provengono anche da una costituzione particolare dell'atmosfera, per riconoscer la quale non basta l'eudiometro. Questa ed altre condizioni delle corruzioni umorali agiscono costantemente sui so'idi, i di cui vizi promuovono in seguito la degenerazione degli umori.

⁽¹⁾ Saggio intorno alle principali e più frequenti malattie del corpo umano, tom. 1. 2. Pisa 1787. 4.

La forza, onde i solidi agiscono sui fluidi, Berlinghieri la chiama il principio della reazione, cui attribuisce tutte le alterazioni del corpo, sì salutari che nocive. Questo principio, che non dee confondersi coll'anima, viene suscitato dalla necessità fisica, e può ricevere la denominazione di natura, o meccanismo naturale della macchina umana. Tutte le forze di sì fatto meccanismo dipendono dai nervi e dalla loro influenza sugli organi. Il principal dovere del medico si è di dirigere le sue mire al summentovato principio. I medicamenti più attivi, come sarebbero la china e l'oppio, lo attaccano con maggiore, attività di quello che potessero esercitare sugli umori. L'etiologia delle malattie croniche riesce più soddisfacente, ove trovisi appoggiata alla teoria solidistica; e la cura più facile e sicura, quando vi si applicano i rimedi atti ad operare sull'intera costituzione, anzichè quelli che si reputano soltanto depuratori o capaci di estinguere le acrimonie. L' oppio, usato colla dovuta circospezione, appalesa in tal classe di affezioni un' eroica ed eminente efficacia senza trar seco alcuna pericolosa o pregiudicial conseguenza. All' incontro la china dev' essere riservata alle febbri intermittenti , le quali ne richiedono dosi copiose.

L'apparente rassomiglianza delle felbéri alle così dette malattie nervose fece credere al dott. Grimaud professore in Mompellieri, che potesse aver luogo nel corpo per le une e per le altre uno stesso principio di reazione, e che si dovessero considerare i brividi ed il calore come alterazioni del georee nervoso (i). Quanto a quelle

⁽¹⁾ Cours complet de fievres, tom. I. IV. Montpell. 1791. 8.

degli umori, che si riscontrano nelle febbri, egli le giudicò per effetto non di un'affezione-antecedente dei solidi, ma beu-à del principio vitale, che influisce egualmente sopra tutte le parti del corpo animale.

33. Io non posso metter fine al presente soggetto, senza far menzione d' un'opera interessante del dott. Gius. Francesco Gall. medico Viennese, dove vengono sottoposti a nuovo e più attento esame i rapporti della forza vitale in istato di malattia (1). L'autore ha indicato i contassegni di stanchezza, di oppressione e di essurimento delle forze, e con egual sodezza e penetrazione fece vedere, quanto sia sovente fallace e di iliusoria la manoanza di vigore a non che l'eccitamento accresciuto. Non determina però esattamente la forza fondamentale del corpo e le leggi della medesima, ed ammette tuttavia una debolezza locale, senza curarsi di ridurre sotto un punto di vista generale gli stessi rapporti morbosi della forza vitale.

Nè valsero gli esperimienti e gli sforzi de moderni patologi a conciliare con soddisfazione un' unità razionale ai moltiplici feuomeni dell' economia auimale, specialmente prechè si tendeva sempre più a separare totalmente, dieror l' esempio d' Haller, la forza nervea dall' irritabilità, e a supporre in ciascuna parte del corpo una vita propria ed un' irritabilità originaria e specifica; idea coltivata non che dagli antichi, anche da recenti scrittori, segnatamente da Bordeu, da Blaine (a), da Gio. Fed. Blumenbach (3)

⁽¹⁾ Ricerche filosofico-mediche sulla natura e sull'arte nello stato sano e morboso del corpo umano, vol. I. Vienna 1791. S.

⁽²⁾ An essay on muscalar motion. Lond. 1778. 8.

⁽³⁾ Institutiones physiologicae, p. 34. Gott. 1787. 8.

e da Gio. Crist. Reil (i). Quest' ultimo però teutò di comprendere la forza nervea e la muscolare sotto la esprassione generale di forza fondamentale del corpo, che lo rende capace di ricevere le impressioni esteriori e di produrre le sue particolari reazioni ; e confutò nello stesso tempo gli argomenti, onde Ilaller voleva provare la diversità esseuziale delle accennate due forze, parte ripetendo le ragioni addotte da Whytt, da Unzer e da Isenfamm per l'identità generica, parte riportandosi alla diversità dell' organizzazione, affine di riconoscere le differenze specifiche nei fenomeni della già dimostrata forza fondamentale.

La distinzione generica delle due forze nervea e muscolare trovò un importante appoggio nelle nuove osservazioni di Sam. Tommaso Soemmering e di Gio. Bernar. Jacopo Belirend, onde risultò che la sostanza del cuore manca interamente di nervi (2); asserzione, la quale, a avvegnachè proposta e da Girol. Cardano (3) e da Andrea Vesalio (1) e da Gio. Battista - Gastaldy (5), non riuscì mai coà persuadente come oggigiorno. Soemmering e Behrend rilevarono, che i nervi del cuore si distribuiscono unicamente per le membrane del suo sistema vascolare, come appunto sogliono le ramiticazioni del nervo

⁽¹⁾ Jo. Lud. Gautier de irritabilitatis notione, natura et morbis, p. 56. 57. Hal. 1793. 8.

⁽²⁾ Diss., qua demonstratur, cor nervis carere. Magunt. 1792. ristampata da Ludwig. script. nevrolog. vol. III. p. 1-23.

⁽³⁾ Storia della medicina, sez. IX. §. 47.

⁽⁴⁾ De fabrica corpor. humani , l. VI. c. 15.

⁽⁵⁾ Storia della medicina, sez. XII. §. 63.

intercostale accompagnare soltanto i vas'. Inoltre avendo osservato nell'uovo frecondato l'esistenza del punto saliente anche prima della formazione del cervello, arguirono che la forsa del cuore non dovesse dipendere dall'influenza dei nervi. Finalmente appoggiarono quest'ultima opinione alla pretesa inefficacia dell'oppio sul polso, e conchusero che la galvanitzazione dei nervi cardiaci non produceva la menoma mutazione nel moto del cuore.

Quantunque gli addotti argomenti riuscissero persuadenți ad una gran parte del pubblico, si poteva tuttavia oppore, che anche in altri muscoli i filamenti nervosi non penetrano entro la sostanza dei medesimi ; che il galvanismo e l'oppio operano assolutamente sul cuore, e che questo viscere manifesta realmente una positiva sensibilità (1). Per tal modo rimase tuttavia un problema la dipendenza dell' irritabilità dalla forza nervea; e Gio. Uld. Amed. Schaeffer, quando dichiarò la sensibilità qual forza fondamentale della natura organica (2), non fu però alieno dal riconoscere in essa un principio più sublime di : t'ività. Del pari dall' altro lato non mancarono argoment. per ritenere come forza propria e singolare l'azione dei muscoli ossia l'irritabilità, qualora per essa s'intende l'attitudine delle parti a produrre contrazioni vivaci e visibili (3).

⁽i) Giornale delle scoperte in medicina, fasc. II. p. 93r 95. fasc. VII. p. 3. - ANT. SCABPA tabulae neverologicae ad illustrandum historiam anatomicam cardiacorum nervorum. Papiae 1794- fol.

⁽²⁾ Della sensibilità, qual principio vitale nella natura organica. Francfort sul Meno 1793. 8.

^{(3).} Della sensibilità ed irritabilità, quai principj vitali nella natura organizzata. Regiomonte 1794. 8.

28. To credo adunque di essermi comportato conseguen- .. temente, distinguendo nel mio sistema di patologia gli effetti dell' irritabilità dai fenomeni della forza nervea, combinate entrambe 'sotto l' idea generale- di forza vitale (1). Ho cercato in oltre di dimostrare coll'appoggio dell'esperienza e della ragione, che le corruzioni degli umori dipendono dalle affezioni dei solidi , e di applicare sì fatto principio alla patologia generale e speciale. Soprattutto mi sono adoperato a porre in più chiara luce la dottrina delle metastasi e delle aberrazioni degli umori, la teoria de'contagi, il modo di agire delle polenze esterne sul corpo, l'indole delle congestioni e delle ostruzioni, e la natura individuale di alcune malattie, p. e. dell'infiamma zione, del catarro, della febbre puerperale, l'artritide, i calcoli, la dissenteria e l'apoplessia, battendo bene spesso il sentiero tracciato da distinti soggetti. Alcuni di questi non solo mi precedettero nel piano generale del lavoro, ma ben anco trattarono già partitamente alcune affezioni secondo i principi del nuovo sistema. Tale fu l'appoggio, in cni Gugl. van-Hoven fondò la teoria delle febbri intemittenti (2), Melch. Ad. Weikard del catarro e dell' apoplessia (3), Gio. Pietro Frank della febbre puerperale (4), Gio. Cristiano Reil delle congestioni (5), Gio.

(1) Manuale di patologia, vol. I-III. Lipsia 1795. 1797. Seconda edizione 1798. (2) Saggio sulle febbri intermittenti, P. I. II. Win-

(2) Saggio sulle febbri intermittenti, P. I. II. Winterihur 1798-1790. 8.

(3) Miscellanea, P. I. p. 469-471. Francfort sul Meno 1793. 8.

(4) Epitome de curand. homin. morb. P. II. p. 182.
Manheim 1792. 8.

(5) J. N. Schulze diss. de motus humorum imperom. VI. 5

Battista Keup (1), G. Fed. Bader (2), Gio. Maese (3) e Tommaso Arnold (4) della idrofobia, Gngl. Austin(5) e Aless. Wilson (6) del calcolo orinario, Gio. Rollo della dissenteria (7), Franc. Milman dello scorbuto (8); finalmente Gngl. Nisbett (9) ed Eusebio Valli della lue venerea e di altre malattie croniche (10).

Io non poteva che compiacermi d'aver pubblicato questo saggio d'un sistema compiuto di patologia solidistera appunto ad un'epoca, in cui i rapidi progressi del-

dimenții, praecipue în abdomine tollendis. Hal. 5790. 8.
(1) Della conoscenza e cura dell'idrofobia. Dussel-

dorf, 1788. 8.
(2) Saggio d'una nuova teoria dell'idrofobia. Francf.

e Lipsia 1792. 8.

(3) An essay on the disease produced by the bite of a mad dog. Philad. 1793. 8.

(4) A case of hydrophobia, commonly called canine madness, Lond. 1793. 8.

(5) Collesione pei medici pratici, vol. XVI. p. 200-206.

(6) An inquiry into the remote causes of urinary gravel. Lond. 1792. 8.

.: (a.(f)) Observations on the apute dysentery. Lond. 1986. 8.

symptoms of the scurey and of putrid fevers arise. Lond.

(9) First lines of the theory and practice in venereal.

(10) Saggio sopra diverse malattie croniche. Pavia 1992: 8. lo spirito umano esercitavano una vantaggiosa influenza anche sulla fisiologia del corpo animale, ed in cui, seguendo le leggi dell'umano intelletto, si cominciava già a ridurre alla più rigorosa unità le cause ultime di tutti gli effetti corporei, Le luminose ed importanti dilucidazioni, che da oltre due lustri va spargendo nella medicina dogmatica la teoria dell'eccitamento, ci hanno couvinto, che tutti gli sforzi diretti finora a riconoscere la natura de' corpi organici mancano di vera connessione e corrispondenza colle norme delle facoltà intellettuali. S' imparò quindi a determinare le leggi della forza fondamentale organica, il rapporto tra ambidue i fattori, la proporzione di questa forza rispettivamente agli oggetti esteriori, non che l'universalità e identità della medesima in tutte le parti dell'organismo. Colla guida di tali cognizioni e delle deviazioni d'ambidue i fattori dell'eccitabilità dalla loro proporzione normale, si arrivò felicemente a rendere intelligibili ed in parte comprensibili i fenomeni delle malattie. Mentre si dichiararono inutili tutte le ricerche sul contrassegno isolato della forza vitale, e sulla realtà obbiettiva della medesima in certe sostanze, ne risultò nello stesso tempo una soddisfacente distinzione degli effetti chimici e meccanici del corpo, dagli organici.

L'intelletto umano trovossi pel corso di migliaja d'anni in continua contraddizione con sestesso. Era riservato al nostro secolo l'onore di scioglieta, e di consolidare immobilmente il puro dinamismo, confutando tutti i tentativi atomistici. Imponenti motivi mi obbligano di lasciare alla posterità la descrizione e l'esame dei destini e degli ultimi moderni perfezionamenti della teoria e pratica medica.

Materialismo chimico dei moderni.

29. Prima di chiudere la storia delle scuole dinamiche, non posso a meno di accennare brevemente i principi del materialismo chimico dei moderni; il quale, avvegnachè in parte opposto alla teoria dinamica, approfittò delle luminose scoperte chimiche di questi ultimi tempi , per dare nuova spiegazione dei fenomeni della vita. Vedemmo già quante vestigia delle antiche teorie chimiatriche si-riscontrano ancora nei sistemi di Boerhaave e di Hoffmann: come dovea per conseguenza sussistere la così detta patologia umorale fino a tanto, che si conoscevano le leggi dell'organismo e la sua differenza dallo stato chimico e meccanico del corpo; e per qual ragione finalmente alcuni sistemi solidistici hanno attribuito la prima energia del corpo all'etere problematico, ossia al fluido elettrico, che riempie i canali nervosi, ed anima gli esseri organizz ati.

Poicibò i sistemi medici hanno riposto costantemente finora il loro appoggio nella filosofia dominante; perciò anche il materialismo medico abbracciando le asserzioni di Tommaso Hobbes (1) dichiarò, che niente esiste fuori degli oggetti corporei; che sostanza e corpo significano la stessa cosa; che tutti i corpi sono forniti d'un'oscura senzazione, perchò tutti i corpi ricevono le impressioni esterne, e reagiscono. Verso la metà dello scaduto secolo Giuliano Of. de la Mettrie sosteme con gran fervore e

⁽¹⁾ TIEDEMANN spirito della filosofia speculativa, vol. VI. p. 50.

zelo sì fatto materialismo (1); ed in un'operetta tutta sparsa d'Insulse e inconcludenti espressioni, cercò primieramente di domostrare la natura meteriale dell'anima umana , adducendo come argomenti le semplici opinioni toccanti la sede della medesima (2). Considerò l'estremità delle arterie ed il principio dei nervi per l'anima stessa, senza riflettere, che una tale ipotesi non poggia sopra verun fondamento. Altrove poi ripete i pensieri di Hobbes sulla non esistenza delle sostanze semplici e sulla materialità di tutti gli esseri (3). Anche l'uomo è propriamente, secondo lui, una macchina, che si distingue dagli altri corpi unicamente per la più evidente maturità della materia. Nè si dà in questo mondo che una sola sostanza, cioè la materia, dalla di cui infinita moltiplicità emergono tutte le cose. L'anima è una parola vôta, e le così dette funzioni dell'anima non differiscono dai movimenti meccanici del corpo. Non andò guari, che volendo de-la-Mettrie dissipare il sospetto d'esser egli stato l'autore di questo libro , ne diede alla luce una confutazione (4), in cui ostentò di supporre la materia insuscettibile di percezioni, o di conclusioni dipendenti da sensazioni, perchè non si riconosce che il moto per l'unico effetto della materia.

Fu riputato tanto indegno questo disensore del materialismo, che persino Voltaire, di cui de-la-Mettrie professava di essere il panegirista, ebbe a dire di lui, ch'era

⁽¹⁾ N. a S. Malo nel 1709, fu membro dell' accademia delle scienze di Berlino dove m. nel 1751.

⁽²⁾ Histoire naturelle de l'ame, à la Haye 1745. 8

⁽³⁾ L'homme machine. Leid. 1748. 12.

⁽⁴⁾ L' homne plus que machine. Londres 1748. 12

un pazzo, solito a scrivere soltanto in istato di ubbriachezza (1). Appena mi sarei immaginato, a dir vero, di far menzione di tal soggetto, se i suoi scritti non avessero menato gran romore e dato occasione a due confutazioni, che meritano d'essere accennate. La prima ebbe per autore Baldass. Luigi Tralles di Breslavia (2), il quale coll'appoggio del sistema Leibniziano, cercò di dimostrare l'immaterialità dell'anima aggiugendovi alcune interessanti e piacevoli riflessioni, p. e. sulla serenità dei moribondi, e sulle differenze essenziali tra il pensiero e la sensazione qual mutazione dei nervi. Non 'è egualmente pregevole l'apologia dell'immaterialità dell'anima data alla luce da Carlo Crist. Krause professore di Lipsia, il quale, benchè sostenga che l'anima riempie uno spazio e possede tutte le proprietà dei corpi, accorda tuttavia, ch' essa è una sostanza semplice (3).

30. Il materialismo trovò un famoso difensore nel rinomato scrittore e cettico Davide Hume (4). D' uopo ò però confessere, che non vi si riscontrano l'ingegno e la fina penetrazione, che lo rendettero sì chiaro. Egli si serve perlopiù di deduzioni analoghe per dimostrare la mortalità dell'anima. Quando si accorda, che le anima de bruti sieno mortali, non si può sostenere senza incon-

(1) Evor dictionaire de medecine, v. III. p. 290.

(2) De machina et anima humana prorsus a se invicem distinctis commentatio. Lipsiae et Vratislav. 1749.8.

(3) Diss. de homine non machina. Erlang. 1752. Opusc. academ. vol. I. Lips. 1787. 8.

(4) Treatise on human nature, vol. I. p. 201. 404. Lond. 1739. 4. - Essays on suicide and the immortality of the soil. Lond. 1789. 8.

seguenza l'immortalità dell'anima umana, che rassonisglia cotanto alle prime. Il corpo la tutto comvune coll'anima, e questa cresce e svanisce con esso. Tutto è soggetto a continue 'mutazioni; e perch' nou lo dev' essere l'unica forma, l'anima umana, che manifesta ai frequenti a, grande debolzze? Finalmente noi non possianno conteplire un'idea dello stato dopo la morte, e perciò dobbium credere che cessi eziandio la nostra sussistenza.

Anche il sommo fisico Giuseppe Priestley, che vive ora nell' America settentrionale, in un' opera particolare dichiarossi fautore e partigiano del materialismo (1); e certamente i suoi argomenti hanno maggior peso di quelli addotti da tutti i materialisti anteriori. Senza conoscere la deduzione dell'essenza della materia, come indicò dappoi il profondo Kant, sostenne, che questa, cioè la materia, non è in se stessa un ente puramente passivo; ma riempie lo spazio mediante le forze attive dell' attrazione e della ripulsione. Conseguentemente anco nel corpo umano, tutte le forze sono i risultati delle forze materiali universali, specialmente perchè l'esperienza insegna, che ogni determinato stato degli organi viene accompagnato da una determinata maniera di pensare, di giudicare e di desiderare. In oltre noi non possiamo, dice Priestlev. supporre, che sia possibile avere sensazioni ed idee senza. sensi corporei. Le capacità dell'anima, se dessa è imma-. teriale, e indipendente dagli organi corporei, non dovrebbero crescere od anche svamire, quando il corpo viene minacciato di dissoluzione. Oltracciò egli accorda, che noi non comprendiamo il pensare della materia; ma affer-

⁽¹⁾ Disquisitions relating to matter and spirit. Lond. 1777. 8.

ma tuttavia, che ci manea il modo di dimottrare l'ineapacità della materia a il fatta funzione. Siccome l'astrasione non regge col materialismo, perciò Priestley rimanda a Loke, il quale fece vedere, che tutte le idee astratte sono particolari ed originate dall' omissione dell'individuale.

Quantunque le riflessioni di Pristley contenessero delle grandi verità relativamente al vôto e alla vacillità di aleuni argomenti degli spiritualisti; tuttavolta anche la sua difesa del materialismo manca di sodezza, essendo tutto fondato sulla supposizione, che l'immaterialità dell'anima sia impossibile, perchè noi non possiamo comprendere la. possibilità della di lei armonia col corpo e la sussistenza, dell' anime medesima senza di esso. Del pari rimane inintelligibile nella materia la pretesa capacità di sentire e di volere. E dovendo noi accordare, che nella vita attuale il corpo costituisce uno stromento necessario dell'anima, non ne segue però, che quest'ultima non possa sussistere senza il primo (1). Tutte queste obbiezioni giovarono a rendere l'umano intelletto più attento sulla propria incapacità, per condurre a buon fine simili investigazioni; e le stesso Priestley approfittò con felice successo del suo materialismo per quindi dedurre il pregio della fede pratica, e la sublime dignità ed importanza della rivelazione.

31. Impertanto i medici ed i naturalisti ben lungi dall'entrare in si fatte speculazioni metafisiche sulla natura dell'anima, ditessero piuttosto i loro sforti a determinare dietro gli stessi principi l'essenza delle forze orga-

⁽¹⁾ V. BUILE elementi di storia della filosofia, P. VII. p. 510.

niche. Melch. Adamo Weikard non esitò di asserire in una sua elegante e pregevole operetta, che la vegetazione e la nutrizione dipendono da forze, le quali non sono che modificazioni dell'attrazione e ripulsione generale della materia (1). Tutti i fenomeni e gli effetti de' corpi organici traggono origine dal mescuglio e dalla proporzione delle parti costituenti; ed il risultato principale e più importante di sì fatto mescuglio e proporzione non è che vita ed irritabilità. Fin anche l'animalizzazione consiste puramente nella trasmutazione d'un principio costituente del sangue in un altro (2). Poco appresso anche Guglielmo Fordyce, seguendo le leggi Newtoniane, dichiarò l' irritabilità per una semplice modificazione dell' attrazione generale della materia, e le appose il nome di attrazione della vita (3). Quindi egli risguarda come inammissibile ed insussistente l'ipotesi d'un stuido netvoso particolare.

Ecco la sorgente dei tentativi e ragionamenti, onde alcuni moderni fisiologi s'accinsero-a conciliare le teorio dinamiche col materialismo. Io non posso al presente estendermi in un più minuto dettaglio di questa nuove dottrine medico-filosofiche, e debbo riservare altempi avenire di riconoscere il pregio e l'importanza dei sistemi dominanti e più universali.

⁽¹⁾ Della vera forza, da cui dipendono la vegetazione e la nutrizione. Francfort sul Meno 1786. 8.

⁽²⁾ Ivi p. 66.

⁽³⁾ Philosoph, transact. 4. 78. for the year 1788. P. I. p. 30.

SEZIONE XVI.

STORIA

DELLA SCUOLA EMPIRICA

DE' TEMPI MODERNI



Ippocratici posteriori.

Ne' precedenti volumi di quest' opera abbiamo seguito e considerato i progressi e i destini dello studio d' osservazione e delle scuole Ippocratiche', soltanto fino al cominciamento del secolo diciassettesimo. Ora ci rimane di rimadare questo stesso soggetto dalla mentovata epoca fino al giorno d'oggi, e d'i indicare l'influenza, che le luminose coperte degli ultimi tempi hanno esercitato sull'avanzamento e perfezionamento di tutti i materiali concernenti l'edifizio scientifico e pratico della medicina (1).

Fino da primi anni del penultimo secolo, andavano già tanto più scemandosi la venerazione dei medici verso il padre dell'arte loro, l'osservanza delle sue regole e lo

⁽¹⁾ Storia della medicina , Ses. VIII. §. 121.

studio dell' osservazione, quanto più universale rendevasi la propensione ai sistemi paradossi e fautastici d'allora. Ne tampoco si badava alla lettura' degli antichi a misura che Paracelso, Fludd 'ed Elmonzio si proncurarono dei seguaci, come accadde specialmente nella Germania. All'incontro la Spagna, p'i Italia e la Francia hanno fornito dei valenti soggetti; i quali peactrando lo spirito della greca medicina, coltivarono l'arte dietro i principi dell'empirisma. Gli è vero, che parecchi s' attennero troppo fedelmente al senso letterale, e si procacciarono per tal modo un merito filologico, anzichè scientifico. Altri abbracciarono a dirittura o l'una o l'altra setta, ovvero, come solevano fare i sincretisti del secolo sedicesimo, cercarono di conciliare tra lorò le diverse opinioni degli autori de' tempi passati.

2 Fra questi ultimi annoverar si dee specialmente Sanoro (1), il quale compose un'opera voluminosa, ma poco conosciuta, per difendere l'antica teoria elementare,
per deprimere le massime empiriche e per attribuire una
maggiore importanna al semplice ragionamento (2). Pose
egli ivi ogni stadio in indicare e descrivere i segui delle
corruzioni umorali, della bile, della pituita, del sangue
dell'arta bile, ed in trattare, colla sottigliezza scolastica
la più incredibile, delle mescolanze o combinazioni di
vari fluidi morbosi del corpo, calcolandone il numero delle possibili fino a 80,000. Ritiene scrupulosamente le qualità dei medicamenti, sulle quali la scuola Gelenica determino le loro virtà. Altrove poi s'adopra a proteggere la

⁽¹⁾ Storia della medicina, v. V. Sez. XIV. §. 3.

⁽²⁾ Methodus vitandorum errorum omnium, qui in arte medica contingunt, libri XV. Venet. 1603. fol.

verità delle massime Ippocratiche da alcune obbiezioni, ascrivendo un pregio singolare alle dilucidazioni teoriche di Galeno (1). Stampò in seguito un altro libro, per dimostrare la necessità delle indicazioni causali, ossia di quelle indicazioni curative che si desumono dalle qualità ipotetiche elementari (2).

Tuttavolta la medicina sperimentale deve al Santorio la prima introduzione del termometro, allora di recente inventato, con cui si pretendeva di conoscere il calore febbrile degli-ammalati. Trovò pure uno stromento dinotante il numero e le mutazioni del polso, e lo chiamò putilogium (3).

Non altrimenti Antonio Ponce de Santa Cruz, professore di Valladolid' (4), s' accinse in un' opera a sostenere l'onore del sistema Galenico (5). Ed in un'altra intorno alle indicazioni del metodo evacuante, propose alcune utili riflessioni, comprovando i diversi pregiudizi che ridosdano dal medesimo (6).

3. Nella Germania si distinsero, al principio del secolo diciassettesimo, come valenti difensori dell'antica medicina, Gio. Nicolò Stupani (7) ed il di lui allievo Gas-

⁽¹⁾ Commentaria in primam sectionem aphorismorum Hippocratis. Venet. 1629. 8.

⁽²⁾ De remediorum inventione. Venet. 1629. 8.

⁽³⁾ Commentarius in primum sen primi libri canonis Avicennae. Venet. 1626. fol.

⁽⁴⁾ N. 1570. m. 1650.

⁽⁵⁾ Philosophia Hippocratica, Madrit. 1622 in fol.

⁽⁶⁾ De impedimentis magnorum auxiliorum, Barcinon. 1648. 8.

⁽⁷⁾ N. in Graubundten 1542. fu professore in Basilea, dove m. nel 1621.

spare Hoffmann (1). Il compendio lasciatoci dal primo non è che una compilazione insignificante ed inutile (2), ma quello del secondo (3) contiene un'ingegnosa apologia del sistema Galenico, cui però viene preferito il vero aristotelico. Anche Curzio Marinelli seguì il sistema peripatetico, assumendone le difese contro Galeno, il quale avea piuttosto prestato omaggio al Platonismo (4). Dello stesso avviso fu Guint. Cristof. Schellhammer (5), che in un' opera a parte sostenne l'entelechia (6), ed in un' altra fondò tutta la terapia sopra principi peripatetici (7). Sparse però in quest' ultima alcune ricerche assai interessanti, e fra le altre accenna d'aver rilevato col mezzo delle injezioni, che non è sempre confermata l'idea di estruzione, mentre il più delle volte si riscontra dilatazione, laddove appunto si avea supposto l'ostruzione; osservazione assai importante, che venne in appresso rinovata dal sig. Rezia (8).

Stefano Roiz de Castro (Rodericus Castrensis) è co-

(1) Storia della medicina, v. Sez. XIV.

(2) Medicina theoretica ex Galeni et Hippocratic physiologicis, pathologicis et semioticis. Basil. 1614. 8.

(3) Institutionum medicarum tibri IV. LB. 1645. 4.

(4) De morbis nobilioris animae facultatis. Venet.

1615. 4.

(5) N. a Jena 1649., fu prof. in Helmstadt, Jena e. Kiel. e m. 1716.

(6) Naturae vindicatae vindicatio. Kil 1702. 4.

(7) Ars medendi universa, ed. E. F. BURCHARD, vol. I-III. Lips. 1747-1752. 8.

(8) Fascic. observ. anatom. pathol. pag. 18. Ticin. 1784. 8.

nosciuto come sesante coltivatore della medicina Ippēcentica, o come valente esgeta degli scritti Ippocratici (1). Sotto quest' ultimo punto di vista si rendette ancora più celebre. Prospero Marziano nativo di Sassolo presso Modena, e medico in Roma, i di cui comenti su quasi tutte le opere Ippocratiche s' annoverano fra i migliori che sieno mai comparsi (2). Manca però di cognizione critica del canone, monumento ragguardevole dell' antichità, tien tutti i libri Ippopratici per genuini, e, ciò ch'è ancor, peggio, per infallibili. Zacuto Lusitano, Ebreo Portoghese dimorante in Amsterdam, ci form un' opera assiutile, i in cui trovansi raccolte ordinatamente, e e spiegate le più importanti osservazioni degli antichi. In appresso diede alla luce una collezione di casi morbosi singolari, piema zeppa di eccellenti esperienze ed osservazioni (3).

Oltre gli accennati scrittori il sccolo diciassettesimo non conta alcun altro esegeta o propugnatore della mediciona Ippocratica. Tutt' al più vi si potrebbe aggiugnere Giorgio Feder. Laurentius medico Amburghese, il quale trascelse opportunamente tra gli aforismi Ippocratici quelli

⁽¹⁾ N. in Portogallo 1559., fu professore a Pisa, c m. nel 1633. Si hanno di lui: Quae ex tribus. Florent. 1622. 12. (titolo curioso, desunto da quello d' Proces-TE vas et vary). Opuccula duo. Variae exercitationes medicae et Expositio in alliquot asgrotos Hippocratis. Fenct. 1656. 8. Commentarius in Hispocra. libellum de alimento. Florent. 1635. (6).

⁽²⁾ Magnus Hippocrates Cous, notationibus explicatus. Rom. 1621. fol:

⁽³⁾ De medicorum principum historia. Lugd. 1642. fol. Praxis medica admiranda. Ib. 1643. fol.

che sembrano meritare maggiori obbiezioni, e su questi egli manifestò diverse interessanti riflessioni (1).

4. All' inicontro il secolo decimotavo ereò non pochi ragguardevoli soggetti, i quali non solamente esaminarono gli scritti Ippocratici in riguardo pratico e critico, ma cuunciarono eziandio il vero punto di vista, sotto cui deonsi considerare questi libri riputati per sì lungo tempo meme altrettanti oracoli. Sopra tutti si distinas Gios Frenio profondo storiografo ed uno de più valenti e dotti medici del suo tempo (a). Meritano speciale attenzione ed elogio i di lui comenti sul primo e sul terzo libro degli epidemi (3). Quivi egli paragona la semplicità della teoria e della pratica Ippocratica colla Sydenhamiana, e col metodo scolastico delle sette regnanti a que giorni, locchì ridondò in sommo discapito di quest'ultime.

Non posso a meno di rammentar parimenti Gio. Battista Verna professore di Padova , avvegnachè non abbiatista Verna professore di Padova , avvegnachè non abbiatista del professore della pelaritide ; impiegando il salasso nella cura della medesima secondole regole degli antichi. La di lui opera conservò lungamente un' autorità classica (4). Non altrettanto si distinse Uomobon Pisoni nativo di Cremona e professore nell' università di Padova, le di cui produzioni appalesana gene-

⁽¹⁾ Exercitationes in nonnullos minus absolute veros Hippocratis aphorismos. Hamb. 1653. 4.

ippocratis aphorismos. Hamb. 1053. 4.
(2) Storia della medicina vol. V. Sez. XIII. §. 81...

⁽³⁾ HIPPOGRATES de morbis popularibus, lib. I. ct.
III. com novem de febribus commentariis. Lond. 1716. 4.

 ⁽⁴⁾ Princeps acutorum morborum pleuritis, Venet.1713.
 4. -Princeps medicaminum omnium phlebotomia, Venet.
 1716. 4.

ralmente il più ostinato attaccamento al sistema Galenico. e di rado contengono pensieri nuovi ed interessanti (1). Così accenna determinatamente in un luogo i vantaggi del metodo stimolante contro diverse specie di febbri , e biasima l' evacuazioni, ove si scorga una debolezza nelle forze della natura ; così preferisce nelle febbri maligne i rubefacienti ai vescicatori , perchè questi cagionano una perdita soverchia di umori, e così non risguarda mai le petecchie per un fenomeno critico. Nella sua disserfa_ zione sull'incostanza della medicina si dichiara avversario di Boerhaave e cerca di conciliare il sistema Galenico col metodico. Del secondo mostrossi difensore anche Gio. Wynter (2), il di eui hibro sul circolo metasincritico meriterebbe d'esser tratto fuori dall'obblio-Sì fatta predilezione per l'antica scuola metodica era comune a parecchi egregi medici di que' tempi, nè potè a meno di rendersi vieppiù generale, a misura che si andava riconoscendo un accordo tra i principi di essa e le idee della scuola meccanica dominante.

Anche Arrigo Cope medico di Dublino intraprese la spiegazione del primo e del terzo libro degli epidemi d'Ippocrate (3), senza esaminare però gran fatto il testo, e mostrando oltracciò una grande parzialità per le contenutevi sentenze.

⁽¹⁾ Methodus medendi. Patao. 1726. 4. - Spicilegium curation. morbor. cum singulorum animadvers. Acced. diss. de inconstantia medicinae. Patao. 1742. 4.

⁽²⁾ Circulus metasyncriticus, or an essay on chronical diseases. Londra 1725. 8.

⁽³⁾ Prognosticorum HIPPOCRATIS demonstratio medico-practica. Dublin 1736. 8. Amstelod. 1785. 8.

5. A Gio, de Gorter dobbiamo i più estesi e fondati comenti degli aforismi Ippocratici, in quanto che vi si riscontrano le più sode massime, innumerevoli utili riflesionis, ed una franchezza e libertà singolare verso gli oracoli di Coo (1). Giorgio Amed. Richter professore di Gottinga (2) diede alla luce soltanto alcune dissertazioni accademiche, le quali però contengono un gran tesoro d'erudizione classica, di riflessioni critiche assai ingegnose e pratiche sopra diversi luoghi degli antichi, e non poche verità della maggiore importanza (3). Oltre quest' egregio conoscitore della prisca medicina, dobbiam celebrare Gugl. Dan. Triller professore Wittemberghese (4), di cui quanto fu grande e profondo il sapere filologico e critico, altrettanto giusto dee credersene il giudizio e l'acume (5); e Gio. Ernesto Hebenstreit professore di Lipsia (6), la di cui collezione sulla terapeutica degli antichi gli ha meritato la riputazione d'uno de' più grandi intelligenti dell'opere degli antichi (7).

(1) Medicina Hippocratica, exponens aphorismos Hippocratis, vol. 1. 2. Amstelod. 1739-1755. 4.

(2) N. n Scheneeberg 1993. m. 1773.

(3) Opuscula medica, cur. ACKERMANN vol. I-III.
Fref. 1779. 4.

(4) N. in Erfurt 1694., m. 1781.

(5) Observationes criticae in auctores veteres. Fref. 1942. 8. - Clinotechnia medico-antiquaria. Fref. 1774 4.-Opuscula medica, vol. 1-3. Fref. 1765-1772. 4. - Hippocratis de anatome lib. cum. prospectu novae editionis operum. LB. 1728. 4.

(6) N. a Neustadt sull Orla 1702., m. 1757.

(7) Palaeologia therapiae, ejusq. ord. morb. causs. ed. C. G. Geuner. Hal. 1779. 8.

Tom. VI. 6

Verto la metà del passato secolo Gio. Bareker la immaginato un paralello tra la medicina degli antichi, e i stemi pratici de' modorni, che trovasi seritto con molta sagacità de rudizione (1). Sembra però, che l'autore non ticonoscesse abbastanza il pregio del metodo evacemente, e prediligesse soverentismente i rimedi diaferettici. Cornelio Alberto Klockhof si mostrò valente e profondo Ippocratico co suoi trattati de segni perioclosi nelle malattie acute, della crisi delle medesime e del tempo opportuno alle missioni di rangue (2). Parimenti la disertazione inaugurale di Davide Becher contiene alcune pregevoli osservazioni sul merito dei prognostici Ippocratici e sulla vara maniera di formare la prognosi (3).

Andrea Piquèr professor di Valenza si occupò lodevolumente in una traduzione Spagnuola di Ippocrate, di cui non solo rettificò il testo, ma lo corredò altresì di riflessioni pratiche, e di una memoria sullo studio d'osservazione del medico di Coo (4). Non altrettanto si distinse Gio. Crist. Riegier co'suoi langhi comentari sugli

⁽¹⁾ Essay on the agreement betwizt ancient and moder, physicians, or a comparison between the practice of Hippocrates, Galen, Sydenham and Boerhaave in acute diseases. Lond. 1747. 8.

⁽²⁾ Opuscula medica. Traj, ad Rhen. 1747. 8.

⁽³⁾ Diss, continens observationes methodicorationales necessarias ad firmandam veram prognosim in febribus acutis, Prag. 1751. 4.

⁽⁴⁾ Las obras de Hippocrates mas selectas con el texto Griego y Latino, puesto en Castellano, tom. I. II. Madrid 1757. 1761. 4.

aforiumi, dove il meglio è desunto dalla succennata opera di Gorter (5).

Gio. Natan. Petold paragono la prognostica degli andisciolla semiologia dei moderni, e ci fornì sopra quest'argomento un'opera di mola utilità (2). Del pari Crist.
Goffir. Gruner professore in Jena si rendette assai benemesito di sì fatti studi non tanto colla sua semiologia fondata sui principi degli antichi (3), quanto colla censura (4)
e colla traduzione de'libri Ippoeratici (5). Farò pur mensione del lavoro di Gio. Feder: Carlo Grimm, primo medico del duca di Gotha, che ha dato saggio di fedelta, di
diligenza antiquaria e di penetrazione pratica (6). Finalmente accennerò anche la mia-apologia d' Ippoerate, più
per compimento che per mia persuasione. Tuttavia la seconda parte riuscirà, come spero, forse più interessante
della prima, la quale 6 una produtione giovanile ed immatura (7).

(2) De prognosi in febribus acutis specimen pathologicum. Lips. 1771. 8.

(3) Semiotice, physiologiam et patologiam complexa. Hal. 1775. 8.

(4) Censura librorum Hippocraticorum, Vratislav.

(5) Biblioteca de medici antichi, traduzioni ed estratti. P. I. II. Lipsia 1780. 1782: 8.

(6) Le opere d'Ippocrate; trad. dal Greco, vol. 1..
VI. Attemburg. 1781 - 1791. 8.

(7) Apologia d'Ippoerate e de'suoi principi fondamentali, vol. 1. 2. Lipsia 1789. 1792. 8.

⁽¹⁾ Hippocratis aphorismi, notationibus variorum illustrati, vol. 1. 2. Amstel. 1767. 8.

6. La medicina Ippoeratica conservò in Francia il maggior numero di seguaci e fautori fino a questi ulumi tempi. Toussaint Guindant pubblicò una difesa del metodo semplice, il quale anziche agire da se stesso promuove l'attività della natura, e di cui Ippocrate da il modello (1). Lepecq de la Cloture professore a Caen nella Normandia si propacciò molta riputazione colle sue osservazioni, conformate secondo il piano Ippocratico, e piantate scrupolosamente sui dettami del medico di Coo (2). Nello stesso tempo Carlo le Roy professore in Mompellieri diede alla luce una collezione di prognostici tratti, dagli antichi e corredati di varie dilucidazioni (3), mentre Aubry riandava nelle opere Ippocratiche le storie delle malattie, confrontandole coi passi semiotici (4). Fin anche nell' ultimo trascorso decennio abbiamo veduto Filippo Pinel', N. P. Gilbert e Stefano Tourtelle intieramente dedicati allo studio e alla difesa della medicina Ippoeratica (5).

⁽¹⁾ La nature opprimée par la médecine moderne, ou la necessité de recourir à la methode ancienne et Hippocratique etc. Paris 1768. 8.

⁽²⁾ Observations sur les maladies épidémiques, ouorage rédigé d'aprés le tableau des Epidemiques d'Hippoer. Paris 1776. 4;

⁽³⁾ Du pronostic dans les maladies aigues. Paris

⁽⁴⁾ Les oracles de Cos. Paris 1776. 8.

⁽⁵⁾ PINEL, Nosologie philosophique, ou la mèthode de l'analyse appliquée à la médecine, tom. 1, 2, An. VI.-CILBERT, Les théories médicales modernes, comparées entr elles et rapprochées de la médecine d'obser-

Quanto più andava perfezionandosi la teoria della medichia, tanto più evidenti apparivano i discapiti, che la soverchia predilezione al metodo degli antichi arrecar dovea agli avanzamenti dell' arte. Di fatti solo in questi ultimi tempi mercè gli schiarimenti della teoria eccitabilistica si arrivò a decidere giustamente di non poche proposizioni della medicina Ippocratica. La dottrina dei giorni critici acquistò ora un nuovo aspetto, dacchè consta, che le crisi dipendono il più delle volte dal tipo delle febbri, ed ora si sa pure calcolare dovutamente la forza medicatrice della natura. Tocca alla teoria dell' eccitamento giudicare e conoscere l'importanza del metodo rinfrescante ed evacuante nelle malattie acute cotanto decantato dagl' Ippocratici, com' ella sembra accostarsi sempre più alla scuola Ippocratica, se ciò puossi inferire dal sistema generale di studiare la medicina.

Siam costretti di confessare, che nel passato secolo dovea necessariamente scemarsi e perder di pregio la lettura degli scritti Ippocratici, parte perchò le scienze ausitiarie create, può dirsi, a' nostri giorni, danno a quersti ultimi tempi una grande superiorità rispettivamente al-l'epoca d'Ippograte, parte perchò innumerevoli altre circostanze esterne hauno universalizzato lo studio dell'esperienza, parte fiualmente perchè, durante un lungo spazio del mentovato intervallo, la tendeuza della filosofia fino alla popolarità e allo sectticismo empirico promosse ed agevolò i progressi de rami pratici e sperimentali della medicina.

vation. Paris, An. VII. 8. TOURTELLE, Elémens de médecine théorique et pratique, tom. T. II. Strasburg an. VII. 8. V. il mio saggio storico dell'ultimo decennio, p. 398. 449.

Circostanze favorevoli alla propagazione d'elle scuole empiriche.

7. Oltre l'istituzione delle società fisiche e letterarie glà altrove accennate (1), le vichsitudini, cui soggiacquero i sistemi filosofici fin dal principio del secolo diciasettesimo, contribuirono principalmente, a diffondere e ad applicare il metodo empirico in diversi rami dei soggetti scientifici.

Il sommo Bacone di Viru'amio segnò egli l'epoca più luminosa e felice nella storia delle scienze, e fu allora che l' umano istelletto venne scosso, per coò dire, dal lunghissimo suo letargo, in cui l'aveano gettato la soverchia sua credenza all' autorità e la sua propensione alle proceulazioni.

Il coù dette metodo scolastico soggiogato avea ed incatenato fino alla medi del secolo diciassettesimo ogni dottrina, nò cessò à presto tale schiavità, 'malgrado le opposizioni e gli sforzi di taluni, ed., infra gli altri, di Pietro de la Ramée (2). Questo metodo scolastico consisteva in determinare per principi fondamentali le definizioni generali toccanti la natura universale d'un oggetto. Sì fatte definizioni soggiacevano a núove e sottili divisioni, e per tal modo si stabilivano le proposizioni', che venivano esposte come altrettanti postulati o problemi', e

⁽¹⁾ Storia della medicina, Vol. IV. Scz. XII. §. 194.

⁽²⁾ Storia della medicina, Sez. VIII. §. 19.

dimostrate o confutate co'modi direttamente opposti. Si fatte dimostrazioni vicendevoli eraio desunte dalle definizioni generali e couvalidate dalle autorità dei padri della sapienza seolastica. Finalmente ammettevasi quella proposizione, che potea vantare dal suo lato il maggior nume; ro di autorità.

Gertamente questo metodo non poteva ja verun modo dilatare la periferia reale dell'unanos aspere, pioche abbandouato interamente il sentiero dell'esperienza non-tendeva olte ad esercitare alquanto l'ingegno, sensa procurare alcun nutrimento allo spirito. A ciò s'aggiunse, obe
quando le argonomatazioni opposte sembravano avere egual
forza, non rimaneva alcun altro rifugio, fuorche quello
sti assuggettassi alle sentenze della tradizione, e degli seriuti
bilitici, e teologicie In tal guisa la chiesa conservò il suo
dominto sull'antina d'egli uomini, trattenendo agni slancio
dello spirito dal progredire ed estendere il regno delle
scienze.

Malgrado à grandi discapiti del metodo scolastico, produsse tuttavia alcumi vantaggi, che lo storico impar, siale non può a meno di riconoscere. L' esergizio appunto della dialettica achi l' ingegno, ed additò allo spirito le auc forze e la sua debolezza. La raigione s'avvide, ch' essa vace dei mezzi imponenti d' operare, e che, senza l' esperienza non potes vantarsi gran fatto di possedere la verità. Quindi i filosofi più ragguardevoli de nostri giorni, un Leibnizio, un Haut, un Tiedmann risguardarono lo studio degli scolastici come un espediente assei opportuno per rilevare le facoltà dello spirito, unano, e per determinare l', estensione, delle medesine.

8. Impertanto come un corpo umano soggetto a continue fatiche a mancante de necessari alimenti; finalmente

si stanca e si abbandona al riposo; non altrimenti lo spirito dovea inevitabilmente soccombere, dopo essersi esercitato pel corso di parecchi secoli senza il menomo nutrimento. Era dunque omai tempo di dilatare la sfera delle sperienze e di perfezionare il metodo di filosofare. Cartesio, niente più giovane di Bacone di Verulamio, combattè la filosofia scolastica con armi positive, rigettando specialmente la distinzione delle cause. Il suo metodo rimase quasi lo stesso, perocchè anch' egli cercò di emendare colle speculazioni le prime proposizioni della filosofia e della fisica, senza insinuarsi punto nella sfera dell'esperienze. Ma fu Bacone che atterrò il trono dello scolasticismo, disvelando i difetti originati dai pregiudizi della scuola e dell' autorità e battendo un sentiero totalmente diverso nelle ricerche, su cui soltanto le scienze pessono esser rese universalmente e realmente profittevoli.

Il più utile riformatore d'ogni ramo dello scibile, come vero benefattore del genere umano, merita un posto assai distinto nella storia 'd'ogni socienza. Laonde anche nella presente storia noi non possiamo a meno di deserivere la di lui vita e l'influenza della di lui filosofia stulla medicina.

Francesco di Verulamio, visconte di s. Albano, nacque in Londra nel 1560 da Nicola Bacone gran cancellere d'Inghilterra, da cui elbe la più fiorita e: libera educazione. Fin da quando studiò in Cambridge, provò sommà noja negli esercizi della dialettica scolastica. Fin d'allora egli si avvide, che la filosofia scolastica a nul-l'altro potea giovare, che ad acuire gli artifizi della disputa. Nell'età di diciott' anni passò coll' ambasciatore Inglese in Francia, deve si dedicò alla storia ed alla politica, e andò sempre più disponendosi ad eseguire l'impo-

nente suo assunto di correggere la filosofia. Ripatriato nel 1580 cominciò a battere la carriera politica. Dapprincipio fa semplice procuratore, passò in seguito da una carica all'altra, e finalmente sotto il regno di Jacopo I. divenne fiscal generale, consigliere di stato, cancelliere e guarda-sigilli d'Inghilterra. In capo ad alcuni anui però soffrì un terribile cangiamento di fortuna. Fu accusato, d'aver ristretti i privilegi, degli stati, e quindi spagliato de' suoi beni e delle sue dignità, e rinchiuso nella totre di Londra, d'onde usoì dopo qualche tempo, e morì li 9 aprile 1566 di 66 anni (1).

Spirito grande e libero, penetrazione sottile ed enciclopedica in ogni ramo dello scibile umano, ingegno straordinario nel discoprire i difetti d'ogni cognizione, ecco i
pregiromanteristici che spiceano in tutte le opere di Bacone: Il suo trattato de augmentis scientiamme conincia
con una divisione delle dottrine umane, ohe desi sempre
giustamente ammirare, e che Diderot e d'Alembert non
esitarono di stabilire per metodo fondamentale nel piano
dell'enciclopedia Francese. Rifettendo alle fasoltà dello
spirito, le dottrine umane appartengono alla storia qualora dipendono principalmente dalla menioria; alla poesia,
qualora i riferiscono alla immaginazione; alla filosofia,
qualora occupano l'intelletto (2). La storia comprende an-

⁽¹⁾ Kippis biograph. Britann. v. I. p. 451. — The essays of Francis Bacon, Baron of Ferulam, — whit the life of that celebrated writer, vol. i. 2. Lond. 1787 B. — Baconiana, or remains of sir Franc. Bacon. Lond. 1697. 8.

Bacon. Verulam. de augment. scientiar. lib. II.
 1. pag. 43. Opp. ed. Arnold. Fref. 1694 fol.

che la storia-naturala , la quale parte è narrativa , par e induttiva, e tende in ispezialità a porgere i dati della filosofia della natura (1). Bacone divide la filosofia in tre rami , dottrina di Dio , della natura e dell' uomo : quest' ultima la suddivide in oltre in medicina, arte cosmetica, atletica , e arte di piacere (ars voluptaria) cui apparten gono le arti liberali è la musica, le quali sarebbero state più opportunamente subordinate alla poesia (2).

o. Bacone considerò anche la medicina per un'arte congetturale, poiche l'oggetto, su cui versa, è estremamente mutabile e complicato. Finora si è cercato di mettere in vista anzichè di coltivare questa scienza; e si procurò eziandio di coltivarla prima di dilatarla, giacchè i travegli che s'intraprendono per essa non progrediscono in linea retta, ma ritornano costantemente nel medesimo circolo (3). La medicina si occupa o nel conservare la sanità, o nel curare le malattie, o nel prolungare la vita, Quest' ultimo scopo deesi necessariamente separare dagli altri ed apprezzare generalmente non poco.

.. In quel ramo di medicina poi , il di cui scopo consiste nella cura delle malattie . Bacone desidera soprattutto la fedeltà e la diligenza dell' osservatore, il quale seguendo i modelli d'Ippocrate e di Ballonio deve descrivere colla più severa esattezza le malattie, le loro cagioni ed il metodo curativo impiegatovi, senza attribuire a'cun pregio ed importanza alle opinioni ed ipotesi. Tali storie di malattie non debbono essere sì prolisse da contenere tutti i singoli fenomeni e sintomi' giornalieri , nè si

⁽¹⁾ Ivi c. 3 p. 48.

⁽²⁾ Ioi lib. W. c. 2 p. 102. 114. (3) Ioi p. 105.

trattenne unicamente sui punti singolari e portentosi. Percochè accade bene spesso, che il modo e le circostanze rendono nuovo ciò che non lo è realmente, e che un attento e perspicace osservatore riscontri delle particolarità anche ne'essi quotidiani.

e Gli anatomiei hanno posto a dir vero la più lodevole attenzione nel descrivere le più minute parti del corpo
unano, mo trascurarono poi finora l'auatomia comparata
e le deviazioni dall'organizzazione normale. Certamente
molte malattie dipendono dalla diversa struttura degli organi; locchè i medici sogliono trasandare, accusando in
vece gl'innocenti amori, mentre dovrebbero dedicare maggior attenzione al meccanismo. Non riesce per conseguenza il trattamento terapeutico, qualora uno si contempla
che la corruzione degli umori; laddove un metodo palliativo, ed un regime accurato bastano sovente a mantemere in tai casi la vita. L'anatomia comparata e patologica sono i cardini principali pei progressi della medicina.

In oltre Bacone si lagna dei medici, che troppo precipitosamente giudicano insonabili le malattie ed aprono in Ial'guisa ogni adito alla ciarlataneria. Convien desiderare, che sommi medici esaminino più davvicino le malattie teniute per incurabili, e suivengano forse unovi rimedi, per vincerle. Finalmente, ove questi rieseano insutil, è dovere del medico di procurare l'eutenasia, ossia la placidezia e dolcezia della morte.

Duole sommamente, che possedendo la medioina cecellenti regole per le indicazioni geberali della cura, manchino poi ad esse i rimedi speciali e più adattati. I medicamenti, ch' esistono nelle farmacie, corrispondono è vero, alle medesime indicazioni, ma nou alla cura delle singole malattie; d'onde avvicue, che non di rado i ciarlatani trattano qualohe malattia con più felice successo dei facolisti. Laonde i medici forniti di riputazione e d'esperienza, dovrebbero porre ogni studio per nitrovare e palesare simili rimedj e composizioni, che trionfano dei casi particolari.

Bacone desidera altren, che vengano imitate. le acque minerali, e attende ciò dai progressi, che sarà per fare la chimica. Trova poi, che i metodi curativi sono enunciati con troppa brevità, perolè si possa quindi inferire un risultato soddisfacente per le affezioni croniche; e vuole che si descrivano per intiero e colla dovuta essattezza, senz' allontaoarsi giamunai dai medesimi (1). Finalmente addita le regole per prolungare la vita, al qual oggetto propone in un altro luogo l'oro potabile ed altre presparazioni di questo metallo (3).

Questi pochi cenni bastano per iscorgere, che quantunque il sommo riformatore non conoscesse a dir vero tuttute le particolarità della nostra seinza, ed esponesse al-cune idee quasi da nulla come mezzi importanti per agevolare i progressi della medicina, tuttavia ne, abbia penetrato i difetti in generale, e proposto escellenti massime onde contribuire al maggior possibile perfezionamento della medesima. Non andò però scovro da tutti, i pregiudizi del suo tempo, ed. infra gli altri salta agli occhi quella, dove crede che, si possa formar l'oro dall'argeuto o dal mercutto (3).

⁽¹⁾ Ivi p. 105. 109.

⁽²⁾ Histor. vitae et mortis p. 521.

⁽³⁾ Histor. natur. cent. 1 p. 823.

todo di studiare e coltivare la filosofia e tutte le parti della medesima. Egli cominciò dal descrivere i danni, che ridondano dalle ipotesi e dai pregiudizi. Divide questi ultimi, cui dà il nome d'idoli, in idola tribus ch'emanano dalla natura umana, in idola specus che dipendono dall' educazione e dal modo di vivere di ciascun individuo, in idola fori, che provengono dalla pratica e società degli uomini, edwin idola theatri, che sono le conseguenze delle scuole e dell'educazion letteraria (1). Lungi da sì fatti idoli , chiunque vuol entrare nel regno della verità (2). La sola esperienza non basta, qualora non se ne inferiscono i giudizi, battendo il laborioso e difficile sentiero dell'induzione. Gravissimo danno però ne risultò a tutte le scienze, allorchè abbandonato quell'esperienza, si andò incontro alla vituperosa schiavitù della dialettica. Anche i Greci cotanto idolatrati non coltivarono il metodo sperimentale e divennero generalmente sofisti. Non si può a meno certamente di deridere la prevenzion di coloro, che considerano il sentiero dell'esperienza troppo comune, perchè gli spiriti sublimi lo debbano trascegliere (3).

Le imperfezioni della medicina dipendono, secondo Bacone, specialmente dall' aver trascurato lo studio della filosofia naturale (4). Siccome ognuno, sedotto dalla venerazione verso gl'idola specus; applica le sue opinioni predilette alla natura ; quindi n'avvenne, che si credette di poter ispiegare le alterazioni del corpo umano colle opere dell'arte umana (5).

⁽¹⁾ Nov. organ. lib. I. p. 283 284.

⁽²⁾ Ivi p. 294.

⁽³⁾ Ici p. 290 295 302.

⁽⁴⁾ Ivi p. 300.

⁽⁵⁾ Ivi p. 187 291.

Un altro imponente ostacolo ai progressi della medicina ed'ogn' altra scienza sperimentale fu incontrastabilinente il soverchio rispetto ed attaccamento all'antichità. Questa non è propriamente che l'infanzia del mondo, e per conseguenza non si dee attendere da essa la maturih del giudicio è le dovicie dell'esperienza, preg esbusivi della vera antichità. Le scoperte degli ultimi tenapi, le luminose ed importanti invenzioni correzioni delle arti umane, superano senza confronto i pochi esperimenti degli antichi. Ella è inoltre soverchia pusillanimità il riportarsi costantethente agli autori, e negare i suoi dritti all'autor degli autori, qual è il tempo. La verità è figlia del tempo, non dela l'autorità (1). I libri d'ordinario non contengono molta supienza, e siccom'essi non fauno che incessantemente riperere le stesse cose, d'unpo è perciò studiare la natura (2).

Mal s'appone chiunque si fa panra di dir cose nuove e statordinarie; e a torto temono i politici, che la coltutta progressiva dello spirito umano prepari le sedizioni de le agitazioni de popoli. Nuoce estremamente alle scienze l'inerzia ed il pregiudizio, che non si debbauo oltrepassare certi limiti. Anzi la tendenza dello spirito umano verso la verità sia eterna, infinita e senza il menomo riposo (3).

Bacone risguarda la storia delle scienze umane per la vera luce della verilà. La cognizione degli errori commessi dall'intelletto previene e guarentisce da simili traviamenti (4). Il più pericoloso trasse origine finora. delle spéculazioni; al pari dei ragnateli non si pensò che a for-

⁽t) Ivi p. 302.

⁽²⁾ Ivi p. 3o3.

⁽³⁾ Ivi p. 307 308.

⁽⁴⁾ Ivi p. 309.

mare dei tessuti aerei, senza dare ai medesimi alcuna realtà. Altri a guisa di formiche raccolsero esperienze isolate; ma il vero filosofo della natura, seguendo l'esempio
delle api, succhia da tutti i fiori il mele, e, spiuto dall'istinto interno, forma un edifizio quanto regolare, altrettanto artificioso. Non sempre però può credersi impresa
facile la deduzione di risultati generali dalle singole espetienze, e la determinazione dei principi d'una scienza.
Per l'addietro si passò troppo presto dalle osservazioni
parziali alle proposizioni generali, mentre convien battere
colla più grande circospesione ed avvedutezza il sentiero
dell'induzione. Ecco l'unico metodo, henà trascurato finora, di fare degli avanzamenti nella filosofia naturale (1). Ecco lo scopo degl'insegnamenti di Batone.

avuta la mira di fondare una navas setta, e che non riporta alcun fatto nuovo, nè contribuisce da se al arricochire il regno dell'esperienze. Confessa dipoi, che il suo metodo dà luce, ma non arreca frutti il che egli confessò, sapendo bene di non aver cognizioni sufficienti per penetrare minutamente nelle scienze sperimentali (2).

Sopratutto inculea nel metodo d'induzione, che si ponderino esattamente tutte indistintamente e separatamente le circostanze dell'osservazione, e si rifletta alle alterazioni graduali, cui soggiace un oggetto; il che viene da lui detto processo occulto, senza il di cui sviluppo non si può affermare d'aver fatta alcuna osservazione (3). Per esempio, chi non pone mente agli effetti dell'oppio fin dal

⁽¹⁾ Ivi p. 310-312.

⁽²⁾ Ivi p. 317-319.

⁽³⁾ Ivi p. 329.

primo momento in cui fu preso, non potra certamente inferire alcuna conclusione giusta e fondata da questa esperienza. Gli antichi, secondo Bacone, trascurarono quasi interamente gli accennati processi occulti, e volavano facilmente dalle osservazioni parziali e separate, alle massime generali. Quindi le leggi naturali emausno dalla luce della natura medesima, anzichè dalle tenebre dell'antichità (1).

Premessi questi principi , Bacone espone in seguito il suo metodo d'indazione, e lo spiega coll'esempio della dottrina del calore. Primieramente stabilisce una tabella della presenza e dell'essenza, in cui vengono registrati tutti i diversi casi, nei quali si genera il calore; poscia un'altra delle deviazioni, che contiene i casi, dore non si produce il calore; finalmente una dei gradi per indicare le circostanze, sotto le quali s'accresce o si diminuisce il calore medesimo. Indi ne segue la prima vendemmia (vindemiatio prima), e quivi tutti i casi concorrono a dimostrare, che il movimento costituisce la precipua condizione per dare origine al calore (2).

Convertà dopo investigare que' casi, dove le proprietà de' corpi appariscono affatto originali: ecco le così dette prerogatie delle istanze; convertà rintraceiare le istanze ostensive, le quali mediante gli stromenti sottomettono gli oggetti all'intuizione, come il termometro (vitrum calendare) dinota eccellentemente le alterationi graduali del calore; e finalmente converrà por mente all'istanza della eroce (instantia crucis) ossia a quell'esperimento che da la decisione, su cui fondare la legge naturale (3).

⁽¹⁾ Ivi p. 322.

⁽²⁾ Ivi p. 331-348.

⁽³⁾ Ivi pag. 353-354. Denominazione tratta dalle croci dei bioj o trioj per indicare il vero sentiero.

Questa breve esposizione della filosofia Baconiana non potrà a meno, di convincere chicchessia, che sì grande ingegno era nato per occasionare un'intera e salutare rivoluzione di tutte le scienze sperimentali; e la storia fa vedere, che l'applicazione del suo metodo induttivo ha esercitata la più felice influenza sulla medicina fino a' nostri giorni. Confesseremo tuttavolta, che il sentiero additato da Bacone riesce forse troppo laborioso, perchè molti si trovino in grado di batterlo. Quegli scrittori appunto, che più si vantano di tenervi dietro, hanno compreso meno degli altri lo spirito dell'autore. Così, verso la metà del passato secolo, Giuseppe Mosca pubblicò un libro dell'aria e de morbi dall'aria dipendenti , dove asserisce d'avere instituito le sue ricerche perfettamente dietro i dettami di Bacone, e biasima acremente tutte le ipotesi, quantunque egli ne affastelli un'infinità, una più incongruente dell'altra (1). Ultimamente Rob. Jones dimostrò in un' opera assai interessante l' accordo della filosofia induttiva, colla teoria dell'eccitamento; eppure Bacone anche qui difficilmente vi potrebbe riconoscere lo spirito della sua filosofia (2). Niuno però meglio di Gio. Ben. Erhard arrivò a concepire un' idea giusta del metodo d'induzione e a pronunziare verità importanti ed istruttive in tale argomento (3). 12. Non pochi medici, i quali pretendevano di at-

⁽¹⁾ Dell'aria e de' morbi dall'aria dipendenti. Napoli 1746. 8.

⁽²⁾ An inquiry into the state of medicine on the principles of inductive philosophy. Edinb. 1781. 8.

⁽³⁾ Saggio d'un organo della mediciaa. V. Ros. ' SCRLAUS Magazzino, vol. II. III.

tenersi fedelmente al metodo di Bacone, non ereditarono da lui che una violenta avversione alle ipotesi ed ai sistemi, una grande venerazione, verso l'especiona, ed un fervore speciale per estendere il regno di quest' ultima. Il metodo empirico nella medicina si procacciò in Inghilterna il maggior nunero dei, seguaci; e di la si propago ed arrivò fino a questi ultimi tempi. A ciò contribuì non solo il sommo rispetto, che gl' Inglesi tuttavia professano all'immotale. Bacone, ma hen anco la stima preponderante, che si ha colà del scuso comune (common sense), oppositore costante ed irreconciliabile di tutti i sistemi, pophositore costante col metodo empirico. I più rimomati filosofi di quell'isola non fecero che aumentare sempre più codesta venerazione verso l'indicato metodo e sonso comune.

... Giovanni Locke (1) fu il primo a far vedere che tutte le idee nascono da singole esperienze, e che perciò le nostre cognizioni non arrivano che fin dove ci guidano le intuizioni e le percezioni sensanli. Allevato, com'era ne più colti circoli, insinuò nelle persone più educate una contrarietà a qualissia speculazione o profonda astrazione : quinti riuseì nancante, il di lui saggio di determinare le facoltà dello spirito umano, oltrecehè caidde nella contraddizione di ammettere nell'uomo l'istiato congegito, dopocib. avea rigettato. interamente le idee inuate: Appartiene però a lui l'onore ed il merito d'aver indagato le sorgenti delle nostre percezioni sì interne che esterne c

⁽¹⁾ N. 1632 m. 1704. Studio anche la medicina, e fu intimo amico del Lord Ashely, dipoi conte di Shaftesbury gran cancelliere,

determinato la distinzione delle nozioni semplici c composte (1).

Anche il famoso storico e scettico Davide Hume (2) negò le idee innate, e sostenne che soltanto la consuetudine ed un istinto indeterminato, anzichè le cognizioni a priori o le leggi dell'intelletto, ci forniscono il fondamento, onde dedurre delle conclusioni generali dalle singole esperienze. Siccome noi non possiamo andare al di là dell'esperienza, siam costretti di contentarci delle ricerche compatibili colle facoltà limitate del nostro intelletto e possibili nella sfera ordinaria dell' umana esperienza. Nessun soggetto delle cognizioni umane ammette vera scienza o dimostrazione, ove non sieno oggetti di matematica, Imperocchè i fatti non sono suscettibili di dimostrazione. siccome puossi sempre concepire il contrario. Perciò tutte, le cognizioni, escluse soltanto le matematiche, sono empiriche, accidentali ed incerte, in quanto che si appoggiano puramente all'idea di causalità fondata nella cousuetudine o nell'istinto (3). .

La filosofia di Tommaso Reid professore di Glasgow mette capo negli stessi principi, quantunque egli, sotto il nome appunto di sano umano intelletto ammettesse per imate delle verità fondamentali non dimostrabili, che precedono ogni esperienza, ed il di cui opposto viene da ognuno risquardato per mu' assurdità (4).

- (1) An essay on human understanding. Lond. 1788. V. TIEDEMANN spirito della filosofia speculativa, P. VI. p. 259.
 - (2) N. in Edimburgo 1711 m. 1776.
 - (3) A treatise on human nature. Edinb. 1739.
- (4) Inquiry into the human mind, on the principle of common sense. Lond. 1769. 8.

13. L'estimatione universale, in cui questi filosofi erano tenuti dalla classe più cola, ed anco la mancanza di profonditi nelle loro speculazioni, procurarono a zodesta foggia di pensare un gran numero di encomiatori e di partigiani. Tale filosofia andò diffondendosi in un colles scoperte e coi costumi Inglesi pel rimauente dell' Europa, e tanto più rapidamente, quanto maggiore divenne de dotti Tedeschi e Francesi verso la metà del secolo decimottavo la propensione alla popolarità. Per tal modo s'aumentarono i fautori del metodo empirico nella medicine, e si tracurò il metodo razionale del pioettico, dacchè per convincimento progressivo sembrarono inammissibili le speculazioni in una scienza del tutto empirica; comè la medicina.

L'a eltre le accennate mutazioni, cui soggiacquero i sistemi filosofici, certamente contribuì alla propagazione dell'empirismo anche, il ritrovamento di diverse sostanze medicamentose, l'uso e gli effetti delle quali non si accordavano punto con alcuna delle precedenti teorie. La più importante fu senza dubbio la corteccia febbrifuga del Perri introdotta alla metà del secolo diciassettesimo. Quando fu grande ed importante la rivoluzione effettuata da questo medicamento nelle scuole mediche, altrettanto salutare e propizia riuscì la inflenza del medesimo sulla conservazione del gener umano e sulla cura delle più difficili malattic. Ond'è che la descrizione della scoperta, dell'introduzione e dei destini di à eroico rimedio merita un nosto distinto nella storia della medicina.

14. All'altezza media delle Andes, tra Loxa e Zamora fin sulle sponde del Maragnou, specialmente presso alla baja di Guayaquil nella prefettura di Quito dal secondo al quinto grado di latitudine trovansi interi boschi di china, di cui si conoscon già almeno quindici varietà. Dietro le ultime ricerche d' Ippolito Ruiz e Gius. Pavon sono principalmente in uso tre sole specie denominate Chinchona megnifolia, nitida ed hirsuta. (1). Per 1'addietro non se ne adoprò già soltanto una di queste, ma si levò la corteccia anche a diverse altre ; e Ruiz e Pavon attestano, che i Nazionali le comprendono tutte sotto il nome di Cascarillo, Anzi sappiamo ora mercè le indagini ni Hawkin (2), che si termine di Quinquina appartiene in origine alla corteccia d' un altro vagetabile, o di quello, da cui si trae il balsamo Pernano, o di una varietà del medesimo, Myroxilon. Già da oltre 60 anni Condamine affermò che l'antica china non fu la nostra Cinchoua d'oggidì ma una pianta balsamifera (3). Jacquin poi riferisce; che in tutta l' America meridionale si vende la scorza dell' Acras Sapota per vera china (4). Dal sin qui detto, e da ciò che narra Condamine, dell'incertezza di coloro che raccolgono la mentovata corteccia, apparisce chiaro quanto diverse dovevano risultare le osservazioni sugli effetti di questo rimedio.

(2) Transaction of the Linnean society, vol. III.

⁽¹⁾ Flora Perwina et Chilensis, vol. II. lab. 191
p. 50 Madrid 1798 fol., dove si trovano delineate eci
cellentemente quasi tutte le specie. Per altro anche MarTINO Vani (scritti distoria naturale, vol. I. p. 1. -25.)
ed AYMMER, BOURKE LANDERT (a. description of the genus Cinchona. Lond. 1797. 4.) ci hanno date delle ottime descrizioni delle differenti specie e varieth.

⁽³⁾ Mémoires de l'acad. des sciences à Paris a. 1738. p. 323.

⁽⁴⁾ Stirp. american, histor. p. 57 tab. 41.

Gli abitanti del Perù tenevano la correccia di Cinchona per una pregevole sostanza colorante, prima di conoscerne l'attività medicinale. Anche al momento, in cui trovavasi colà il cel. Condamine, gl' indigeni supponevano, che gli Europei ne facessero conto solamente per oggetti di tintura (1). Le notizie lasciateci dal lodato scrittore e da Geoffroy sulla scoperta delle virtù medicinali di questa sostanza, siccome dipendono unicamente dalla tradizione de' naturali del paese, debbono essere risguardate come una credenza popolare (2). L'opinione più comune si è la seguente. Avendo un terremoto aperto una stagno presso Loxa, essendo cadute in esso alcune piante vicine di Chinchona, l'acqua rimase pregna e carica delle proprietà medicinali di questi , vegetabili. Un febbricitante nell'idea di estinguere la sete; da cui era tormentato, si mise a bere di quell'acqua paludosa, ossia di quell' infusione accidentale , ne risenti più oltre la febbre. In seguito altri abitanti di Loxa conobbero l'accennata corteccia e la sperimentarono generalmente assai utile nelle febbri (3).

Giusta un'altra tradizione (4) dei Peruani deesi ai Leoni la conoscenza di questo rimedio (5). Questi anima-

- (1) Mémoir. de l'acad. à l. c. p. 321.
- (2) Traité de la matière mèdic. tom. II. p. 93.
- (3) COLLINGWOOD, Edinb. comment. vol. X. f. 2.
 - (4) CONDAMINE l. c.
- (5) Nell' America non esistono leoni; ma gli animali, cui gli Spagnuoli danno un tal nome, oi rassomigliano. I naturali li chiamano Puma. V. Buffon hist. natur. des quadrupèdes, tom VIII. p. 110.-113. Paris, 1769. 8.

li , quando vengono assaliti dalla febbre; intermittente sogliono per istinto rodere la corteccia del Cinciona, e per al modo liberari dalla malattia. Per altro la ricorni del casi, nei quali sembra che i bruti-abbiano ritrovato dei rimedi , meritano a mio credere assai poca credenza, come ho già dimostrato più ampiamente in altro luego (1).

15. Benà sembra fuor d'ogni dubbio, che i Peranni abbiano tenuto celato per lungo tempo questo prezioso
rimedio ai loro tiranni Europei, e che il Corregidore di
Loxa sia arrivato a conoscerlo soltanto col mezzo di un
accidente. Narra Antonio Bolli negozianta Genovese che
i naturali del paese sogliono mettere e lasciare per un giorno intero nell'acqua una data quantità di corieccia, e
bere dappoi quest' infusione (a)

" Fausto de la Curva siferà al Condamine , che a Loxa e Cuenca si conosècva già da lungo tempo questo medicamento, priacebà se se avesse la menoma notiria a Lima, residenza ordinaria del vicerè Spagnuolo. Il corregiore di Casa con la contesia de la contesia con esta de la contesia con el composito de la contesia cincho viceregina del Perù. Ell'era romentata da un'ostinata febbre terzana, con cui si erano indarpo impiegati i soliti rimedj. Il Corregidore ríptudo suo dovere di recommanare alla sposa del suo vicerè il febbrilgo di Loxa, e mostrossi tanto certo dell'esito, che impegnò il sauo onore, sè il rimedio non corripopuleva" all'intento.

⁽¹⁾ Storia della medicina , Tom. I. Sez. I. S. 7.

⁽²⁾ SEBAST. BADI anastas. cort. peruviani , p. 7. Genuae 1663. 4.

re la cura: L'ammalata però non osò sperimentare sopra se stessa il nuovo medicamento, fino a tanto ohe non fosacro state instituite apposite prove 'negl' indigenti. Il successo riusci felicissimo, e quindi la viceregina essendosi adattata al prescritto metodo, guarì in brevissimo tempo.

Appena sparsa per la città la notizia di questa guarigione si presentarono al vicerè alcuni deputati del corpo civico per impetrare da lui, che ordinasse l'introduzione universale del nuovo rimedio. Locchè avvenne, facendo venire da Loxa e Cuenca una ragguardevole quantità di corteccia in polvere, che fa poi distribuita agli abitanti dalla stessa viceregina, d'onde emerse la denominazione di polvere della contessa (publis contitisse). L'inneo eternò il nome della contessa medesima assegnandolo per la specie a tutte le varietà delle piante, da cui si trae una corteccia s'a salutare.

16. Due anni appresso la corteccia fu conosciuta anche in Europa (†). Il vicerè conte di Cinchon ritornò in Ispagna l'anno 1640. Il di cui medico Giovanni del Vego avea portato seco una considerevole quantità di chi-

⁽¹⁾ Anton, Bolli presso Monton opp. vol. II. p. 68
Amstelod. 1694. 8. - Condamine 1. c.

^(*) Un medico Spagnuolo per nome VILLEROBEL, della cui relazione riscontrasi un estratto nella citata opera di Baso, p. 202., sostiene che la corteccia sia stata introdotta nella Spagna fin dal 1632., ma wata soltanto nel 1639. da un ecclesiatico d'Alcalà d'Henares. Dapprincipio se ne prescriveva una dose si piecola, che il co. di Cinchon a fronte dell'abbondante provvista portata dall'America ne lasciò tuttavia alla sua morie una considerevole quantità.

na e la vendeva per cento reali alla libbra (9). Il conte di Cinchon si trattenne a Siviglia, e di la il nuovo febbrifugo si propagò per tutta la Spagna. I medici Spagnuoli si divisero immediatamente in due partiti ;- gli uni pieni di zelo per mantenere l'onore della medicina Galenica, ed assuefatti dietro le antiche prescrizioni a riconoscere come causa efficiente delle febbri intermittenti la presenza di alcune materie morbose, e a dirigere le indicazioni per iscioglierle ed evacuarle, si crano contentati finora d'impiegare oltre i soliti risolventi ed evacuanti, a compimento della cura, gli stomachici, l'assenzio, i fiori di camomilla , il mace , il fummosterno , il cardo benedetto, e finalmente l'asclepiade, l'angelica e la valeriana. Eglino o non trovavano nel nuovo rimedio le qualità sensibili, dalle quali si potessero arguire le elementari, secondo l' uso di que' tempi, ovvero giudicavan che il gusto astringente della corteccia e l'abbondanza della materia estrattiva producesse un'attività eccedente ed incerta. Insomma rigettarono la china, forse anche perchè Galeno non ne avea fatto menzione. All'incontro gli altri l'anprezzarono e la vantarono come uu rimedio divigo, cui niun altro vi fosse da paragonare per la cura delle febbri.

Pietro Barba Spagnuolo di nascita e primo medico del cardinal infante Ferdinando governatore del Belgio e fratello di Filippo IV, pubblico fin dal 1642. una dife-

⁽⁹⁾ Reali di Plato'o di Vellon'? Questi equivalgono circa un grosso di Sassonia, sicchè una libbra avrebbe costato quattro risdalleri. Quelli di Plata corrispondono a più di tre grossi, e per tal modo il prezzo d'una libbra sarebbe stato di 15, risdalleri. Io m'attengo alla seconda valuta.

sa della corteccia e dei medici suoi compatrioti, che la raccomandavano (1). Da lì a poco un certo Giuseppe Golmenero scrisse un'acre apostrofe contro il nuovo rimedio, accusandolo di non evacuare le materie morbose, motivo per oui la febbre resta piutosto rinchiusa o soppressa, che corata, e ne seguono innumerevoli altre conseguenze e indisposizioni secondarie (2). Gli rispose Gonzalo Tommaso Ilernandez riportandosi specialmente alle felici esperienze, e da ttribuendo alla corteccia anche un azione catartica od evacuante (3).

Sarebbe sommamente desiderabile, ohe si sottoponesse, ad un esame chimico e pratico la scorza dei myrozylon ossis dell' autica quinquino onde rilevare la differat delle forze assolute e degli effetti relativi tra essa e le odierne nostre corteccie di Cinchona. Quindi si potrebbe decidere quanta ragione avessero i nemici del nuovo rimedio. Si sa che dapprincipio bastava una tenuissima dosa di china per produrre quello stesso effetto che si ot-

Vera praxis ad curationem tertianae stabilitur, falsa impegnatur, liberantur Hispani medici a calumnits. Hispali 3642. 4: - HALLER bibl. med. pract. vol. II. p. 685.

⁽²⁾ Reprobacion del pernicioso abuso de los polvos de Chinachina. Madr. 1647.

⁽³⁾ Defensa de la China contra Colmenco 1647. 4.

Comparve in seguito alla luce il seguente libricciudo:
Discusso medico, formado en una tertula de Madris
sobre un librillo que en defensa de la China-China se
apareciò coi el nombre de Don Tuomas Fernandez etc.

V. Blumendaci nel nuovo magazzino pei medici di BalDINCES, vol. V. p. 159

tenne dappoi con dosi assai maggiori, anche avanti l'introduzione della diina rossa. Morton afferma che ne primi tempi due dramme corrispondevane a due once che si prendevane a suoi giorni (1).

17. Gli ecclesiastici, ed in ispezialtà i Gesuiti adottarono immediatamente e con gran fervore la china , la vendettero a caro prezio, e ne distribuirono poi gratuitamente ai lore confratelli e agl' indigenti. Il cardinal de Lugo procuratore generale dell' ordine ha avuto un merito singolare nella propagazione di questo rimedio stato poc' anzi portato dall' America meridionale al ritorno del padre provinciale. Trovandosi in Francia nel 1649. raccomandò e lodò la corteccia a Luigi XIV. attaccato appunto allora da febbre intermittente. La guarigione seguitane procurò nuova voga alla medesima, che ne paesi cattolici acquistò il nome di polvere del cardinale. Ma i protestanti la perseguitarono e risguardarono la polvere de' Gesuiti per un nuovo veleno, per un' invenzione diaboli-, ca, con cui si volesse, estinguere tutti gli eterodossi (2), anzi si andò tant' oltre, che se ne faceva liberamente uso soltanto ne' chiostri e nelle scuole dei Gesuiti (3).

Alcuni medici Romani, fra i quali nominatamente Frassoni, 'malgrado la loro ortodosia medica si dichiararono a favore della decaduta cortegoia. Mortor vide una breve istruzione sull'uso della china sottoscritta dai medici Romani nel 1651., 'e composta sotto la direzione ed autorità dei Gesuiti, dove viene determinata la dose del-

⁽¹⁾ L. c. 99.

⁽²⁾ Brunaclus de Cina Cina, pag. 16. Venet. 1661. 8. Morton l. 1c. p. 69.

⁽³⁾ Tokki therapeut, special, febrium intermitt, p. 7-

la correccia a due dramme, prendendo anticipatamente qualche catartico, ed aspettando dappoi la traspirazione senza frammishiarvi alcun altro medicamento (1). L'esito però dovea riuscire sovente incerto e difficile, quando non somministravasi la corteccia che poco prima del parrossismo (a).

18. Ma nel 1652, avvenne nel Belgio un caso che minacciò di togliere ogni riputazione alla china. L' arciduca Leopoldo Guglielmo d'Austria, allora governatore; trovavasi attaccato da una febbre doppia quartana. Gli fufatta prendere la china trasportata a Brusselles da un certo Michele Belga, e ne seguì la guarigione. Si ottenne lo stesso effetto in una recidiva sopraggiuntagli poco appresso. L'illustre ammalato recidivo per la seconda volta, e non volendo più prendere la china, morì. Non abbiamo però alcuna contezza del modo, con cui su apprestato il medicamento. Gio. Chisslet compose la storia di questa malattia, e certamente in discapito della china (3). Egli asserisce, che sotto l'uso di questa sopraggiungevano le recidive, e che tale sostanza per la soverchia sua, aridità e disposizione riscaldante abbrustolisce quasi le viscere, consuma l'umido vitale, ed occasiona non di rado dei dolori colici, conchiudendo essere irragionevole l'appigliarsi ad un rimedio incerto o nocivo, quando non ne mancano altri più adattati e sicuri.

Ecco gli argomenti teoretici : ma Morton ci assicnra, che altri motivi assai vituperevoli concorrevano a tratte-

⁽¹⁾ L. c. p. 99.

⁽²⁾ RESTAURAND in BLEGNY zodiac. med. gall. ann. V. p. 136.

⁽³⁾ Pulvis febrifugus orbis americani. Lovan. 1653. 4.

nere parecchi medici dal preterivere la corteccia nelle febbri intermittenti. Si avea osato fin allora di prolungare le febbri qoi debilitanti, e rincresceva di poter ora vincere con si piccola dose e tutt' ad un tratto una malattia, la cui lunga cura arricchiva e medici e speziali. La vide cupidigia non pote starsene tranquilla e quindi nacque una vera congiura contro il unovo rimedio (1).

Onorato Faber, sotto il nome di Antimo Conigio cerco di difeudere la china dalle obbiczioni ed imputazioni di Chifflet. La di lui apologia, annessa appunto all'opuscolo di Chifflet, comincia da un'analisi chimica assai difettosa ed insussistente del rimedio, accennandone specialmente i principi costituenti volatili ed etereo-oleosi, atti a sciogliere e ad attenuare gli umori viscidi ed ispessiti. Niente diversa fu la difesa di Pietro Castelli (2). Má il valoroso Vopisco Fortunato Plempio (3) sotto il nome : di Melippo Protimo (4) abbracciò il partito di Chifflet, e procurò di dimostrare coll'appoggio di diverse testimonianze, che la china non fa che convertire le febbri intermittenti in continue, ed osò fin anche sostenere, che in Brusselles neppure un ammalato era guarito col nuovo rimedio, e che altrove, specialmente in Italia erano state osservate delle conseguenze nocevoli. Finalmente accen-

⁽¹⁾ MORTON l. c. p. 69.

⁽²⁾ De Effervescentia et mutatione colorum in miætura liquorum chymicorum. Messan. 1654. 4. - V. Storia della medicina, Sez. XIII. §. 14.

⁽³⁾ Storia della medicina Sez. XII. S. 17. 30.

⁽⁴⁾ Antimus Conygius, pulveris peruviani defensor, repulsus. Lov an. 1665. 4.

na una lettera del re di Spagna, dove si mettono in vista i difetti della china (*).

S'è vero, che a quell' epoca la china non riuseisse sempre giovevole nelle febbri intermittenti, conviene credere che gli Spagnuoli l' adulterassero; lagnanza già esternata dal cardinal de Lugo, dallo speziale del collegio medico di Roma, e da Vincenzo Protospatario medico di Napoli. S'introdussero allora in Italia diverse altre corteccie astringenti, prive di qualsisia sapore aromatico, ma fornite di amarezza mediante un'infusione d'alob, e quitudi spacciavansi per corteccia genuina del Perù (3).

10. In quel torno (1651) anche l' Inghilterra comin-

ciò a conoscere questo medicamento Tommaso Sydenham riferisce, chi esso cadde in disprezzo ben presto per due miotivi (3). Primieramente somministravasi poco avanti il parossismo, nel qual momento dovea necessariamente alterare i moti della matura. Il oltre parecchi ammatati realmente mortrorio sabito dopo Truso di questo medicamento, frir quali vengono additati il senator Underwood e il empitano Potter. Ne si seppe prevenire le recidive, forse per non averne determinato il tempo esattamente, o per ver impiegate dosi troppo meschine. Quindi avvenne, che anche i buoni medici si astennero dall'uso della china. Sydenham attesta, che fin da quell'epoca si è riflettuto sul modo il più sicuro di porgre la corteccia, e che finalmente tutti convenuere esierne, il momento più op-

^(*) SEE. BADO (Anast. cort. perus. p. 202.) sospetta con ragione, che questa lettera sia puramente suppositisia.

⁽¹⁾ MORTON. l. c. p. 96: 97.

⁽²⁾ Opera, tom. I. p. 187. Genev. 1769. 4.

portuno quello immediate successivo al termine dell'accesso. In tal guisa s'arresta il parossismo viciuo, semprecchè nell'intervallo apireticò si ripetano le stesse dosi fino a tanto che ha cessato interamente la febbre.

Pare che nel 1658. l'uso della china in Inghilterra fosse divenuto più frequente e più generale. Perocchè Giorgio Baker (1) trovò nna notisia di quell'anno, dove si racconta, che essendo stata portata a Londra da un negoziante d'Anversa della china, Prujean presidente del collegio medico ha certificata la genuità della medesima.

· La china trovò un zelante e perspicace difensore in Rolando Sturm (2) medico di Dellet, il quale esaminò le obbiezioni di Chifflet e di Plempio, e biasimò altamente l'ignoranza dei medici in disprezzare un rimedio, solo perche non lo conoscono. Ora però, dic' egli ; si hanno da due anni (cioè dal 1658) tanté e sì felici esperienze sul vantaggio della corteccia nelle febbri quartane, ch'essa andò riacquistando e consolidando la primiera sua celebrità. Si lagna tuttavia della rarità e preziosità di questo rimedio, dimodoche solo i grandi ed i ricchi ne posseggono, e gli stessi principi sogliono farne bggetto d; mutui donativi : ne può comprendere come l'albero', da cui si trae si eccellente corteccia, sia stato comune attorno Loxa, come si narra (3). Sturm ne dispensò per cinque anni di seguito d' un regalo avuto da un suo amico, et to begon .

⁽¹⁾ Memorie mediche, pubblicate dal collegio dei medici di Londra, vol. III. p. 148.

⁽²⁾ Corticis Chinae ejusque virtutum et virium descriptio. Antuerp. 1659, 12.

⁽³⁾ Ivi p. 15. 84.

ed esaurito questo tesoro non ritrovò più mezzi di provvedersene muovamente. (1). Ciò accadde inel 1661; del rimanente egli ci assicura, o he la chiun non ostruisée punto, ma agisce auzi sopra tutti gli organi secretori (2), e contribuisce colla sua amarezza ed indole riscaldante a sciogière le congestioni (3).

20. Nel suddetto anno fu mossa in Italia una forte quistione sull'uso della china. Il cardinal Doughi attaccato da un tifo terzanario dovea prendere, dietro le prescrizioni del suo medico, la corteccia. Gli si opposero due medici milanesi, i di cui argomenti dimostrano quanto influisse tuttavia la teoria Galenica sugli animi di non pochi medici Italiani. Il primo, chiamato Cristoforo Paravicini, accordò bensì che si potesse impiegare il nuovo rimedio nelle febbri quartane, ma lo riputò assai nocivo nelle miste e biliose. L'altro, di nome Rocco Casati, rigettò la china in tutte le intermittenti. perchè la natura fredda e narcotica della medesima non fa che addormentare ed attutire per qualche tempo gli spiriți vitali , talche i susseguenti parossismi diventano più violenti, e più facilmente succedono delle metastasi sopra organi importanti (4).

Questi nemici del nuovo rimedio ebbero un oppositore in Gaudenzio Brunaclo medico in Roma , il quale porò non portò in campo che ciarle scolastiche e teorie Ga-

⁽¹⁾ Lamswerde append. ad Sculteti armament. chirurg. Lugd. Batav. 1692.

⁽²⁾ Cortic. peruv. descript. p. 36. 37.

⁽³⁾ Ivi p. 46. 47.

⁽⁴⁾ SEB. BABI anastas. corticis peruviani, p. 139.
Genuae 1663. 4.

leniche (1). Egli comincia dall' instituire alcune ricerche intorno al temperamento della corteccia, e riflettendo alla di lei virtù diuretica e rassomiglianza al rabarbaro e al sassafrasso, conchiude', ch' essa è arida e riscaldante. Di poi cerca con una pesante prolissità di dimostrare, che la china è calda nel terzo grado, e guarisce le febbri mediante il suo temperamento. Imperocche col suo calore diminuisce l'esto straordinario originato nelle febbri dalla bile e dagli umori putridi (2). Quindi ne indica la qualità occulta. che la rende capace di somministrare un antidoto contro il veleno morboso delle intermittenti. E quando anche, soggiuge egli, la teoria non sapesse come spiegare gli, effetti di questo medicamento, l'esperienza parla troppo chiaro, perchè si possa mettere in verun dubbio l'attività ad efficacia del medesimo (3). Nell' arcispedale di s. Spirito di Roma questo medicamento viene usato frequentemente e col più felice successo. Si fanno digerire nel vino bianco due sole dramme di china ben polverizzata. Tostocchè compariscono i primi indizi dei brividi febbrili, si fa prendere all'ammalato tutta intera la surriferita dose, è gli si prescrive la quiete , onde promuovere possibilmente anche la traspirazione. Ei giura d'esser guarito unicamente con questo metodo da una febbre doppia-terzana, che avea durato un mese, e ch' era accompagnata da ostruzioni addominali, avendo provato specialmente una copiosa secrezione d'orina (4).

⁽¹⁾ De Cina Cin:, seu pulvere ad febres syntagma physiologicum. Venet. 1661. 8.

⁽²⁾ Ivi p. 68.

⁽³⁾ Ivi p. 110.

⁽⁴⁾ Ivi p. 17.

Un più valente apologista del nuovo rimedio fu Sebastiano Baldi di Genova, che visse per qualche tempo a Roma in compagnia del cardinale de Lugo (1). El si propose di confutare le obbiczioni di Chifflet e di Plempio. senz' abbandonarsi punto ad alcuna teoria, contentandosi di dimostrare l'azione salutare della china soltanto coll'appoggio dell' esperienza. Supposta anche incontrastabile l'indole riscaldante della corteccia, si sa, che Ippocrate usò nelle febbri sintermittenti il vino ed altri stimolanti. La china agisce non solo nelle quartane, ma eziandio nelle terzane , non che nelle doppie e nelle subcontinue; in prova di che vengono riportate molte interessanti osservazioni. Ciascuna febbre, dic'egli espressamente, in cui riscontrisi prostrazione di forze, qualunque ne sia il tipo, richiede assolutamente l'uso della china : nè importa purgare precedentemente il corpo, o tutt'al più basterà una sola evacuazione (2). Peccato, che dopo tante cocellenti e nuove riflessioni , l'egregio scrittore non si occupi a determipare con precisione le indicazioni e contradizioni di questa sostanza medicamentosa. Accorda bensì di non averla sperimentata di alcuna utilità nella tisi e nelle effezioni venerce, ma non ne descrive accuratamente i casi.

21. În generale non si conosceva fino al 1668. la vera e più acconcia maniera di porger la china, mentre o non se ne prescrivera una dose sufficiente, o si prendeva in qualche forma la meno opportuna, o troppo appresso il parossismo, quando l'effetto non può essere si certo, come negl'intervalla apiretici. Nemmeno s' avvisò alcuno di stabilire esattamente le indicazioni che richiedono questo rimedio. Per verità dobbiamo ad un certo Rosposto processo de la considera del cons

⁽¹⁾ Anastasis corticis peruviani. Genuae 1663. 4.

⁽²⁾ Ivi p. 119.

berto Talbor o Tabor (1) di Cambridge, che a buon dritto può essere risguardato da parecchi scrittori qual rozzo empirico, la conosceuza e la pratica migliore per l'applicazione e per l'uso-più confacevole e sicuro di tale sostanza. Si narra, che Tabor essendo allievo dello speziale Dear di Cambridge, rilevo da un certo Nott, mumbro di quella università, alcuni cenni sul metodo più efficace di adoprare la china. Non maneono poi alcuni dati per credere, ch'egli abbia compiuti regolarmente tutti i suoi studi (2).

Tabor asserisce egli stesso, che i cenni comunicatigli da Noți intorno al miglior-modo di prender la china,
florinarono la sorgente della, sua fortuna (3). Andò a nabiliris sulle coste marittime d'Essex, onde instituire comodamente e senza difficoltà diverse esperienze col nuovo rimedio. Queste riuscirono a felicemente, che venne chiamato
più volte a Londra, dove finalmente nel 1671. fissò il suo
soggiorno, e nell' anno seguente pubblicò il suo trattato
delle febbri. Egli eseguisce la cura della malattia con 'un
arcano composto di quattro ingredienti, due indigeni e
due esotici. Già vedremo in seguito, che uno di questi
ultimi altro non era che china, riguardo a 'cui inculea
di starsenie molto guardinghi nell' suo de'medi camenti palliativi, ed in ispezialtà della polvere de'Gesuiti (4), ch'u
un eccellente rimedio ove sia adoperata con intelligenza,

⁽¹⁾ N. 1642., m. 1681.

⁽²⁾ BICER memorie di medicina, vol. III. pag. 159. 160. - GIDEON HARFEN, the conclave of physicians, pag. 165. Lond. 1683. 8.

⁽³⁾ Pyretologia, or a rational account of the cause and cure of agues, with their signes. Lond. 1672. 8.

⁽⁴⁾ Ivi p. 41.

 nocevole ove manchi la dovuta circosperione, avendo osservato in Essex produr essa spessissimo delle convulsioni. Sì fatto squarcio gli costò un continuo rimprovero, avveguache letto di seguito potesse reggere colla più onesta sincerità.

La riputazione di Tabor, mercè le strepitose guarigioni da lui operate nelle intermittenti od suo segreto, ando talmente crescendo in un collà gelosia de'medici suoi celleghi, che il Governo Inglese fu costretto di guarentirlo con un diploma speciale dalle opposizioni del collegio medico.(1). Nel 1679, recossi a Parigi, dové parimenti institut delle cure col più filice successo, e meritossi la confidenza della corte, a segno che gli fu affidata la curra del Delfino, comprato il suo segreta per due mila luigi d'oro; ed assegnatagli una pensione vitalizia di due mila franchi (2).

Antonio d'Aquin , allora primo medico , accusò Talbor d'aver errato nel trattamento del Delfino e di altri ammalati , perocchi-essendo la febbre d'indole puramente biliosa e nata da una diarrea , il segreto non potea a meno di arrecargli qualche nocumento (3). Similmente altri lo rimproveratono d'aver preseritto nelle febbri continue la china , il vino ed alimenti solidi.

^{1. (1)} BAKER l. c. p. 161.

⁽³⁾ LI MARCHESE DI SEFICNE racconta, che tale assunto disgustò estremamente i medici di corte. Lettres, vol. VI. p. 233. 1080. 8. Nov. Pare che Tabor abbia di poi contribuito a gettare in un asma artritico il duca di Rochefoucault mediante il soverchio uso della china. P. Blesoni soduce, med. gall. ann. II. p. 264,

⁽³⁾ BLEGN'N zodiac. med. gall. ann. V. p. 15.

22. Dopo la morte di Talbor il governo francese fece pubblicare il decantato segreto. Esso non era altri, chia
già nota china occultata; con idiversi ligeredienti e somministrata in varie forme. Giusta il asserzione dei medici
Francesi , Talbor era solito d'infondere in sci libibre d'asqua , per quatti, ore , sci drantme di petalli di rosscon due once d'acido di limone y agginguendovene in
seguito otto di china polverizzata e quattro di radice) di
finocchio, lascianda in digestione ogni casa per lo spazio
di dodiciore: Talvolta vi soprafiondeva del succo di preszemolo o. di oppio , ovvero anche del vino squisito,
sempre colla mira di nascondere il vero sapore della shi,
a (1).

Gioyanni Iones poi afferna, che Talbor preperava il suo segreto nulla maniera qui appresso (a). Dopo aver lasciata per uno o due giorni una libbra di china polverizzata in una decozione di anisi odi promemolo, trasportava tutta l'infusione in un vaso di terra capace di sette misure, che andava agliando tratto tratto, aggiungendovi in seguito del vino rosso, e in capo a otto giorni la filtrava e poscia la riponeva in bottiglie di vetro. Di questi tituta: Talbor voleva che se ne prendessero cinque o aci ouce ogni tre ore negl'intervalli apiretici; dino a tanto che svanisse la febbre. Alle volte vi aggiungea un'altra dose di polvere, e filtrava la nuova infusione dopo po spazio di dieci giorni. Pu anche il primo che abbia insegnato a preparare una tituta di china, infondendo due ongie di corteccia in otto di alcol purissimo. Ogni qual-

⁽⁺⁾ Ivi p. 14.

⁽²⁾ Novar. dissert. de morbis abstrusior tr. I. de ebrib. intermitt. p. 227 Hug. Com. 1684. 8.

volta la surriferita infusione sembravagli troppo dobole, vi imesodava ad ogni dose sei otto gocee della intura spiritosa. Gli stessi medici Francesi non negano, ch' egli abbia risvovato diverse altre forme, e' infra le altre quel-la d'estratto, opportuna specialmente alle gravide, e agl'individui di gracile costituzione (1).

Si sa in oltre, che Talbor univa spesso 'alla chine dell'oppio, od una tintura del medesimo (2). Ecco probabilmente il secondo ingrediente esotico, che dovea trovarsi nel suo segreto; utile combinazione dell' oppio colla china nelle febbri intermittenti, di cui parimenti siamo debitori a Talbor. Ma soprattutto ei si rendette benemerito col raccomandare le dosi generose, col diversificare le forme della somministrazione, e coll'additare il tempo più opportuno per quest'ultima. I medici Francesi couvengono in ciò ; e quantunque rinfaccino agl' Inglesi d'aver adoperato intempestivamente il suo rimedio nelle febbri continue remittenti, affermano tuttavia, che il tipo della febbre ne porge alcuna indicazione per l'uso della china, nè lo vieta. Nemmeno il calor della febbre costituisce una controindicazione, perchè dipende da debolezza, e la china colla sua amarezza resiste a tutte le fermentagioni del corpo, alla febbre non che alle infiammazioni : talchè non importa, che questo medicamento produca alcuna riflessibile evacuazione (3).

23. Non è da negarsi, che Talbor si permettesse diversi artifizi ciarlataneschi, o cambiando il suo nome di Tabor in Talbor, e dacchè recossi in Francia, Tabot,

⁽¹⁾ JONES l. c. - BNEGNY l. c. p. 9. 10.

⁽²⁾ BNENY l. c. p. 14. 17.

⁽³⁾ Ivi p. 4. 12. 13.

o preparandosi egli stesso un pomposo epitafio (1), e nas scondendo in una vituperevol maniera la china sotto la forma del suo segreto. Malgrado tutto ciò egli si procaca ciò un merito incontrastabile, per aver perfezionato il trata tamento delle intermittenti; merito riconosciuto da pochissimi de suoi nazionali. Uno de panegeristi più imparziali ed intelligenti di Talbor fu il rinomato botanico Giovanni Ray (2). Tommaso Sydenfiam non fa in aloun tuogo menzione di Talbor: soltanto sembra alludere a lui, dove biasima altamente que' ciarlatani che vendono febbrilughi segreti o singolari (3). Eppure sembra probabile, che lo stesso Sydenham, non d'altronde scevro da pregindizi contro la corteccia, abbia appresso da Talbor il vero modo d'usarne (4). Anche Riceardo Morton , ohe a dir vero parla con troppo disprezzo di Talbor (5), comincio soltanto dopo la partenza di esso lui da Londra ad impiegare con maggior libertà ed attenzione la china, ed assert certamente il falso quando sostenne, che Talbor fin nel 1678. cioè un anno prima della di lui partenza per la Francia, non conoscesse punto la china: Martino Lister inver ancor più acremente, non solo contro Talbor, ma

⁽¹⁾ Dignissimus Dominus Robertus Talbor, alias Tabor, Eques auratus ac medicus singularis, unicus febrium malleus, Carolo II. ac Lodovico XIV., illi M Britanniae, huic Galliae regibus, Serenissimo Delphino, plarimisque principibus, nec non minorum gentium Ducibus ac Domin's probatissimus ec.

⁽²⁾ Histor, plantar, tom. II. p. 1797.

⁽³⁾ Opp. p. 54.

⁽⁴⁾ BAHER l. c. p. 153.

⁽⁵⁾ Opp. tom. II. p. 92.

ben anco contro Sydenbam e Morton (1). Egli raccomandò la china pocò avanti il parossismo, sostenne che una dose della stessa somministata al momento dell'accesso; agises più efficiacemente di dieci prese negl' intervalli apiretto. Dileggiò Morton, di quale, essendo stato introdotto da Talbor l'uso di dosi generose e da abbondanti, argui che la china fosse allora in gran parte falsificata; e schervila maramente Sydenham, perchè avea abbracciato il mentodo del ciarlatano Talbor (2).

"Parimente il famoso chimiatrico Tommaso Willis reine una particolare condotta riguardo al nuovo rimedio (3). El pare che nel 1665. non lo avesse anocra sperimentato perchè accenna indeterminatamente una certà polvere proveniente dall' lindie ed utile nelle febbri intermittenti (4): Mai immediatamente, in uu' aggiunta alla seconda-edizione pubblicata l'anno seguente, riferì, che la corteccia era alhora frequentemente usata contro. la quartana. Non proferisce tuttavia un giudizio favorevole sulla medesima, ed opina, ch' essa possa arrestare benà la fermentazione della febbre, ma non dissipare assolutamente quest' ultima. E nella terza edizione dello stesso libro comparsa l'amo 1762. confessa sinceramente, che nessuna teoria è sufficiente a spiegare l'azione e gli effetti della china, e che in ciò conviene attenersi all'esperienza.

24. Questa persuasione divenne ben presto universale. Ognuno s'avvide, che nè il sistema Galenico nè alcun

⁽¹⁾ Storia della medicina, Sez. XII. §. 85.

^{1 (2)} Exercitation, medicin. de cortic. Peruv. exhibendi tempore, p. 129.

⁽³⁾ Storia della medicina , Sez. XII. §. 81.

⁽⁴⁾ Diatribae duae de fermentatione et febribus 1659.

altro indicara il vero modo di agire del nuovo rimedio, e che per conseguenza non conveniva allontanari dall'esperienza. Raimondo Restauraud, nativo di Pont-Saint-Esperi nella Linguadocca, professore di Monpellieri, diede sila luce en (681. una pregevole memoria sulla chiana (1), dove rillette singolarmente, che la corteccia per mostrarsi attiva non abbisogna di produrre evacuazioni; che queste fanna d'onlinàrio peggiorare, le internittenti, e che la corteccia medesima serve a guarire anche le affezioni succedagee delle internittenti, non che diverse in figammazioni e jintonii billosi.

Fra i medici tedeschi Gio. Corrado Peyer fu quasi il primo ad impiegare la china (2). Egli la univa col. l' estratto di trifoglio, ed avverti che, per prevenire le recidive, convien riprendere la stessa dose in capo ad otto giorni dopo la cessazione della febbre (3).

Alcuni partigiani della setta chimitarica, che non potevano negare la grande efficacia del nuovo rimedio, cercarono di adattarvi il loro sistema, attribuendo alla corteccia la facoltà di evaporare la fermentazione acida che costituisce l'essenza della febbre. Tale fu l'opinione di Jacopo Minot, di cui ho, gii fatto altrove menzione (4). Anche Gaspare Bravo de Sobremonte Ramirez, professo-

⁽¹⁾ Hippocrate de l'usage de Kinkina pour l'usage del fieores. Lyon 1681. 12 V. Blechy zodiac. med. gall. ann. IV. p. 164.

⁽²⁾ Storia della medicina, Sez. XII. S. 45.

⁽³⁾ Ephemer. natur. curios. dec. II. ann. IV., ob., 102. p. 201.

⁽⁴⁾ Storia della medicina, Sez. XIII. §. 95.

re in Valladolid, e 'primo medico della corte di Spagna (1), non che il chimiatrico Michele Angelo Audrioli (2), testificano assai favorevolmente la straordiuaria attività della china nelle febbri intermittenti, anche le più pericolose. Guglielmo Cole (3¹, seguì intorno a ciù 31 parere di Restaurand.

a5. In quell'anno medesimo, in cui Talbor, parù per Parigi, il dotto antiquario Jaspo, Spou (f) diced alla luce, senza il proprio nome (5), um istruzione sull'uso della china nelle intermittenti, dove specialmente raccomanda di unite la china colla centaurea e coll'oppio, premettendo talvolta un purgante, prendendola sempre negli intervalli apirettici, e ripetendone la stessa dose di poi, onde prevenire la recidiva. Prefert la forma fluida, in ispezialtà quella dell'infusione vinosa, a qualsivoglia altra, e le attribui molta efficacia anche nelle, febri remittenti e perfino nelle etiche. Abbracciò in seguito il pastito di Talbor (6), col di cui metodo asserì doversi temere assai meno le recidive.

(1) Consultationes medicae. Colon. 1671 4.

(2) Ench rid. med. pract. p. 229. Storia della med. Sez. XIII. §, 61.

(3) Storia della medicina Sez. XIV. §. 18.

(4) N. a Lion 1647. viaggiò in Levante, e m. 1685. a Vavay presso Ginevra, dopo la rivocazione dell'editto di Nantes.

(5) Traité de la guerison de la fièvre par la Quinquina. Lyon. 1679 12: BLBONY attribuisce quest opera ad un medico di Lione Zodiac. med, gull. ann. II. p. 5.

(6) Observations sur les fievres et les fibrifuges.

Poco dopo l'arrivo di Talbor a Parigi, Nicola de Blegny (i) rende pubblico il sno arcano contro le febbri intermittenti e remittenti, composto d'oppio, di china e di sale di vipera (2). L'effetto però non potea corrispondere agli elogi, e dovea necessariamente cadere in obblio la proposta preparazione siccome pretendevasi ch' essa dissipasse la fermentazione acida, da cui dipende la febbre, Moaginot medico Parigino seppe apprezzare giusta; mente tutti i diversi metodi co quali si avea tentato di nasconder la china e di darle la forma di un medicamento segreto (3). Inculca di non mescolare colla corteccia sostanza alcuna capace di scemare la virtù proponderante della medesima; ritiene sufficiente la dose di due once per vincere le ordinarie intermittenti negli adulti, e preferisce ad ogn' akra forma l'infusione vinosa. Fonda la teoria dell'azione sull'efficacia del rimedio contro la fermentazione acida, nel che la china rassomiglia alla centaurea (4).

26. Gio. Adriano Elvezio (5), onde prevenire gl' inco-

⁽¹⁾ Storia della medicina Sez. XIII. §. 64.

⁽²⁾ Zodiac. med. gall. ann. II. p. 81.

⁽³⁾ Ivi p. 163.

⁽⁴⁾ Ivi p. 169.

⁽⁵⁾ Padre di Claudio Adriano ENTERIO, di cui è è fatta menzione altrove (vol. VII. Sez. XII. S. 54 87), e figlio di Gio. Federico primo medico del principe d'Orange. Gio. Adriano n. a Graveuhang. nel :1661. e si rendette talmente celebre coll aver introdotta l'ipecacuana in Parigi; che ottenne il posto di medico di corte e di direttore degli ospitali di Fiandra. m. 1727.

modi, sui talvolta arreca la china presa internamente, propose di applicarla ne cristei combinata coll'oppio, affinchè non potesse sortire à facilmente (1). Michele Bernando Valentini cercò di perfezionare questo metodo(2), e di diffondere vienmaggiormente l'uso di questo rimedio nella Germania, segueudo il metodo di Poyer (3); locchè però non potè ottenere una riuscita corrispondente al desiderio, stantechè Stall e i suoi seguaci, come già vedemmo (5, 43.), cercarono col loro sistema di convalidare vienmaggiormente gli antichi pregiudizi contro questo finedio.

Anche in Italia Bernando Ramanaini col- suo grande ascendente, e con alcuni argomenti di qualche rilitavo, mpedì l'uso più generale della china (á). Egli osservò in un tifo epidemico accompagnato da vermi, quanto potesse nuocere la corteccia, ogni qualvolta viene presettia scaza le più esatte indicazioni (5). Essa non giovò nemaneno in un'altra epidemia accompagnata da petecchie,

⁽¹⁾ Methode pour guerir toute sorte de fièvres sans rien prendre par la bouche. Paris 1694 12.

⁽²⁾ N. a Giessen 1657. Januar professore, e mort del 1729.

⁽³⁾ Polycresta exotica in curandis affectionibus contumacissimis probatissima Francfor. 1700. 4

⁽⁴⁾ N. 1633 a Carpi presso Modena, fu nel 1632 professore in quest ultima città, e nel 1700... a Padoca, nol qual anno divento perfettamente cieco. In capo ad oti anni, il Senato Veneto lo nomino presidente, del Collegio medico di Venezia. m. del 1714.

⁽⁵⁾ Constitut, epidem. Mulin. Opp. p. 149 Genar.

in cui all'incontro riuscirono utili piuttosto gli acidi (i). Queste esperienze determinarono Ramazzini a scrivere un trattato particolare sull'uso del nuovo rimedio, dove opina, che la china non operando dleuña evacuazione, servia unicamente a sopprimere le intermitenti, e che in queste come anche nelle remittenti, diminuisca le forze, ed arrechi nocumento, anzichè vantaggio (2).

A sì fatti pregiucizi s'oppose con energia un medico di Venezia, Bernardo Zendrini, la di cui operetta e certamente uno de' migliori trattati comparsi fin allora intorno a quest' argomento (3). Credette, è vero, anch' egli, che le intermittenti provengano da viscosità degli umori cagionata dalla bile , e solubile soltanto mediante l'uso della china. Tuttavia attenendosi fedelmente all'esperienza. fece vedere, ch'essa agisce con maggior certezza ed efficacia presa in sostanza, e che può riuscire del parì utile in altre malattie periodiche, segnatamente nell'epilessia. Egli prescriveva dosi assai generose, cioè ne faceva prendere fino due dramme ed anche un'oncia tutt'ad un tratto, e credeva che ne abbisognassero almeno due o tre once per curare radicalmente una febbre. Suppose in oltre, che la china introdotta dapprincipio fosse più attiva di quella usata a' suoi tempi.

Parimenti Antonio Vallisnieri confutò fondatamente i pregindizi di Ramazzini, e raccomando la china espressamente nel tifo (4), nell'idea però di condensare colla

⁽¹⁾ Ivi. p. 200 201.

⁽²⁾ Ivi p. 218. 238.

⁽³⁾ Trattato della China China, con una prefusione intorno a pregiudizi, che corrompono l'arte medicinale col modo più severo d'apprenderla. Venezia 1705. S.

⁽⁴⁾ Storia della medicinu Sez. XII. §. 184.

virtù astringente della medesina il sangue, da lui supposto nelle febbri maligne in istato di estrema dissoluzione (1).

Ma sopra ognaltro merita encomi il celebre e valente Francesco Torti, professore di Modena e medico del duca, che ci ha lasciato un' opera veramente classica sul trattamento delle intermittenti perniciose e maligne (2). Imperocchè non si avea osato finora di prescrivere costantemente la china in quelle perniciose e larvate, stante la fallace apparenza di alcuni sintomi. Torti però riconobbe finalmente la vera indole di quelle terribili malattie facendo vedere, che la china è l'unico spediente e rimedio con cui il medico possa strappare'l' ammalato dalle mani della morte, d'altronde inevitabile. Egli determinò esattamente le controindicazioni della corteccia nelle febbri continue, nelle etiche ed anco nelle periodiche, dove cagioni speciali ed evidenti hanno prodotto uno stato complicato. Indicò con maggior attenzione e cautela i momenti, nei quali, secondo la diversità dei casi, debb'essere somministrata la china; e dimostrò cogli esperimenti, che nelle intermittenti larvate o perniziose non si ricorre mai abbastanza presto a questo sovrano ed eroico rimedio. Riguardo alla dose, egli la diversificò secondo la diversità delle febbri. Per la cura d'una periodica semplice e henigna la limitò ad un' oncia, prendendone poi per otto giorni successivi ogni mattina mezza dramma, onde prevenire la recidiva. All' incontro nelle maligne ne ordina-

⁽¹⁾ Esperienze ed osservazioni spettanti all'istoria medica e naturale. Venezia 1720. 4.

⁽²⁾ Therapeutice specialis ad febres quasdam perniciosas, Mutin. 1712 4.

va dapprincipio mera oncia, indi interpolatamente una dramma alla volta, e nelle remittenti proporzionava la dose alle remissioni, preferendo in queste la tintura alla polvere. Finalmente additò il modo d'usarla anche in cristei, ed attesta d'avere sperimentato questo metodo avanti l'Elvzio.

27. S'apprese di poi ad impiegare la china anche in latre malatite, fuori delle internitienti. Sydenham fit il primo a tentarla nella podagra, e confessa d'averla trovata sommamente utile, per impedire il troppo sollecito ritorno dei parossimi (1). Held la denominò perfino un divino rimedio nella podagra (2). Ramazzini (3) e Lanzoni la sperimentarono nel tifo accompagnato da vermi. (4), e le attributiono una virti antelmittica. Riccardo Mortona la ordinò nella dissenteria avente i caratteri del tifo (5), combinandola coll'oppio; mescolanza approvata in sequito anche da Pringle (6). Mortona la prescrisies anche nell'emottisi, ogni qualvolta essa gli sembrava dipendente da atonia degli organi digerenti (7); e Gio. Corrado Branner (8) ne confermò i vantaggi in si fatta malattia (9).

- (1) Tract. de podagra, Opp. p. 314.
- (2) Ephem. nat. curios. cent. III. IV. p. 385.
- (3) Constit. epidem. Mutin. Opp. p. 151.
- (4) Opp. tom. II. p. 398.
- (5) Ivi p. 237.
- (6) Diseases of the army, p. 274.
- (7) Phisiolog. lib. III. c. 5. Opp. tom. I. p. 130.
- (8) Storia della medicina, Sez. XII. §. 125.
- (9) De glandulis in duodeno repertis, p. 101. Hetdelf. 1787. 4.

Il primo la raccomandò anche nel vajuolo, ma nel terzo stadio affine di promuovere la suppurazione (1); e Alessandro Monro, Gio. Wall. (*) ed Huxham la ordinarono come un potente antisettico nel vajuolo maligno, fin dal primo stadio (2).

Sembro che Hans Sloane sia stato il primo à tentare la china nella cangrena (3); ma questa scoperta viene attributa commenemente ad un chirurgo di Northampton, per nome Gio. Rushworth, il quale però adoprava la china soltanto in quella specie di cangrena, che si manifesta talvolta per una conseguenza delle febbri intermittenti (4). Gio. Douglas, Gio. Shipton (5) Rob. Grindall, (G), Paolo Amèdeo Werhloff (7) è Lorenzo Heistero la impiegarono anche in altri casi di cangrena astenica (8).

Verso la meta del secolo diciottesimo Gusmano Galeazzi e Paolo Amed. Werhloff continuarono le impareggiabili ed importanti ricerche di Torti. Il primo estese le osservazioni del professor modanese anche ad altri casi di febbri perniciose e larvate, e dimostrò che la china vin-

⁽¹⁾ Opp. tom. III. p. 185.

^(*) Lesar estrath delle transazioni filosofiche, vol. III. p. 142 IV. p. 5.

⁽²⁾ Opp. tom. II. p. 142. ed. REICHEL.

⁽³⁾ MURRAY appar. medicam. tom. I. p. 909. cd.

⁽⁴⁾ Proposal for the improvement of surgery. Lond. 1732. 8.

⁽⁵⁾ LESEL l. c. vol. p. 272.

^{. (6)} Ici vol. IV. p. 391.

⁽⁷⁾ Commerc. literar. Noric.' ann. 1735. p. 4.

⁽⁸⁾ Institut. Chirurg. p. 321.

ce parimenti le affesioni asmatiche, colleriche e simili cuando si associano alle febbri intermittenti. Trov poi, che nella diarrea biliosa periodica, la corteccia non riesce tanto utile, come quando viene unita alla cascarilla. S' allontano dal metodo del Torti riguardo alla dose, che ci prescriveva oltremodo generosa, mentre non gli bastava sovente una libbra di china per togliere una febbre intermittente ostinata (1).

Paolo Amed. Werlhoff, uno de più insigni medici del suo tempo, espetto antiquario e poeta non volgare (2): si procacciò una speciale riputazione colle suo esservazioni sulle febbri intermittenti, e sull'uso della china nelle medesime (*). Confutò le obbiezioni degli Stahliani, e provò che le indisposizioni succedance dipendono dal non averimpiegato in tempo e nella dovuta quantità l'eroico rimedio, aggiuguendo, che le recidive seguono opoche determinate, e che cedono unicamente sotto la dose stessa necessaria per la cura della febbre primitiva.

28. In appresso s' imparò a meglio conoscere i principi costituenti della china e a stabilire le forme più confacenti per somministrarla. Arturo Lee fu il primo a in-

⁽¹⁾ De Bonon. scient. institut, comment. vol. V, P. II. p. 216.

⁽³⁾ N. in Helmstadt 1699. It, primo medico in Hannover del 1740 m. nel 1767. Le sue poesie comparvero alla luce con una prefazione d'Haller nel 1756. Gro. Ern. Wichmann pubblicò tutte le di lui opere nel 1773 Veggasi intorno la di lui vita, Comment. Lips. vol. XIV. p. 703.

^(*) Observationes de febribus, precipue intermittentibus. Hannov. 1732. 4.

dicare l'esistenza d'un olio etereo, che si estrac in parte col mezzo d' infusione calda (1). Tommaso Percivall esaminò dappoi le diverse forme della corteccia. Considerò l'infusione acquosa come la forma più attiva, perchè in essa viene niù nero il precipitato di ferro. Calcolò soprattutto la combinazione de' principi gommoso e resinoso, e trovò eziandio utile l'aggiugnervi qualche aroma (2). Biasimò la decozione, perchè la bollitura fa svaniré l'olio etereo (3), ed all'incontro lodò l'infusione nel vino, perchè questo estrac le particelle più attive (4). Opinò anche giustamente, che la china non abbondi di sostanza astringente, e che quindi da essa non dipenda la principale sua efficacia (5); opinione confermata da Gugl. Heberden, che nego direttamente la facoltà stittica alla cortcooia medesima (6). Andr. Bern. Kirchvogl nego, che la china ostruisca o ristringa, mentre anzi dissipa il più delle volte felicemente quelle ostruzioni procedenti da debolezza (7). L'opinione di Percivall risultò ben fondata in parte dagli esperimenti di Enr. Sebast. Bucholz, il quale ritrovò nella scorza di alcune varietà di salci , dell'ipocastano e perfino del ranno volgare (Rhamnus Frangua)

(2) Ivi vol. LVII. p. I. p. 221.

(5) Ivi p. 129.

⁽¹⁾ Philosoph. transact. vol. LVI. p. 95.

⁽³⁾ Essays medical and experimental, p. 72. Lond. 1767. 8.

^{! (4)} Ici p. 87.

⁽⁶⁾ Medical transact. publ. by a college of physicians in Lond. vol. I. p. 469.

⁽⁷⁾ Diarium medico-practicum, p. 19. Vindobon.

maggior quantità di tannino, e per conseguenza considerò queste sostanze più attive della china medesima per resistere alla putrefazione de l'fluidi morti (1). Gius. Jacopo Plenok avendo osservato, che la calamita attrae la polvere di china arguì che questa contenesse del ferro (2). Antonio Brugmans ponfermò l' esperienza del professore Viennese (3), seuta che però o l'uno o l'altro abbia mai pottoto fornire una dimostrazione chimica della proposta asserzione.

29. Dopo la metà del passato secolo, parecchi ececarono di spiegare la virtù antisettica della china con esperimenti instituti fuori del corpo vivente. Gio: Pringle fu
d'avviso, ch'essa debba dipendere dalla quantità di resina e d'olio etereo contenutovi (4). Davide Macbride sostenne essere necessario uno sviluppo d'acido carbonico
mediante una specie di fermentazione, onde allentare la
puttefazione, accordando nulla di meno, che l'effetto provenga principalmente dall'influenza sui solidi (5). Godart
derivò la proprietà antisettica della china dalla virtì corroborante della medesima; e pereiò la usava più arditamente ne' casi di puttefazione originata da debolezza (6).

- (1) Esperimenti chimici sopra alcune moderne sostanse antisettiche. Weimar 1776. 8. (2) Raccolta di osservazioni, P. I. p. 179. Vienna
- 1769. 8.
 (3) Magnetismus, sive de adfinitatibus magneticis.
- (3) Magnetismus, sive de adfinitatibus magneticis, p. 34. Lugd. Batev. 1778. 8.
 - (4) Philosoph. transact. N. 496. p. 525.
 - (5) Experimental essays, p. 139. Lond. 1764. 8.
- (6) Dissertations our les antiseptiques, qui ont concouru pour le prix, propose par l'academie de Dijon, p. 393. Paris 1769. 8.

Gio. Giorgio Hasenhorl (chiamato di poi Lagusi) fu quasi il primo ad impiegarla vantaggiosamente nella febbre petecchiale (1), nel che lo imitò caufamente Carlo Strack (2) E si può eredere, che mancassero forse le vere indicazioni dove Pietro Giona Bergio (3), e Gio. Gustavo. Acrell (4) la trovarono nocevole nell'accennata malattia, e se Adamo Cheont non sòò di prescriverla nella peste (5).

All'incontro Nils Rosen de Rosenstein la sperimentò assai nuile nel vajuolo putrido (6), Jacopo Lind nella febbere gialla (7)», Marcantonio Plenciz nella scarlatina (8), Fr. Penrose nella cinanche cangrenosa (9) Pugh (10) e Riccardo Brocklesby (11) nello scorputo, e Gabriele Lund in una malattia scorbutica de bambini (Noma Linn.) (12)

- (1) Historia medica morbi epidemici, sive febris petechialis. Vindob. 1760. 8.
- (2) Observationes medicae de morbo cum petechiis, p. 246. Carolsh. 1766. 8.
- (3) Vetenskaps academicus Handlingar, for acr 1767. p. 333.
 - (4) Ivi p. 324.
 - (5) Tract. de peste p. 145. Vindob. 1766. 8.
- (6) Underr attelse om Barns-sjukdomar, p. 134. Stoholm 1771. 8.
- (7) Essay on the most effectual means of preserving the healt of seamen, pag. 90. Lond. 1762. 8.
 - (8) Opera phisico-medica, tom. III. p. 100.
- (9) Dissertation of the putrid sore-throat, p. 28. Oxford 1766. 8.
 - (10) Medical observat. and inquiries , vol. II. p. 241.
- (i1) Occonomical and medical observations, p. 301. Lond. 1764. 8.
 - (12) Vetenskaps academ. Handl. f. a. 1765, p. 40.

Finalmente Carlo Bisset (1), Crist. Filippo Herwig (2) Riecardo Pulteney (3) e Gio. Giorgio Schenck becher (4) la vantarono in tutte le malattie putride:

- 30. Fra diversi-metodi proposti per impiegare esternamente la china, ove gli ammalati non la vollerino peis
 soverchia debotza o suscettibilità dello stomaco, quello
 di Sami. Pye eccitò la maggiore attenzione ed ammirazione. A' bambini attaccati da periodiche, da tosse o da difezioni copyulsive egli applicava sopra diverse parti, edin ispezialtà sopra l'epigastrio, in forma di fomento, una
 decozione densa di cortecola (5); metodo, con cui Rosenstein guari se stesso da una terzana (6). Guglielm.
 Alexander decantò i bagni con decozioni di china (7), a
 Gio. Ad. Hemmann curò una febbre putrida, injettando una soluzione di sale essenziale di china nella vene (8).
- Il pregio e l'uso della corteccia andarono sempre più rassodandosi e diffondendosi non tanto per le febbri intermitenti, quanto per innumerevoli altre malattie. I pratici francesi si mantennero a dir vero sempre guardin-
- (1) Medical essays and observat. pag. 78 Lond. 1766.8.
- (2) Select. mcdicamin. rationalis, pag. 38. Jenae 1771. 8.
- (3) Dissert. medica de Chinchona officinali. Edinb. 1764. 8.
- (4) Notizie sugli effetti salutari della china china,p. 59. Riga 1769. 8.
 - (5) Medical observat. and inquiries, vol. II. p. 245.
 - (6) Underrattelse om Barn-sjukdom. p. 323.
 - (7) Esperienze mediche, p. 30 Lipsia 1773. 8.
 - (3) Memorie medico-chirurgiche , P. I. p. 214.

ghi riguardo a questo eroico rimedio; ond'è, che Riccardo de Hantesierk (1) attesta di non aver osato d'impiegarlo in una epidemia di terzane contentandosi di semplici tisano di oicoria, e di qualche dose del sale di Glauber. Ma Felice Asti (2) e Carlo Strack (3) non esitarono di farne uso in tutte le intermittenti gennine, senza la menoma addizione, colla sola differenza della dose, che il primo diminuì , ed il secondo notabilmente accrebbe. Fed. Casimiro Medicus lo riputò indicato in tutte le affezioni periodiche, avvegnachè accompagnate da infiammazioni asteniche (4), e trovô, che combinando colla china una discreta quantità d'oppio, si arriva a diminuire la soverchia suscettibilità pegli stimoli (5). Così Gio. Luigi Loeseke osservò, che la corteccia colla sua virtà corroborante scema la tendenza agli spasmi (6), e And. Stoerk la sperimentò assai vantaggiosa in un' amaurosi periodica (7). Anche nelle febbri semplici remittenti si cominciò ad

(1) Recueil d'observations de medec. des hopitaux militaires, vol. II. p. 517. Paris 1772. 4.

(2) Constituzione delle malattie regnanti in Mantona, p. 20 Firenze 1782. 12.

(3) Observat. medicin. de febr. intermittent. p. 33. Offembach 1785 S.

(4) Raccolta di osservazioni mediche , v., I. p. 452. Zurigo 1764. 8.

(5) Storia delle malattie periodiche, p. 551. Carlsruhe. 1764. 8.

(6) Trattato de medicamenti più scelli , p. 440. Der lino 1755. 8.

(7) Ann. med. I. p. 76 Vindob. 1759. 8.

impiegare con vantaggio la china, quantunque Gio. Vastapani cercasse di farla credere in tai casi grandemente mociva (1). Nelle lente nervose Jac. Sims voleva , che se ne prendessero tre once entro lo spazio di 48. ore (2), e seguirono lo stesso metodo Paelo Valcarenghi per le subcontinue (3) e Guglielmo Grazie per le così dotte febbri pituitose (4).

Giò. Clephane lo usò prima d'ognaltro ne' vizi scrofolosi (5), pratica perfezionata in appresso da Gio. Esthergill (6), Bond (7), Davide van Gesscher (8) e Garlo Giorg, Teod. Kortum (9).

Nils Rosen de Rosenstein tentò pella rachitide non solo la china in polvere , ma altresì il sale essenziale della medesima in pillole (10), e Pietro Crist. Abildgaard

(1) De China-china in synochis putribus animadpersiones. Argentor. 1783. 8.

(2) Observat. on epidemic disorders , p. 270. Lond. 1773. 8.

(3) De praecipuis febribus specimen, p. 210 220. Cremon 1761. 4.

(4) Inquiry into the nature, rise and. progress of the fevers most common in London , p. 218. Lond. 1771. 8.

(5) Medical observat. and inquiries, vol. I. p. 184.

(6) Ivi p. 3o3.

(7) Ivi vol. II. p. 265.

(8) Heedendaagsche oeffnende Heelkonst , D. I. p. 135. (a) Commentar. de vitio scrofidoso , vol. II. p. 120.

Lemgov. 1790. 8. (10) L. c. p. 406, 407.

guari colla china unita al cremor di tartaro una rachitide già degenerata in una vera consunzione (1). Marco Akenside la riscontrò assai efficace nel tumor bianco degli articoli (2), e nelle ulceri cancerose la uni colla cicuta è col mercurio (3). Tommaso Heberden la osservo salutare anche alla lebbra rossa di Madeira (4)', mentre Gugl: Bromfield (5), Mich. Underwood (6), Gio. Jac. van Vy (7) é Beniam. Bell (8) l'applicarono con felice successo nelle ulceri maligne, inveterate e cariose:

Parimenti nella tabe, in cui la suppurazione non è accompagnata da dolori eccessivi o da sintomi di violentà inframmazion, la china o sola o associata a qualche balsamo riuscì utilissima secondo l'esperienze di Ant. de Haen (9), Donaldo Monro (10), Haller (11), Bornainvil-

- (1) Societ. med. Havn. collect vol. I. p. 1.
- (2) Medical transact. published by a college of physic. in London. vol I. p. 104.
- (3) Ivi p. 84. (4) Ivi p. 34:
- (5) Chirurg. observat. and cases, v. I. p. 136. Lond. 1773. 8.
 - (6) A treatise upon ulcers of the legs Lond. 1783. 8. (7) Heelkundige Mengelstoffen , d. II. st. 2. Amst.
- 2786. 8. (8) A treatise on the theory and management of ul-
- cers , p. 247. Edinb. 1778.
- . (9) Rat. med P. III. p. 197.
- (10) Descrizione delle malattie regnanti negli spedali militari Inglesi in Germania , p. 111. trad. da G. WIC-MANN. Altenb. 1766, 8.
 - (11) Opera minora, vol. III, p. 368.

le (1) e Gius. Quarin (2). Il primo la ordinò pure nell'idropisa (3), ed Erasmo Darwin la riputò opportunissima per prevenire le recidive, massime dopo d'aver somministrata la digitale (4).

La china fu finpiegata ultimamente anche nel trattamento delle malattie veneres; pratica dovuta specialmente all'attenzione di Franc. Schwediauer, il quale la raccomando affine d'impedire la stalivazione in que'casi, dove richiedousi le preparazioni mercuriali (5). Quanto poi giovar possa nella cura delle convulsioni asteniche, 1 lo provarono-Rahn, Hirzel (6) e Dejean (7) pei sintomi isterici; Dav. Machride (8) e Jac. Grainger (9) per l'epilessia; Gio: Fil. Aug. Gesner (10) per l'asma periodico;

(1) Journ. de médecine, vol. VXII. p. 421.

(2) Animadversiones in divers. morbos, p. 72. Viennae 1785. 8.

(3) Rat. med. P. XI. p. 290.

(4) Memorie di medicina pubblicate dal collegio dei medici di Londra, vol. III. p. 201.

(5) Practical observations on the more obstinate and invectorate venereal complaints Lond. 1784. 8.-Traite complet sur les maladies syphilitiques, vol. II. pag. 412. 442. Paris, an. XI. 8.

(6) Memorie della società fisica di Zurigo, vol. I. p. 193. 200.

(7) Journal de medec. vol. XXXIV. p. 415.

(8) Methodical introd, into the theory and pract, of physic, sol I. p. 559.

(9) Historia febris anomalae Batavae, p. 212. Edimb. 1755. 8.

(10) Nov. act. nat. curios. vol. IV. p. 37.

Mich. Morris (1) e Gio. Andr. Murray (2) per la tosse canina; Carlo Bisest (3), Gugl. Moseley (4) e Ben, Rusch (5) pel tetano; Anna Carlo Lorry (6) per la melancolia, e Gio. Willemse per la mania (7).

⁽¹⁾ Medical observat. and. inquiries, vol. III. p. 281.
(2) Opusc. vol. I. p. 307.

⁽³⁾ L. c. p. 100.

⁽⁴⁾ Delle malattie regnanti tra i tropici, p. 407. Norimb. 1790. 8.

⁽⁵⁾ Memorie, della società medica di Londra, vol. I, p. 4. vol. II. p. 67.

⁽⁶⁾ De melancholia et morbis melanchol cis, p. 164. Paris 1765. 8.

⁽⁷⁾ Verhandelingen uitgegeven door et hollandsche Maats. der Wetiensch. te Harlem, D. XIV. p. 18.

⁽⁸⁾ Observations on the superior efficacy of the red peruvian bark. Lond. 1783. 8.

⁽⁹⁾ Thom. Skeetes experiments and observations on quilled and red peruvian bark, p. 355. London 1786. 8.

se anche più facilmente solubile che quelle delle altre qualità di corteccia (1). Quindi la decozione di china rossa resiste più a lungo, senza subire una fermentazione acida (2). Il primo scrittore, che ne abbia trattato, ha già rilevato essere sufficiente la metà della consueta dose per ottenere gli effetti contemplati, per arrestare il parossismo vicino delle intermittenti (3), e per vincere felicemente fra queste le più ostinate e pericolose (4). Saunders la prescriveva in infusione fredda, ovvero in polvere a mezza dramma per volta (5). D' allora in poi scrissero intorno alfa nuova corteccia Riccardo Kentish di Edimburgo (6), 'Ral, Irwing (7), Tomm. Skeete (8), e Tonim. Colingwood (9), e contribuirono non solo a confermare i pregi vantati da Saunders, ma eziandio a promuovere viemmaggiormente la conoscenza e l'uso della medesima.

Due anni avanti del 1777. de Badier avea portato in Francia dalla Martinica la corteccia oscura detta di Santa Lucia, ossia 'la china-china Piton. Nel 1780. Anderson ne vide l'albero all'isola di S. Lucia, e dinstituì im-

⁽¹⁾ SAUNDERS l. c. p. 174.

⁽²⁾ Ivi p. 114:

⁽³⁾ Ivi p. 56. 57.

⁽⁴⁾ Ici p. 57. 58.

⁽⁵⁾ Ivi p. 59. 152.

⁽⁶⁾ Experiments and observations on a new species of bark. Lond. 1784. 8.

⁽⁷⁾ Experiments on the red and quill peruvian bark. Edinb. 1785. 8.

⁽⁸⁾ V. alla n. 71.

⁽⁹⁾ Edinb. Commentar. vol. X. fasc. 2. p. 16.

mediatamente delle esperienze nel lazzeretto (1). Davidson riscontrò gli effetti della nuova china affatto diversi da quelli dell'ordinaria, mentre la dose di 20 grasi produceva il vomito (2). Agiva tuttavia efficacemente nelle interinitenti, massime quando vi si mescolava della canelta bianca o qualche altro aroma (3). Martino Vahl. diede a questa specie la denominazione di Cinchona floribunda (4), distinguendola dalla Cinchona caribaca, che mostra le stesse qualità e virth.

In seguito, oltre le specie accennate, furono introdotte anche l'angustura e la china gialla, delle quali ho dato già altrove la notizia e la descrizione (5).

32. In fra gli altri rimedi nessuno ha nguagliato l'oppio nella celebrità che ha ottenuto, specialmente in questi ultimi tempi, e nelle rivoluzioni che contemporaneamente ha suscitato sulle teorie mediche dominanti. Le mutazioni, cui soggiacque da un secolo e mezzo lo spirito del. tempe, non si ponuo meglio riconoscere, che da una succinta serie delle diverse idee, che si succedettero in tanto riguardo all'azione ed agli effetti dell'indicato rimedio.

Appartiene incontrastabilmente alla scuola chimiatrica del secolo diciassettesimo il merito d'aver universaliz-

⁽¹⁾ ROZIER observations sur la physique, tom. XXXIV.

p. 129.

⁽²⁾ Philos. transact. vol. LXXIV. p. 453.

⁽³⁾ Kentish l. c. p. 79.

⁽⁴⁾ Skrivter of Naturhistorie Selskabet, vol. I. p. 21. 23.

⁽⁵⁾ V. il mio Quadro storico della medicina negl: ultimi dieci anni , pag. 67. 205. 276. 363.

zato l' uso dell' oppio, cui i Galenici attribuirono una facoltà refrigerante e condensante gli umori. Ho già accennato altrove (1) ch' Elmonzio è stato il primo ad ascrivergli una virtù riscaldante e corroborante; che Silvio lo prescriveva frequentemente unito ai sali volatili (2), che altri chimiatrici lo impiegarono o nella dissenteria e come l'Andriolli , o nelle intermittenti , come Minot (3). Giorgio Volf. Wedel coerentemente ai principi di questa scuola raccomandò l'oppio qual alessifarmaco, e ne derivò l'attività da un elemento volatile da lui detto , secondo l'usanza di que'tempi, ora mercurio, ora zolfo (4). E del pari Tommaso Willis (5) e Giorgio Horst (6) verso la metà dello stesso secolo, senz'allontanarsi punto dallo spirito della chimiatria, supposero nell'oppio una particolare virtà febbrifuga, quantunque il primo non abbia mancato d'indicare i dannosi effetti, che talvolta ne ridondano sugli organi della digestione e della respirazione. Fra questi amici dell' oppio si distinse meritamente e singolarmente Mich. Etmullero, sostenendo egli prima d'ognaltro con precisione l'azione stimolante del medesimo, e facendo vedere, ch'esso accelera il polso e la ciicolazione dei fluidi, che accresce il calore e la traspirazione, e che giova in tutte le malattie procedenti da ve-

⁽¹⁾ Storia della medicina, Sez. XIII. S. 27.

⁽²⁾ In §. 49.

⁽³⁾ Ivi S. 62. 65.

⁽⁴⁾ Opiologia. Jen. 1674. 4.

⁽⁵⁾ Pharmaceutice rationalis, tom. I. p. 100.

⁽⁶⁾ Complem. ad lib. II. epist. et consultat. Heilbronn. 1631. 4.

ra debolezza, come nella tabe (1). Indi un altro allievo della scuola chimiatrica ebbe il merito d'aver enunciati i fondamenti (2), per cui l'oppio agisce sui solidi anzichè sugli umori, e dee essere considerato per un vero . alterante; confessando tuttavia che l'odore del medesimo viene comunicato al sudore e all'orina (3).

33. Verso il fine del secolo diciassettesimo l'oppio prese voga anche fra gli avversari del sistema chimiatrico, dei quali si distinsero specialmente Gio. Bohn (4), Tomm. Sydenham , Fed. Hoffmann (5) , e Riccardo Morton. Sydenham descrivendo la dissenteria epidemica degli anni 1669 - 1672. dà la ricetta per comporre il suo laudano, ed esalta grandemente i pregi dell'oppio (6). Ecco come egli si esprime : « Et profecto non hic mihi tempero, » quin gratulabundus animadvertam , Deum omnipoteny tem wayray dornes saw non aliud remedium quod vel » pluribus malis debellandis par sit, vel eadem efficacius, n extirpet, humano generi, in miscriarum solamen conn cepisse quam sunt opiata, medicamenta scilicet ab ali-» qua papaverum specie desumpta. - Quinimo ita neces-» sarium est in hominis periti manu organum , jam lau-» datum medicamentum, ut sine illo manea sit, ac clau-» dicet medicina; qui vero eodem instructus fuerit, ma-» jora praestabit, quam quis ab uno remedio facile spe-

⁽¹⁾ Diss. de vi opii diaphoretica. Lips. 1679. 4.

⁽²⁾ Storia della medicina, Sez. XIII. §. 79. n. 54. (3) Mysteries of opium , pag. 93. 94. Lond. 1700. 8.

⁽⁴⁾ De officio medici duplici. Lips. 1704. 4.

⁽⁵⁾ Opp. tom. I p. 113.

⁽⁶⁾ V. più sopra Sez. XV. S. 77.

» raverit. Rudis enim sit oportet et parum compertam ha-

» beat hujus medicamenti vim, qui idem sopori concilian-» do, demulcendis doloribus, et diarrhaeae sistendae ap-

» plicare tantum norit, cum ad alia plurima gladii instar

» Delphici accomodari possit, et praestantissimum sit re-

» medium cardiacum, unicum pene dixerim, quod in

» rerum natura hactenus est repertum. » Morton lodò l'oppio specialmente pel vajuolo qual alessiterio (1), e lo riputò atto a togliere il ptialismo e a-promuovere la suppurazione (2).

Antonio Vallisneri ha manifestato intorno a ciò una sua idea originale, che trovasi del tutto corrispondente alle teorie de nostri giorni. Nella sua difesa della china sostiene, che collo spirito di vino e cogli stimoli volatili si può prevenire gli stravasamenti di bile, anzi coll'oppio impedire sovente lo sviluppo della febbre biliosa (3).

34. Si cominciò avanti la metà del secolo passato ad impiegar l'oppio nelle infiammazioni , specialmente d'indole astenica; ma si ripetè l'azione antiflogistica del medesimo da principi falsi , nè si conobbe per lungo tempo la vera natura di quelle infiammazioni , nelle quali riesce giovevole l'indicato rimedio. Gio. Hustham fu il primo a prescriver l'oppio non solo nelle infiammazioni asteniche, ma ben anco nelle altre , dopo le copiose missioni di sangue, affine di moderare l'intensità del dolore (4). Egualmente Ant. de Haen cercò di vincere quest'ultimo col-

⁽¹⁾ Opp. tom. III. p. 119. 120.

⁽²⁾ Ivi p. 150.

⁽³⁾ Opere fisico-mediche, tom. III. p. 370. Venez. 1733. fol.

⁽⁴⁾ Opp. vol. H. p. 228.

l'oppio unito all'olio di lino (1). Ma era riservato a Mich. Sarcone il merito di determinare il carattere dell'infiammazione, che richiedeva l'uso dell'oppio, com'è appunto l'astenica e la convulsiva sintomatica (2). Roberto Butler Remmet ordinava l'oppio quasi in tutte l'infiammazioni, perchè le supponeva tutte accompagnate da uno spasmo, che stringesse i vasi riconducenti (3). Parimenti Carlo Giuseppe Wirtenshon attribuì all'oppio un'azione antiflogistica, nell'idea ch'esso tolga gli ostacoli che impediscono o frastornano la regolarità della circolazione (4). Roberto Hamilton cominciò ad impiegare il mercurio dolce nelle infiammazioni asteniche dei visceri . aprendo per tal modo un nuovo sentiero onde giungere felicemente alla cura di queste malattie sì pericolose (5). Nella Germania Arr. Felice Paulitzky fu il primo che abbia sperimentata l'utilità dell' oppio nelle infiammazioni asteniche, massime reumatiche (6). Tuttavolta la maggior parte dei medici rimase ligia ai pregiudizi sparsi da Giorgio Young (7) e da Bald. Luigi Tralles (8), i quali

(1) Rat. med. P. I. p 24.

(2) Storia delle malattie di Napoli P. I.

(3) Edinb. Commentar. vol. II. p. 17.

(4) C. L. HOFFMANN opusc. latin. ed. CHAPET, p. 265. Monast. 1789. 8.

(5) E dinb. Commentar. vol. IX. p. 1.

(6) Osservazioni medico-pratiche, v. I. p. 39. Fref. 1784. 8.

(7) Treatise on opium, founded upon practical observ., p. 142. Edinb. 1753. 8.

(8) Usus opii salubris et noxius, sect. II. p. 210.

opinarono, che l'oppio non possa vincere alcuna infiammazione, perchè accresce l'ostruzione, da cui secondo l'ipotesi di Boerhaave dipende l'infiammazione medesima.

Percivall Pott. combinò l'oppio col muschio nella cura d'una specie particolare di cangrena che si manife sta ne' vecchi, qual conseguenza di debolezza indiretta (1). E Crist. Fed. Michaelis narra diversi esempl, i quali dimostrano la somma e straordinaria efficacia di questo rimedio, non solo nella cangrena, ma ben anco in tutte le nleeri icorose (2). Tomm. Kirkland ne limitò l'uso a que' casi, dove predomina un'acrimonia nodamentale degli umori (3) Grant lo trovò assai efficace anche nella cangrena 'de' piedi, cagionata da intirizzimento (4), e Lod. Mursima nella carie dipendente da fratture delle ossa (5).

L'accidente ha guidate alcuní medici dell'Anerica calla mira di alleviare i dolori e di togliere l'eccessiva veglia; locchè ottennero di fatti ed arrivarono anche a cacciare interamente i sintomi venerei (6). Poco appresso comparvero altri panegiristi di questa sostanza medicamentosa, e fra gli altri Feder. Michaelis asserì, che l'oppio nella sifilide ne ristringe il corpo, nè produce sonuo, mentre agisce anzi come aperiente, promuova le secrezio-

⁽¹⁾ Opere chirurgiche, vol. II. p. 538.

⁽²⁾ Richter, bibliot chirurgica, vol. V. p. 116.
(3) Thoughts on amputation, p. 112. Lond. 1780. 8.

⁽⁴⁾ Journ. de medecine, vol. LXXXII. p. 134.

⁽⁵⁾ Osservazioni medico-chirurgiche, coll. 2. Berlino 1783. 8.

⁽⁶⁾ Gio. Dar. Schoppe degli effetti dell' oppio nella lue venerea. Erlang. 1781. 8.

ni del sudore, dell'urina e della saliva, e dissipa radicalmente ogni affezione sifilitica (1); e Gio. Clem. Tode appoggiato all'esperienze sue proprie e a quelle di Sibbern, sostenne di poter vincere la lue venerea col solo oppio e senza l'aggiunta d'alcuna preparazione mercuriale, perocchè scemandosi le pulsazioni; prorompono abbondanti sudori (2). Grant però (3), e Andr. Gio. Hagstrom (4) ritennero giustamente l'uso dell' oppio per certi casi di sensibilità esaltata, riservato così al mercurio l'onore della maggiore attività nella cura dell'accennata malattia.

35. A dir vero le eccellenti riflessioni di Sydenham sulla virtù cardiaca dell'oppio, dovea fissare ben prima la universale attenzione sulle proprietà stimolanti del medesimo e farlo sperimentare più frequentemente nelle arterie. Ma la maggior parte dei medici non osava contraddire all' Ippocrate Inglese, ed allontanarsi dalle di lui prescrizioni in tale articolo di pratica medica. Di questo avviso mostrossi segnatamente il sullodato Tralles, dacchè. Crist. Amed. Ludwig avendo dimostrato l'azione eccitante dell'oppio stesso, lo paragonò al vino (5); perlochè il primo , negando l'asserzione del secondo , lo risguardo unicamente per un ottimo cardiaco, anziche per un corroborante o stimolante (6).

⁽¹⁾ RICHTER bibliot. chirurg. vol. VI. pag. 140. 737.

⁽²⁾ Acta societ. med. Havn, tom. I. p. 424. 430. (3) Journ. de medecine , l. c.

⁽⁴⁾ Vetenskaps Acad nya. Handling f. a. 1784. p. 34.

⁽⁵⁾ Advers, medico-pract. val. III. p. 504.

⁽⁶⁾ De vi opii cardiaca ad Lupwie responsio. Vratisl. 1771. 4.

Gio. Pringle argui dalle sue esperienze instituite ne' fluidi morti, che l'oppio arresta fin anche la purtefazione (1); e perciò Gio. L. L. Loeseke lo raccomandò in ogni malattia acuta, dove puossi temere qualche degenerazione degli umori (2). Giorgio Young però determinò più precisamente codesta azione dichiarandola per una conseguenza del rigore ristabilito, e quindi giudicò nocivo il rimedio in quistione nei casi, dove un orgasmo troppo violento favorisce anzi la tendenza alla mentovata alterazione dei fluidi (3).

Vedemmo già a suo luogo, che Talbor univa l'oppio alla china, dove questa sembrava troppo inattiva, e nelle febbri intermittenti asteniche, per le quali erano indicati gli stimoli volatili; ond'è, che a torto a'arrogo Berryat il ritrovamento di sì fatto metodo (4). Robo-Whytt trovò assai utile - corroborante l'oppio ne'casi di debolezza e nella maggior parte delle malattie periodiche (5). Tissot poi, che gli attribul la facoltà di favori re la putrefazione, confessava tuttavia, che niente di più adattato poteva-prescriversi nel vajuolo astenico, massime se nello atesso tempo si applicano i vescicatori (6); vantaggi comprovati di recente anche da Gr. Gugl. Hus-

⁽¹⁾ Philosoph. transact. N. 496. p. 525

⁽²⁾ Trattato de' medicamenti più scelti, p. 573.

⁽³⁾ Treatise on opium, p. 150.

⁽⁴⁾ Mem. presentes à l'acad. des sciences vol II. p. 254. Paris 1755. 4.

⁽⁵⁾ Scritti pratici , p. 498. 607.

⁽⁶⁾ Oewres complettes, vol. VI. p. 224. 225. Lausann. 1784. 12.

feland (1). Martho Wall lo impiego qual eccitante nelle febbri asteniche, dove riescono nocive l'evacuazioni di qualsivoglia genere (2).

36. La teoria sulla vera azione dell'oppio non potea a meno di fare dei progressi in questi nltimi anni, a minara che se ne andavano scoprendo i principi costiuenti, e si consideravano più attentamente i vantaggi del medesimo nelle diverse malattie. Carlo Gianella tornò a paragonare gli effetti del vino, per indi illustrare le altre conséguenze sensibili dell'indicato rimedio (3). E Giorgio Young pretese, che l'oppio giovar possa nelle emorragie, attesa la proprietà stimolante, per cui i vasi si contraggono con maggior consistenza ed energia (4).

Quasi tutti gli scrittori del secolo decimottavo convenero nel credere, che l'oppio agissa piuttosto sin nervi e sulle parti riritabili di quello che su'i fiudi. Alaton sostenne prima d'ognaltro questa proposizione, e provò che l'oppio accelera il polso e produce anco delle convulsioni, ma che in seguito s' allenta l'uno e svaniscono le altre succedendo in vece delle congestioni di umoti, la di cui esistenza si riscontra col mezzo dei microscopi melle rane (5). Parimenti Rob. Whytt cercò di dimostra-

⁽¹⁾ Riflessioni sul vajuolo regnante a Veimar, p. 137. Lipsa 1789. 8.

⁽²⁾ Osserv. pratiche sull'uso dell'oppio nelle febbri nervose. Altenb. 1789. 8.

⁽³⁾ Trattato di medicina preservativa, pag. 123. Verona 1751. 4.

⁽⁴⁾ L. c. p. 73.

⁽⁵⁾ Medical essays and observat. of Edinb. vol. V.p. 152, 154.

re co' suoi esperimenti, che questa sostanza medicamentosa opera immediatamente sui nervi senza l'intervento degli umori, e che l'azione sul cuore dipende dai primi, perchè, distrutta la midolla spinale nelle rane, il moto dell'accennato viscere diventa di gran lunga più debole e lento (1). Rammenta però Haller, che l'irritabilità del euore negli animali cotanto martirizzati trovasi già dopo la morte del tutto esaurita, e che Whytt non dovea contentarsi dell'applicazione esterna. Tuttavolta il primo sembra già in più luoghi persuaso della proprietà stimolante dell' oppio (2). Aless. Monro è d'avviso, che gli umori ne assorbano il principio volatile, imponderabile (3), quello appunto che costituisce l'attività precipua del rimedio, e che secondo Ricc. Mead (4), attacca i filamenti nervosi ; opinione abbracciata da parecchi scrittori del secolo passato, ed in ispezialtà da Bald. L. Tralles. La voluminosa di lui opera non giovò a dir vero gran fatto alla terapeutica, ma è tuttavia commendevole e pregevole , perchè comprende un'intera ed accurata critica delle diverse opinioni sugli effetti dell' oppio (5). Ch' esso acceleri originariamente la circolazione, che riscaldi ed attenui il sangue (6), che in apresso deprima le forze per

⁽¹⁾ Nuove esper. ed osserv. della società med. de Edinb. P. II. p. 316 352.

⁽²⁾ Comment. societ. Gotting. vol. II. p. 154. Elem. physiol. vol. V. p. 609.

⁽³⁾ Nuove esperienze ed ossero. della soc. d'Edimb. P. III. p. 321.

⁽⁴⁾ De venenis, p. 254.

⁽⁵⁾ Usus opii salubris et noxius, s. I. p. 56.

⁽⁶⁾ Ivi p. 67. 68.

l'indole sua stimolante, volatile, ed affievolisca principalmente il ventricolo (1); che il principio più attivo sia quel vapore volatile che attacca i nervi e scema la coerenza del sangue (2); ecco le proposizioni fondamentali della sua teoria. Abr. Kauw Boerhaave confermò l'azione debilitante dell'oppio sugli organi digerenti (3); e Domen. Leonelli l'assottigliamento del sangue (4).

Malgrado tanti fatti, i quali mettono fuori d'ogni dubbio la proprietà eccitante dell'oppio, quasi tutti imedici anteriori a Brown supponevano, ch'esso fosse realmente un sedativo, e che l'apparente eccitamento della circolazione e dei nervi dipendesse unicamente dall'aver dissipato gli ostacoli della cute, mediante l'accresciuta traspirazione. Tale fu il parere specialmente di Carlo Gius. Wittensohn (5). E Gio. Adr. Teod. Sproegel argomento dalle sue esperienze, che l'oppio [in origine deprima la foran nevosa, diminuisca la mobilità dell'iride e distrugge le facoltà digerenti (6). Non altrimenti opinò de la Guerenne, il quale gli attribuì la proprietà di accres cere le pulsazioni e di calore allora soltanto, quando calma gli spasmi che impediscono e l'uno é le altre (7). Fi-

⁽¹⁾ Ivi p. 105. 140.

⁽²⁾ Ivi p. 159. 175.

⁽³⁾ Impetum faciens, p. 402. 403.

Nuova raccolta d'opuscoli seientifici e filologici,
 V. p. 67.

⁽⁵⁾ C. L. HOFFMANN, opusc. latin. l. c.

⁽⁶⁾ Experimenta circa varia venena, in HALLER dissert. pract. vol. VI. p. 557. 560.

⁽⁷⁾ Hist de la societé de medec. de Paris, an. 1782. p. 250.

nalmente Rob. Buttler Remmet, ed Ever. Gio. Thomassen a Thuessink riconfermarono l'azione sedativa immediata del medesimo sui nervi (1).

Gio. Leigh fu l'unico scrittore in questo periodo, che abbia posto nella sua vera luce coll' appoggio di moltiplici esperienze e profondi ragionamenti, la forza stimolante dell' oppio (a). Applicato esternamente, cagiona rossore, infiammazione, dolore e calore, massime quando
riene injituato nell'uertra o messo a contatto coll' albugine dell' occhio; e sul cuore produce un' irritazione più
energica e forte di quella che procede dall'alcali volatie. Nulladimeno la teoria dell'eccitamento ha determinato
con maggior precisione à fatta proprietà, ed indicato più
accuratamente le regole per l'uso di questo eccellente a
sovrano rimedio.

⁽¹⁾ Edinb. commentar. v. X. fasc. 2. p. 104. e l. c. p. 14.

⁽²⁾ Ricerche sperimentali sulle proprietà e sugli effetti dell'oppio trad, dall'Ingl. Lipsia 1787. 8.

Oggetti delle ricerche empiriche.

A

Esperienze intorno ai medicamenti ed agli umori animali.

37. I travagli di questi ultimi tempi furono diretti principalmente a riconoscere l'azione degli oggetti esteriori sul corpo animale. In ciò non si tenne dietro a dir vero costantemente a regole e idee del tutto chiare, poichè il più delle volte stabilivasi per base la imperfesta conoscenza degli unori animali paragonandovi le alterazioni, cui certe sostanze producono nei fluidi esistenti fuori del corpo vivente. Non mancarono tuttavia diligenti indagatori, i quali guidati da nozioni giuste e lucide, contribuirono colle loro ricerche a spargere utili lum i sull'economia animale, e sulla muttua relazione delle cose esterne rispettyamente all'organismo.

Il metodo sperimentale subì incontrastabilmente notabili perfezionamenti nel secolo diciottesimo, rendendosi sempre più intelligibili i precetti di Bacone, dissipandosi a poco a poco i pregiudiri scolastici, ed apprezzandosi con criterio sempre più sodo e più sano le vere e pure esperienze. Comparvero altreà durante quest' intervallo due opere sull'esperienza e sull'arte d'osservare, la prima fornitaci dall'ingegnoso e profondo Gio. Amed. Zimmermann, la seconda dal sagace aperimentavore Gio. Senebier. Quella di Zimmermann (1)è il modello d'uno stile energico ed elegante, d'un' eloquenza che rapisce, e d'un'arte la più felice di trattare gli oggetti i più oscuri con chiarezza e precisione impareggiabile. Fino a tanto che saranno stimati il buon gusto, lo spirito, il sapere e l'ingegno, si annovererà questo lavoro fra le più felici produzioni dell'umano intelletto. Il merito e l'importanza della vera esperienza, e la diversità della medesima dalla falsa ossia dall'esercizio cieco; i vantaggi dell'erudizione e la necessità di associar la dottrina all'esperienza; gli ostacoli che incontra lo spirito di osservazione; i pregj e gli attributi delle buone osservazione ; gli effetti del genio, ed il metodo di arguire dall'analogia e dall'induzione i ecco i principali argomenti, sui quali versa l'autore dell'accennata opera classica. Le applicazioni da lui instituite sull'osservazione dei segni , e sull'investigazione delle cagioni non solamente ci guidano alla conoscenza di nuovi fatti, ma ci rendono piacevole ed utile la lettura anche degli oggetti già noti. Quantunque sia stato straordinario l'applauso, con cui fu accolta dal pubblico quest' opera, tuttavia lo storico imparziale non trova appagata dall' esito la sua espettazione, relativamente all' influenza delle massime ivi esposte sulla condotta dei medici. Quasi tutti gli scrittori ohe ci fornirono delle coservaziozi, si sforzarono piuttosto di seguire nella spiegazione dei fenomeni naturali le loro ipotesi e teorie individuali, di quello che rintracciare le leggi della natura col metodo dell' induzione.

⁽¹⁾ Dell' esperienza nella medicina. Nuova edizione. Zurigo 1787 8.

L'arte di osservare di Gio. Senebier (1), racchiuden maggior dettaglio le regole, cui deve attenersi il naturalista nelle sue osservazioni; e benche poco o nulla si riferisca alla medicina pratica, abbonda nondimeno che l'autore trasandando le ripetizioni inutili delle cose già troppo note e giornaliere, sa dovutamente apprezzare gli ajuti, che cisseuna facoltà dell'anima contribuisce all'esperienza e all'osservazione.

38. Stà alla testa di tutti gli sperimentatori del penultimo secolo Gio. Jacopo Wepfero (2), degno modelto degl' indagatori posteriori , la di cui opera immortale della ciouta acquatica (3), aprì il sentiero agli esperimenti che si tentarono dappoi sul modo di agire dei medicamenti e dei veleni, e porse una copiosissima serie di risultati felici, i qu'ali ci fanno esitare, se si debba ammirar più, o la diligenza o la fortuna del sagace naturalista. Esaminò egli in compagnia di Gio. Corr. Brunner (4), e di Gio. Iac. Harder (5), gli effetti di diversi veleni in innumerevoli animali notomizzati ancor vivi, per riconoscere attentamente e gradatamente le mutazioni successe, e per vedere come si distinguono i fenomeni dopo la morte, da quelli dello stato di vitalità. Nè i suoi tentativi si limitarono alla cicuta acquatica (virosa); ma anche la cicuta volgare (Conium maculatum L.); l'a-

⁽¹⁾ L'art d'observer. tom. 1. 2. Genève 1775 8.

⁽²⁾ Storia della medicina, Sez. XII. §. 42.

⁽³⁾ Historia cicutae aquaticae. Bas. 1679. 4. 1716.4.

⁽⁴⁾ Storia della med. Sez. XII, §. 125.

⁽⁵⁾ Ivi §. 45.

aconito, gli occhi di cancro, l'elleboro bianco, la gialappa, le mandorle amare, l'arsenico e l'orpimento divennero oggetti delle sue ricerche, che giovarono altreà ai progressi dell'anatomia comparata, per le frequenti e nuove sezioni che occasionarono.

Disgraziatamente tale sentiero non fu battuto nella seconda metà del secolo diciassettesimo. Tutte le esperienze venivano allora instituite dai chimiatrici, i quali manoando d'idee chiare sull'economia animale e sulla chimica stessa, conchiudevano troppo precipitosamente da alcuni esperimenti difettosi le alterazioni della forza vitale. Non ripeterò qui ciò che ho detto altrove di sì fatta specie di deduzioni (1).

39. Durante quest' intervallo, l' esperienze e le osservazioni erano dirette sopra que' medicamenti, dei quali si cercava d' investigare le virth e gli effetti, o coll' analisi chimica de l'oro elementi, o colla mescolanza degli umori animali, o finalmente colla conostecnza delle mutazioni quindi prodotte sul corpo umano ed animale. Una soverchia predilezione de' medicamenti nuovi, gli elogi indiscreti degli esotici e dei più preziosi, e un' ingiusta trascurara degl' indigeni già noti e comuni, ecco i principali abusi che ridondarono da à fatto metodo sperimentale. Non è però da negarsi, ch' esso abbia contribuito al ritrovamento d'alcuni eccellenti rinnedi, i quali appunto formeranno il soggetto delle mie presenti riercrche.

⁽¹⁾ Storia della medic. Scz. XIII. §. 82.

a. Medicamenti vegetabili.

Uno de' medicamenti più importanti, sorgente di considerevoli rivoluzioni nel metodo curativo, è stata certamente l'ipecacuana. Benchè Guglielmo Pisone ne facesse menzione fino dal 1648. come di un rimedio usato dai Brasiliani nella diarrea (1), e benchè un certo medico le Gras ne avesse portata del 1672, una gran quantità dal Brasile in Francia; tuttavia l'Europa tardò a conoscerla fino al 1685., quando a Parigi il primo a farne cenno fu Gio. Adriano Elvezio. Questi studiava allora in quella università, ed accompagnava tratto tratto un certo medico Afforty, dottore della Facoltà, alle visite de' suoi ammalati, fra' quali trovossi una volta un negoziante chiamato Grenier o Garnier, il quale essendosi ristabilito, porse in contrassegno di sua gratitudine al medico un rotolo di radice antidissenterica Brasiliana. Afforty poco curando questo regalo, lo rimise al suo assistente Elvezio, che s'accinse immediatamente a sperimentare il nuovo rimedio in parecchi dissenterici, e s'immaginò d'avere scoperto le virtù specifiche del medesimo contro una sì terribile e tormentosa malattia. Frequenti affissi pubblici annunziarono le virtù antidissenteriche del nuovo rimedio, ch' Elvezio, intanto vendeva come un segreto facendolo venire dalla Spagna col mezzo del mentovato Granier. Per buona avventura d'Elvezio trovavansi allora attaccati dalla dissenteria parecchi cortigiani, e perfino il Delfino figlio di Luigi XIV. Il re informato da Colbert dell'arcano d' Elvezio

⁽¹⁾ De Indiae utriusque re naturali et medica, p. 231. Amstelod. 1658. fol.

incaricò il suo confessore de la Chaise di tratare con Elvezio per la pubblicazione del suo segreto. Diffatti fu conchiuso l'acquisto per 100 luigi d'oro, dopochè, se ne ebbero instituite nell' Hotel-dieu molte esperienze col più felice successo. Quantunque Carnier pretendesse di essere messo a parte di sì gencosa rimunerazione, come primo inventore del medicamento, fu nondimeno rigettata la di lui querela, ed Elvezio fu promosso in seguito ai posti medici più ragguardevoli della Francia (1). Pubblioò dipoi un trattato particolare (2), da cui si rileva, che dapprincipio se ne prescrivevano delle dosi considerevoli, fino a due dramme in decozione o in elistieri, come apparisce altresì dalla citata opera di Pisone (3).

Elvezio trovò un forte avversario in G. B. Alliot, i di cui argomenti teoretici non valsero però a indebolire l'esperienza cui avea tenuto dietro il primo nel raccomaudare il nuovo rimedio (4). Hans Sloane (5) e Leibnizio contribuirono coltore loggi a difiondere grandemente l'uso dell'ipecacuana. Il secondo ne assicura, che al suo tempo s'usava già in Francia la polvere, anzichè la decozione sempre però a gran dosi, cioè da mezza dramma ad un intera. Se ne conosecvano tre specie, bianca, giallatra, e bigia. Quest'ultima era riputata la più attiva (6). Mi-

⁽¹⁾ LEIBNITZ opp. tom. II. P. II. p. 112. 113. ELOY dictionnaire de medecine, tom. II. p. 485. 486.

⁽²⁾ Remede contre le cours de ventre. Paris 1688.
(3) Brazil. his. natur. et med. lib. II. c. q. p. 37.

⁽⁴⁾ Traité du cancer, sa nature, et les moyens pour le guerir methodiquement. Paris 1698. 12.

⁽⁵⁾ Philosoph. transact. N. 239.p. 100.

⁽⁶⁾ Leibnizio l. c. p. 117.

chele Bern. Valentini la sperimentò utile in ogni sorta di diarrea (1), e Giorgio Baglivio asserì nel 1696. dietro la testimonianza di Gugl. Sherard botanico Inglese e di Gio.
Manget, che l'ipecacuana è il rimedio più sicuro nella dissenteria e nelle emorragie (2). In Olanda venne introdotta da Fed. Dekers (3), il quale lagavasi, che fosse troppo difficile di averne, talchè, come affermò poscia Walt. Harris, si arrivò perfino ad adulterata (4).

40. Il primo a prescrivere l'ipecacuana a piecole dosi, negandole ogni virtù specifica nella diarrea e nella dissenteria, e ripetendone gli effetti dal vomito quindi cagionato, fu Gio. Dan. Gohl, il quale la impiegò con gran vantaggio, ma a grani soltanto, fin dal 1717. nella diarrea che si manifesta nell'eruzione del vaiuolo (5) Lo stesso Geoffrey asserisce, che per eccitare il vomito bastano da sei a dieci grani (6), e Sam. Pye ottenne lo stesso effetto colla dose da mezzo grano fino a sei (7). Trew dimostrò circostanziatamente, che l'ipecacuana non agisce specificamente nella dissenteria, ma colla sua facolta emetica (3) Carlo Giannella la trovò utile qual nauseante,

⁽¹⁾ Polychresta exotica, p. 15-29. Francof ad Moen 1700. 4.

⁽²⁾ Prax. med. lib. I. p. 209. Antuerp. 1715. 4. (3) Exercitat. pract. circa medendi meth. p. 200.

Leid. 1694. 4.
(4) Dissertat. med. et chirurg. p. 250. Lond. 1725.

⁽⁵⁾ Acta med. Berolin. dec. I. vol. II., p. 8. Beral. 1720. 8.

⁽⁶⁾ Traité de la mat. med. vol. II. p. 161.
(7) Medical observat. and inquiries, vol. I. p. 240.

⁽⁸⁾ Commerc. liter. Noric. a. 1733. pag. 44. a. 1734. p. 533.

somministrata a picciolissime dosi, nelle lebbri periodiche autunnali per evacuare le zavorre delle prime vie (1) ; vantaggi confermati dappoi anche da innumerevoli esperimenti di Mass. Stoll (2).

Nicolò Dalberg preferì dosi ancora minori per le affezioni pettorali procedenti da ristagni addominali (3). Dower s'immaginò d'unirvi l'oppio, e ne ottenne un eccellente antispasmodico e diaforetico (4). Marco Akenside pure attribuì all'ipecacuana una facoltà antispasmodica da cui appunto derivò il vomito, e per cui la raccomandò specialmente nell'asma spasmodico (5); vantaggi sperimentati da Paulitky anche ne reumatismi e nelle emorragie uterine (6), e da Reid nella tisi dipendente la ostruzioni del basso ventre-(7).

"4, Un altro, medica mento assai efficace introdotto spel'almente dai medici Tedeschi durante quest'ultimo periodo, è l'arnica. Il volgo la usavagià anche avanti nelle contusioni; ma la prima notiria scientifica la dobbiamo a Teod. Tahernamontavo, medico dell'elettor palatino e rinomato botanico (°), che se ne serviva in infusione teiforme per

(2) Rat. med. vol. I. p. 192.

(3) Vetenskaps acad. Handl. f. a. 1770. pag. 3. 6-320.

(4) Oeconomie and medical observ. p. 130.

(5) De dysenteria in Schlegel thes. pathol. therapeut. vol. I. P. II. p. 312.

(6) Osservaz. mcd. pratiche, p. 49, 54.

(7) An essay on the nature and cure of the phthisis pulmonalis. Lond, 1783. 8.

(*) Nuovo erbario. P. II, pag. 576. Fref. al Meno 1613. fol.

⁽¹⁾ Haller diss. pract. vol. V. p. 93.

le coliche emorroidali. Fr. Joel di Greifswalde (1) la decantò nelle lesioni cagionate dalle cadute (2). Ma in sul principio del secolo XVIII. Michele Fehr medico a Schweinfurt e presidente dell' accadamia dei curiosi della natura, avendo instituite non poche esperienze con questa pianta la trovò utile in diverse malattie (3). Egli si servì di quella specie alpina che ha foglie più strette, e nota allora sotto la denominazione di arnica Planense. Fece lo stesso Gio. Dan. de Gohl (4). Entrambi ne sperimentarono con selice successo l'insusione delle foglie nelle intermittenti ostinate, nelle pleuritidi reumatiche, nell'ematemesi, nelle tossi croniche e in parecchie altre affezioni. I medici di Breslavia s'accinsero a simili tentativi fin dal 1719., e la riscontrarono efficacissima anche in un'epilessia originata da spavento (5). Trew e Werlhof la impiegarono nella soppressione dei menstrui e dei lochi (6), e Gio. Junker nella paralisi (7).

Arrigo Gius. Collin professore di Vienna la tentò nuovamente in quest' ultima malattia, e ne divenne il prima panegirista a' nostri giorni, avendo osservato i buoni effetti da lei prodotti specialmente nell'amaurosi, nelle inter-

⁽¹⁾ Storia della medecina, Sez. IX. §. 79-

⁽²⁾ Prax. med. lib. X Sect. V. p. 311. Lavenb. 1622. 4.

⁽³⁾ Ephemer. nat. curios. dec. I. an. 9. 10. Obs. 2. p. 27.

⁽⁴⁾ Act. medic. Berolin. dec. I. v. I. p. 56. 57.

⁽⁵⁾ Collezioni di Breslavia, a. 1724. p. 218.

⁽⁶⁾ Commerc. literar. Noric. a. 1734. p. 4. 1735. p. 282.

⁽⁷⁾ Thorapeut. general. p. 173.

mittenti, nelle affezioni spasmodiche, nelle febbri putride nella dissenteria putrida, nella cangrena e nelle diarrec asteniche, massime in quelle che sopravvengono alla tisi (1). Stoll confermò tai vantaggi nella maggior parte di queste malattie e segnatamente nella dissenteria astenica (a). Da allora in poi l'arnica viene risguardata da tutti i medici come uno dei stimolanti più pesetranti e volatili.

42. Anche la valeriana è uno di que validi rimedj, di cui s'è imparato a conoscere il vero e miglior uso soltanto negli ultimi due secoli. Gli antichi ne adoperavano due altre specie meno attive, la valeriana celtica, e la valeriana phu, come leggieri corroboranti e diuretici (3). Il rinomato lotanico Fabio Colonna sperimento prima di ognaltro sopra se stesso la specie officinale qual rimedio dell'epilessia, trovossi quindi alleviato avvegnachi la matattia non sia stata per tal modo cuerta radicalinette (4). Anche Lazaro Riverio accenna la virtu antiepilettica di questo vegetabile (5), e Domenico Panaroli ne istitul diverse esperienze con felice successo (6). Gio. Jac. Wepfero la riconobbe giovevole specialmente nelle affezioni con-

⁽¹⁾ Observat, circa morb. P. IV. pag. 5. 79. 107. P. V. p. 132. 209. 263. 283.

⁽²⁾ Rat. med. vol. I. p. 122. vol. ... p. 422. vol. III. p. 160.

⁽³⁾ Diocorid. lib. I. c. 10. Galen. de facult. simpl, medicam. lib. VIII. p. 114. Oribas. coll. l. X-I. p. 498. Ven. 1554, 8.

⁽⁴⁾ Phytobasan. p. 97. Neapol. 1592. 4.

⁽⁵⁾ Prax. med. lib. I p. 62.

⁽⁶⁾ Jatrologism. pentec. 1. obs. 33. pag. 20. Rom. 1643. 4.

vulsive delle donne (s), e Marchant la impiegò ne fanciulli affetti da vermi (2). Tissot, il sommo panegerista della valeriana nell' epilesia, asseriscè, che questa riesce, incutabile, ove non giovi la prima (3). Fu introdotta di poi anche nella cura del tifo, del che siam debitori a Gio. Iunker, il quale la uguaglia espressamente alla serpentaria virginiana (4). Dapprincipio se ne attribuirono gli efetti alla facoltà antisettica della medesima, dietro gli sperimenti di Pringle; ma Mead avea già osservato, ch'essa possiede piuttosto una virtù cardiaca e nervina (5); opinione confermata in questi ultimi tempi dall' esperiene di Bassiano Carminati, che osservò costantemente sotto l'uso della valeriana un aumento di calore ed un acceleramento del polso (6).

43. Solo dopo il 1760. s'imparò ad usare esternamente ed internamente qual eccellente rimedio la cicuta, risquardata costantemente dagli antichi come un velevo. Quantunque Gio. Wiero (7) ci abbia lasciata fin dal secolo sedicesimo una testimonianza, che la radice della cicuta applicata esternamente giovasse a sciogliere i tumori nella malattia allora dominante e denominata de loopende varen (8); quantunque Arrigo ab Heers adoperasse la ci-

(1) De affect. capit. p. 576. 588.

⁽²⁾ Mem de l'academ. des scienc. a Paris, a. 1706. p. 333.

⁽³⁾ Traite de l'epilepsie, p. 311. Paris 1785. 8.

⁽⁴⁾ Therap. gener. p. 111,

⁽⁵⁾ Monita et praecepta medica, p. 17.

⁽⁶⁾ Opuscul. therapeut. vol. I. p. 238.

⁽⁷⁾ SMET. miscell. med. 1. IV. p. 240.

⁽⁸⁾ V. Storia della medicina Sez. VIII. S. 50.

cuta qual segreto nelle affezioni veneree degli organi genitali (1), e Ratlauw nella lebbra (2); tuttavia nè si conobbe il vero modo di usarne, nè quello della sua azione fino a tanto, che Antonio di Stoerk, archiatro imperiale non instituì su questo vegetabile diverse e felici esperienze. Merita ogni elogio la circospezione, con cui egli cominciò a far ingojare ad un cane il succo condensato di questa pianta, ed osò di poi prenderne egli medesimo. Nella prima sua operetta riporta venti casi d'induramenti scirrosi, di tumori cronici, e di ulceri maligne, dove riuscì efficace ed utile la mentovata preparazione somministrata in forma di pillole (3). Pubblicò in seguito alcuni altri opuscoli, nei quali non solo confermò l'attività della cicuta relativamente alle succennate affezioni , ma fece vedere con nuove osservazioni, ch' essa produce dei buoni effetti anche nella rachitide, nella cateratta, nella carie ed in altre cachessie (4). Lallement e Marteau, medici francesi , riconobbero le virtù medicinali della cicuta in quell'anno medesimo, in cui comparve alla luce il primo sog-

(2) Notizie letterarie di Gottinga, a. 1754. ppl 285-

Observat. oppido rarae in Spa et Leodii animade.
 Lond. 1685. 12.

⁽²⁾ Libellus quo demonstratur, cicutam non solum usu interno tutissime exhiberi, sed et esu simul remedium valde utile in multis morbis. Vindob. 1760. 8.

⁽⁴⁾ Libellus secundus, quo confirmatur; cicutam etc. Vindob. 1761. 8. -Libellus quo continuantur experimenta et observationes circa nova sua medicamenta. Vindob. 1765. 8.

gio di Stoerk (1). Parimenti Giuseppe Quarin (2) c Massim. Locher (3) la sperimentarono col bramato successo nelle serofole, uell'artitide, ne tumori interni e nella scabbia retropulsa. Giorgio Haffuer la ordino nell'idropisia delle atticolazioni (4); i medici di Strasburgo, dietro la testimonianza di Gius. Ehrhart, negli infarcimenti addominali, ne sintomi venerei, e nelle ottalmie ostinate (5).

Gio. Arr. Rahn sostenne egli pure l'attività di questo rimedio nelle disposizioni scrofolose e negl'induramenti dei testicoli, ma non la riputò sufficiente per la cura radicale del cancro e dello scirro (6). Gio. Arr. Langen proferì un giudizio assai sfavorevole sull'uso della cicutta, cui, per una tenue porzione di sale urinoso che sembra contenere, non attribuì che un'azione diuretica (7). Nemmeno de-Haen mostrossi persuaso del nuovo rimedio, nò esitò ad asserire, che l'acqua tepida riesce più efficace, e che i buoni effetti osservati nei casi, dove fu impiegata la cicuta, possono anche ascriversi all'uso contemporaneo del sapone, della gomma ammoniaca ce. (8). Vuolsi che

(2) Tentamen de cicuta. Vindob. 1761. 8.

⁽¹⁾ Journal de medecine vol. XIII. pag. 511. vol. XIV. p. 121.

⁽³⁾ Observat, pract, circa luem veneream etc. p. 75. Vienn. 1762. 8.

⁽⁴⁾ Diss. de hydrope articulorum, pag. 20. Vindob. 1762. 4.

⁽⁵⁾ Diss. de cicuta. Argentor. 1763. 4.

⁽⁶⁾ Mem. della Società fisica di Zurigo v. II. p. 415.

⁽⁷⁾ Diss. dubia cicutae vexata. Helmstad. 1764. 4.

⁽⁸⁾ Responsio ad sibi communicatas observationes Vratislavienses de cicuta. Fref. 1765, 8.

de Haen si lasciasse condurre in questa opinione da privati motivi, come si rileva dagli scrittori di un anonimo (1) e di Giorgio Tartreaux (2).

Gli effetti della cicota manifestarono una diversità secondo il terreno dove vegeta, e secondo il modo con cui viene preparato l'estratto. Giosia Colebrook lagnossi, che in Inghilterra si dovea usare l'erba fresca, perchè l'estratto non possedeva alcuna attività (3); e Mich. Morris trov), che nel Portogallo l'estratto contiene maggior proporzione di sostanza estrativa resinosa e riusciva quindi più attivo di quello di Vieuna (4).

Gio. Fothergill fu il primo a dimostrare, che la cicuta agisce principalmente come antispasmodico e sedativo, e comprovò l'esperienze di Stoerk sui vantaggi della medesima ne' tumori ostinati (5).

44. La Belladonna produce effetti somiglianti a quelli della cicuta. I moderni hanno esaminato più attentamente le virtù medicinali della medesima. Se il σεργγνωμανικον degli antichi è la nostra belladonna, come apparisce dalla descrizione di Dioscoride ed Oribasio (6), i

⁽¹⁾ Aletophilorum quorumdam Viennensium elucidatio necessaria epistolae, quam Haenius scripsit. Vindob. 1766: 8.

⁽²⁾ Epistola apologetica B. L. Tralles adversus A. de Haen 1767. 8.

 ⁽³⁾ Philost transact. vol. LIII. p. 346.
 (4) Ivi. vol. LIV. p. 172.

⁽⁵⁾ Medic. observ. and inquir. v. III. p. 400.

⁽⁶⁾ Dioscorid. lib. IV. c. 74. pag. 227. Oribas. collect. lib. XII. p. 489. Io non so comprendere come Munns abbia quindi dedotto Datura Metel, V. apparat. medicam. v. I. p. 670. ed. Alvilor.

greci hanno realmente adoperato il succo condensato di questa pianta contro le ulceri cancerose e gl'induramenti scirrosi (1). Il primo cenno del di lei uso appresso i moderni trovasi in Cor. Gessner, il quale prescriveva il succo delle coccole, come un calmante nella dissenteria (2). Alcuni le facevano bollire nella birra, cui dopo facevano prendere agl' individui attaccati dalla loopende varen (3). Fino dagli ultimi anni del secolo sedicesimo, la belladonna era impiegata commemente nell' Annoverese contro lo scirro ed il cancro; e nel circolo di Lauenstein taluno la spacciava per un arcano contro l'idrofobia. come ne assicura Gio. Enr. Münch benemerito propagatore di questo rimedio (4). Spath medico a Visbaden avutane notizia da Brummen medico di Gotha, fece conoscere a Gio. Juncker l'efficacia di questo vegetabile nelle. ulceri cancerose (5). Mich. Alberti (6) e Leb. Lambergen ne instituirono diverse esperienze con esito fortunatissimo (7). Anche in Inghilterra, verso la metà dello scaduto secolo, riuscirono tai tentativi specialmente nel cancro (8), mentre in Francia Darluc trovò utile 'negl' in-

⁽¹⁾ Paul. AEGIN. lib. IV. c. 26. p. 144.

⁽²⁾ Epist. f. 34. b.

 ⁽³⁾ SMET. miscellam. lib. IV. p. 238.
 (4) Magazz. annoverese a. 1767. p. 1011. a. 1768.

n. 38. a. 1769. p. 1495. (5) Therap. gene. p. 491.

⁽⁶⁾ Diss. de Belladonna, tamquam specifico in cancro. Hal. 1739. 4.

⁽⁷⁾ Ephemeris persanati carcinomatis in Haller diss. pract. vol. II. p. 1.

⁽⁸⁾ Wat son nelle transaz, filosof, v. XLIX. p. II. p. 818.

duramenti scirrosi degl' intestini la semplice infusione delle foglie (1), e all'incontro Marteau (2) e Teod. Timmrmann ne usarono la tiutora pel canero delle mammelle (3). Ultimamente Gio. Ern. Greding. esaminò fondatamente le yirtù dell'estratto nell' itterizia e nell' epilessia inveterata e frequente, e le riconobbe più efficaci e costauti nella prima che nella seconda, avvegnachè anche in questa non abbia mancato di recare qualche sollieio questa non abbia mancato di recare qualche sollievo (4). La belladonna divenne interessante all'umanità principalmente dopo gli elogi fattine dal sullodato Gio. Arr. Münch, che per l'idrofobia negli adulti ne prescriveva la dose di 10 a 14 grani della polvere di radice (5). e per la malanconia e mania ne preferiva le foglie, Ottone Giusto Evers consigliò di unirvi una discreta quantità di rabarbaro (6).

45. Fra le sostanze medicamentose di grande efficacia introdotte in questi ultimi tempi, s'annoverano pure
il giusquiamo noto secondo Dioscoride a tutti gli antichi,
e lo stramonio sperimentato da And. de Stoerk nella mania. Nella maggior parte dei casi egli non ottenne che qualche alleviamento e talvolta sembrò accrescere le convulsioni (7). Tuttavia G. L. Odhelius riporta alcuni esem-

⁽¹⁾ Journ. de medecine tom. XI. p. 499.

⁽²⁾ Ivi tom. VIV. p. 11.

⁽³⁾ Periculum medicum de belladonna. Rintel 1765.

⁽⁴⁾ Adversar, med. pract. vol. I. p., 795. Greding miscellan. vol. I. p. 119, 169. Gratz 1790. 8.

⁽⁵⁾ Trattato pratico della belladonna e dell'uso della medesima. Gottinga 1785. 8.

⁽⁶⁾ Schmucher opere miste, P. I. 173.

⁽⁷⁾ Libeltus, quo demonstratur, stramonium, hyo-

pi di melancolia, di mania e di epilessia, dove riuscì giovevole l'estratto di stramonio (1). Ma Gio. Ernesto Greding non riscontrò dopo molte esperienze che una passeggiera diminuzione di sintomi (2).

A Stoerk siam pure debitori dell'uso dell'aconito. Egli sperimentò la polvere e l'estratto di questa pianta velenosa primieramente sopra se medesimo, ed avendo rilevato, che il principal sho effetto consiste nel promuovere la traspirazione, non esitò a prescrivere il secondo nelle febbri intermittenti , nei tumori glandulosi , nelle affezioni reumatiche ed artritiche, nelle esostosi veneree e nella cárie (3). Egualmente favorevoli furono le osservazioni di Fil. Ad. Boehmer (4) e di Gio- Giorgio Schenkbecher sull'uso dell'aconito nell'artritide (5); dei medici di Strasburgo in diverse altre malattie croniche (6). e finalmente di G- E, Greding nei tumori glandulosi indurati (7).

Non meritò altrettanta voga il colchico raccomandasclamum, aconitum non solum tuto exhiberi poste usu interno hominibus, verum et ea esse remedia in multis mor-

bis maxime salutifera. Vindob. 1762. 8.

⁽¹⁾ Vetenskaps acad. Handl. f. a. 1766. p. 277.

⁽²⁾ Advers. med. pract. vol. I. pag. 259. GREDING. miscell. v. I. p. 37-103.

⁽³⁾ L. c. N. 30. - Libellus, quo continuantur experim. et observat. p. 92.

⁽⁴⁾ Diss. de usu salutari extracti aconiti in arthritide. Hal. 1768. 4.

⁽⁵⁾ Degli effetti salutari della China-china p. 159.

⁽⁶⁾ REINHOLD de aconito napello. Argent. 1769. 4.

⁽⁷⁾ Miscellan vol. I. p. 229

to da Stoerk come un eccellente sostituto della scilla marina. La superstizione avea già convertito il bulbo di quesia pianta in un amuleto per la peste (1); ma Storek considerò più attentamente le virth di questa sostanza, e trovò che digerita nell'aceto e nel mele, può essere adoperata nell'idropisia come un valido e potente diuretico (2). Le obbiezioni di Carlo Cratochwill non confutarono interamente gli esperimenti dell'archiatro Viennese (3): anzi. Giorgio Heuermann Iodò la polvere del colchico, specialmente nelle idropi dipendenti da congestioni mesenteri che (4) e Arr. Gius. Collin la esalbò a segno, che non risguardo per contro indicazione della febbre (5), quantunque Pietro Gio. Bergio rifletta assia giustamente, che la di lei tatività è certamente inferiore a quella della china (6).

Browne Langrish institut i primi esperimenti coll'acqua di lauroceraso, ed osservò, che somministrata a piecole dosi agisce negli animali come un solvente (7). Rayles fu il primo a tentarla nel corpo umano, ed avendone prescritto da 30 a 60 gocce ne ottenne dei vantaggi

⁽¹⁾ Commen. literar. Noric. a. 1736. p. 12 107.

⁽²⁾ Libellus, quo demonstratur, colchici autumnalis radicem non solum tuto posse exhiberi hominibus, sed et ejus usu interno curari quandoque morbos difficillimos Vindob. 1763. 8. Libellus quo continuantur exper. p. 141.

⁽³⁾ De radice colchici antumnalis. Francf. ad Viadr. 1764. 8.

⁽⁴⁾ Osservazioni miste vol, I. p. 240.

⁽⁵⁾ Observat. circa morbos acut. et chronic, P. II. p. I. - 160.

⁽⁶⁾ Mater. med. e regno vegetabile, tom. I. p. 291.

⁽⁷⁾ Phisical experiments upon brutes. Lon. 1746 8.

nelle malattie infiammatorie e nelle congestioni addominali (1). Maur. Ger. Tilenio l'applicò con profitto alle ulceri erpetiche nell'idea di assottigliare per tal modo il saugue nero (2).

46. La digitale risguardata per l'addietro come una pianta puramente venefica, è un medicamento estremamente importante, di cui solo in questi ultimi tempi s'imparò a conoscere la singolare attività e il vero modo di usarne. Sembra, che i primi esperimenti sull'uso interno di questa produzione vegetabile sieno stati eseguiti nell'Inghilterra, dove appunto si fecero anche ultimamente le più esatte ed attente osservazioni sulla medesima. Imperocchè Gio. Parkinson, che nella prima metà del secolo diciassettesimo fu incontrastabilmente il botanico più rinomato dell' Inghilterra, rammenta l'uso delle foglie bollite contro l'epilessia, e l'applicazione esterna delle stesse sulla pruma (3). Anche Gio. Ray riferisce, che gl' Inglesi impiegano questo rimedio nella cura delle scrofole (4), e delle ulceri (5), mentre gl' italiani, dietro la testimonianza di Ferrein (6), non lo trascuravano nemmeno nelle fe-

⁽¹⁾ Pratical ossays on medical subjects, p. 34. 37. Lond. 1773. 8.

⁽²⁾ Consideraz. medico-chirurgiche, p. 203. 204. Francf. 1789. 8.

⁽³⁾ Theatr. botan. p. 654. Lond. 1640. fol.

⁽⁴⁾ Historia univers. plantar. tom. 1. p. 767.

⁽⁵⁾ BAYLIES practical essays ec: p. 41.

⁽⁶⁾ Matiere medicale, extraite des meilleurs auteurs et des lecons de Mr. Ferrein, tom. III. p. 67. Paris. 1770. 8.

rite, e i tedeschi ne prescrivevano il succo espresso nellescirrosità delle mammelle, fino alla comparsa d'un vomito violento (1).

La digitale è considerata in Inghilterra un rimedio eroico dell' idropisia fino dal 1775., del che ci ha dato la prima notizia Carlo Darwin, figlio del celebre Erasmo (2). Si mettevano allora a bollire quattr' once di foglie fresche in due pinte d'acqua, fino alla consumazione della metà; indi vi si aggiungevano due once di spirito di vino, e di questa mistura se ne facevauo prendere due o tre cucchiajate, le quali bastavano per produrne copiose evacuazioni. Appartiene però a Gugl. Withering il merito d'aver meglio determinato la facoltà diuretica di questo vegetabile, ed illustrato la straordinaria sua attività nell'idropisia (3). Gio. Warren confermò le di lui osservazioni, ed insegnò altresì a prepararne la famosa tintura (4). I medici Scozzesi propendevano a ripetere la virtù diuretica dall'irritazione consensuale dei reni procedente dalla nausea eccitatavi; opinione abbracciata, in fia gli altri, nominatamente da Gugl. Cullen, cui poi dobbiamo la prima contezza del ritardo del polso sotto l'uso della digitale (5). Baker (6) e Thilenio (7) confer-

⁽¹⁾ RICHTER, bibliot. chirurgica, vol. IV. p. 591. vol. V. p. 531.

⁽²⁾ Experiments establishing a criterion between nucaginous and purulent matter, p. 103. Lichfield 1780. 8.

⁽³⁾ An account of the fox-glave and some of its medecinal uses, Birmingham 1785. 8.

⁽⁴⁾ London medic. Journ. vol. VI. for 1785. p. 145.

⁽⁵⁾ Muteria medica, h. 566.

⁽⁶⁾ Momorie della società dei medici di Londra, vol. III. p. 170.

⁽⁷⁾ Osservazioni medico - chirurgiche, p. 170.

marono e osservazioni di Vithering, e G. C. Lettomo cercò d'affievolirle riportando alcuni esempji d'idropisie ostinate e pericolose, nelle quali non si ottenne alcun vantaggio dal decantato rimedio (1). Già da vent'anni alcuni Inglesi lo sperimentarono anche nella tisi (2); e Gugl. Jones assicura d'averne ritratto considerevole miglioramento nell'emottisi (3). Finalmente Beddoes e Ferriar determinarono non ha guari con maggior precisione l'uso di questa sostanza nell'accennata malattia.

47 Parimenti i pregi della jacea nelle malattic cutanee non si conobbero che dopo la metà del secolo passato, quantunque e Gio: Bauino (4) e Teod. Tabernamontano (5) l'abbiano raccomandata nelle ulceri, e semni d'altronde, che i tedeschi la risguardassero da lungo
tempo come una pianta medicinale (6). Ma Carlo Strack
è stato tuttavia il primo ad instituire diligenti e fondate
ricerche sull'efficacia di questa pianta, specialmente nella
crosta lattea (7). Hasse la trovò utile anche in altre malattie, nella tinea capitis, in alcune escoriazioni cutanee,
e perfino nell' attribide (8).

⁽¹⁾ Memorie della società medica instituita nel 1773. vol. II. p. 99.

⁽²⁾ BAKER L.c.

⁽³⁾ Edinburg. Comment. Dec. II. vol. I. fusc. 1. p. 15.

⁽⁴⁾ Histor. plantar tom. III. p. 547.

⁽⁵⁾ Nuovo Erbario , P. II. p. 691.

⁽⁶⁾ Murray apparat. medicam. vol. I. p. 787. ed.
Altone.

⁽⁷⁾ De crusta lactea infantium. Francf. ad. Moen. 1779.

⁽⁸⁾ Dissert. de viola tricolore, Erlang. .1782

Il ledum palustre, che nella Svezia era un rimedio familiare pella scabbia, per la tingna, e per l'angina applicato esternamente, e per la tosse canina preso internamente, dopo più accurate ricerche venne da Linneo sommamente vantato in quest'ultima malattia (1). In seguito Gio. L. Odhelius ne lodò la decozione contro la lebbra settentrionale (2), e Bengt Bjoerlund contro la dissenteria (3).

È stato introdotto recentemente nella classe degli astringenti il sucço di catecà, di cui abbiamo avuta la prima notizia da Erb, Jager di Batavia (4). Schmidt fu quasi il primo ad usarlo internamente nel diabete (5), Iluxham qual antisettico nel tifo (6), Degner qual astringento nella dissenteria (7), Giov. Grashuis nella colica saturnina (8). Ma dacchè è nota la gomma Kino, l'uso del primo viene limitato ai mali esteria. Gio. Fothergillindicò fin dal 1758 la gomma Kino (gummi Kino aut Gambiense) per un blando e leggiero astringente (a); quiudit Carlo White la decautò per arrestare le diarree

⁽¹⁾ LINN. amoenit-academ. vol. VIII. p. 268.

⁽²⁾ Vetenskabs acad. Handl. f. a. 1774. p. 267. 1779. p. 218. 1783. p. 224.

⁽³⁾ Ivi f. a. 1782. p. 75. Raccolta pei medici pratici vol X. p. 722.

⁽⁴⁾ Ephemer. natur curiosor. dec. II. a. 3. pag. 7.

⁽⁵⁾ Isi a. 2. obs. 124. p. 281.

⁽⁶⁾ Obb. vol. II. p. 70.

⁽⁷⁾ De dysenteria, p. 165. 270.

⁽⁸⁾ De colica pictorum, pag 47. Amstelod. 1752 8

⁽⁹⁾ Medical observat. and inequiries, vol. I. p. 358

asteniche nella febbre puerperale (t), ed Abramson per currare il diabete (2). Lettsom s'immaginò d'averne riscontrato i principi costituenti niente diversi da quelli della china, e la sperimentò efficace anche in quelle febbri intermittenti che aveano resistito alla corteccia (3).

48. La radice di seneka è uno de' più importanti rimedi che agiscono con un stimolo presso cchè specifico sui polmoni, e contribuiscono a sciogliere le peripneumonie asteniche. Nel 1736. cadde in pensiero ad un certo Tennent, medico di Filadelfia, di tentare la seneka in questa specie di malattie, giacchè erasi già manifestata assai attiva nel distruggere gli effetti della morsicatura del crotalo, che suole attaccare specialmente gli organi della respirazione. Tali esperimenti riuscirono a segno, che l'inventore ne ricevette una gratificazione dal governo della sua patria. Pochi anni appresso spedì notizie di sì fatto metodo a Ricc. Mead , non che agli accademici Francesi du Hamel, Lemery e Jussieu, le osservazioni dei quali confermarono parimenti i decantati vantaggi del nuovo rimedio (4). Nella Germania Cristof. Trew fu il primo a instituire esperienze e ad impiegarlo ne' reumatismi (5); e dipoi ne ha fatto menzione Linneo, il quale

(2) MECKET archivio di medicina pratica, vol. I. p. 143.

(5) Commen. literar. Noric. a. 1741. p. 362. 370.

⁽¹⁾ A treatise on the management of pregnant and lyin in women, p. 190. Lond. 1773. 8.

⁽³⁾ Memorie della società medica istituita in Londra nel 1773. vol. II. p. 57

⁽⁴⁾ Mem. de l'acad. des sciences à Paris, a. 1739.

trovandosi assalito da una pulmonia, lo sperimentò con felice successo sopra sè medesimo (1) Giorgio Cristof. Detharding lo riconobbe utile anche nell'ideopisia (2), come Percivall nell'idrotorace (3) e Michele Sarcone nela peripneumonia reumatico - astenica (4). Dobbiamo la prima analisi chimica di questa radice a Gio. Jacopo Burckard (5) e a Gir. Sim. Keilhorn (6), il quale sei guèndo i principi del suo maestro Gio. Fed. Cartheuser, risguardò la seneka per un blando catartico, e la propose per la soluzione del calcolo renale e della cateratta (7).

49. Nel secolo decimottavo si cercò di sostituire alla corteccia del Perù parecchi medicamenti indigeni, dei quali alcuni più, alcuni meno, ottennero l'approvazione generale. Pehr Kalm riscontrò in uso nella nuova Yersey quai rimedi domestici nelle febbri intermittenti, il geo acquatico (geuza rivale), la corteccia del cornio, ed altri (8). Mosso da tali notizie Pietro Gio. Bergio instituì delle esperienze colle indicate sostanze e rilevò, ch' esse riscono assai gio-

⁽¹⁾ Amoenitat. academ. vol. II. pag. 124. vol. IV. p. 535.

⁽²⁾ Diss. de seneko, Rostok. 1749: 4.

⁽³⁾ Essays, medical and experiment., v. II. p. 172.
(4) Storia delle malattie di Napoli, vol. I. p. 108.

⁽⁵⁾ Diss. de radice seneka, argent. 1750. 4.

⁽⁶⁾ Diss. de radicibus senega et salab. Frcf. ad viadr. 1765. 4.

⁽⁷⁾ Fundam. mater. med. v. I. p. 576. Fref. adviadr. 1767. 8.

⁽⁸⁾ Resa til Norra-America, D. I. p. 450. Stockh. 1735. 8.

vevoli per ristabilire l'atonia dei visceri addominali (1), e bastano sovente per vincere delle periodiche, non che per arrestare delle diarree e delle emorragie. Rodolfo Buchave con diversi altri medici di Copeulagen e di Kiel, trovarono di eguale attività un'altra specie della stesse pianta, il geo urbano, già noto anche ne' tempi addietro (2).

La corteccia di salice fu risguardata per lurgo tempo come un opportunissimo succedaneo del febbriligo americano. Edm. Stone fu il primo a proporla nelle intermittenti, mescolata con una quinta parte di china (3). In seguito Gio. Fed. Clossius se ne servi utilmente nelle eccessive evacuazioni che accompagoano il vajuolo (4). Ho già rammentato altrove, che Buchola preferiva alla china la forza antisettica della mentovata corteccia, massime tratta dalla salice pentandra (5). Se ne lodò poscia soltanto l'uso esterno, e di fatto Ad. Fed. Loefilter la impiegò nei casi, pel quali era indicata la china (6); Marcus la vantò nella cangrena (7), Fielitz ne applicò

⁽¹⁾ Vetensk. acad. Handl. f. a. 1757 p.118-129.-Mater. med. e regno vegetab. vol. I. p. 447.

⁽²⁾ Observationes circa gei urbani sive caryophillatae vires, Havn. 1781. 8. BANG. in act. societ. med. Havn. vol. I. p. 261.

⁽³⁾ Philosoph. transact. vol. LIII. p. 195.

⁽⁴⁾ Nova variol. medendi methodus, p. 127.

⁽⁵⁾ Diel presso Baldinger nuovo magazzino pei medici, vol. IX. p. 300.

⁽⁶⁾ RICHTER, bibl. chirurg. v. VII. p. 789. vol. XII. p. 329.

⁽⁷⁾ Ivi vol. VIII. p. 515.

con buon successo l'estratto nelle suppurazioni gagliarde, e le injezioni della decozione nelle paralisi della vescica orinaria (1).

Verso il fine del secolo diciasettesimo si fecero in Italia le prime esperienze di curare le febbri intermittenti colla corteccia d'ipocastano, Antonio Turra (2) ascrive a Domenico Mistichelli (3) la scopetta di questo rimedio. Gio. Iacopo Zanichelli seppe di poi ritrarae degli utili risultati (4), e Leidenfrost non che Bucholz; le attribut eminenti qualità antisettiche (5). Il mio predecessore Filippo Gasp. Junghans volle usarla anche nelle malattie imfammatorie (6).

50. Fra i corroboranti esotici più decantati nel secolo passato io annovero il legno quassia. Come tale era impiegato fin dal principio del pengltimo secolo specialmente nelle debolezze di stomaco (7) dagli abitanti di Surinam, dove appunto cresce la Quassia excelsa (8). Haller assicura; che questo rimedio è noto in Europa fin dal

- (1) Ivi p. 112. vol. IX. p. 185.
- (2) Opuscoli scelti , vol. III. p. 99.
- (3) Storia della medicina Sez. XIII, §. 622
- (4) Raccolta d'opuscoli scientifici, vol. X. p. 200.-Commen. literat. Noric. a. 1734. p. 75.
 - (5) Diss. de cortice hypocastani. Dagob. 1768. 4.
 (6) Diss. de nucis vomicae et corticis hippocastani
- virtute medica, Hal. 1770. 4.

 (7) Fermin descrizione della colonia di Surinam.
- (7) FERMIN descrizione della colonia di Surinam, vol. I. p. 210. Berlino 1775. 8.
- (8) TONDER LUND in Naturhist, Selskab. Skrift. vol., I. fasc. II. p. 68. OL. SWARTZ in Vetenskaps acad.

1742. (1). Tuttavolta il primo cenno lo abbiamo da Daniele Rolander , naturalista Svezzese , che ritornò da Suriam nel 1756, e portò una porzione del mentovato legno a Linneo. Secondo le notizie di Rolander e di Crist. Friis Rotboll , un certo Quass , naturale del paese , vendeva questo legno come un segreto (2). Ecco il motivo della denominazione apposta alla pianta da Linneo (3). Crist. Amedeo Kratzenstein determinò prima d'ognaltro la distinzione tra il legno della radice e del tronco. Linneo institul le sue esperienze col primo; ma in seguito non si potò più avere che legno del tronco (4). Le più diligenti ricerche chimiche e pratiche intorno a questa sostanza noi le dobbiamo a Schlager (5), Paarman (6), Ebeling (7) e. G. Battista Patris (8).

La simaruba, ch'è una varietà della quassia, su conosciuta in Europa qualche tempo avanti, poichè Pietro Barrere l'avea introdotta in Francia fin dal 1723. Ant. de Jussicu esaminò le virtà medicinali della medesima, e

oya Handl. f. a. 1788. p. 302. - J. LINDSAY in transact. of the roy. soc. of. Edinb. vol. III. p. 205. - Medical acts, vol. V. p. 140.

⁽¹⁾ Biblioth. botan. vol. II. p. 555. not.

⁽²⁾ Descriptiones variarum plantarum e Surinam. Havniae 1776. 4.

⁽³⁾ Linn. amaenit. academ. vol. VI. p. 416.

 ⁽⁴⁾ Diss. de ligni quassiae usu medico, Hanf. 1775.8.
 (5) Collesioni di Berlino tendenti a promuovere lo

studio della medicina, vol. II. p. 144-164.

⁽⁶⁾ Diss. de ligno quassiae, argentor. 1772. 4.

⁽⁷⁾ Diss. de quassia et lichene islandico, Glasg. 1779. 8.

⁽⁸⁾ Journ. de physique, to. IX. p. 140-144.

la sperimentò sommamente attiva nella dissenteria ed in altri profluvi del basso—ventre (1). Degners (2), Zimmermann (3), Dan. Monro (4), Gio. Fed. Crell (5) e Gugl. Wright (6) confermarono la virtà corroborante e tonica di questo rimedio.

A' nostri giorni ha menato gran rumore la radice di colombo, avvegnachè nessuno sappia d'onde essa provenga. Dapprincipio credevasi che ci venisse portata dall'isola di Ceilan, la di cui capitale Colombo sembrava aver dato il nome alla nuova sostanza medicamentosa. Per altro Ger. Koenig asserisce, che i Pottoghesi la traggono dal Mozambico e che i Caffri ne fanno un commercio assai vanteggioso (7). Il primo a farne cenno fu Franc. Redi che la vanta qual antidoto (8); e Girol. Dav. Gaubio la esaminò sotto il nome di radice di lopez paragonado alla simruba (9). Dipoi la scandagliò più attentamente Gio. Fed. Cartheuser (10); e Dav. Macbride la

- (1) Mem. de l'acad. des scienc. a Paris, a. 1729. p. 32.
 - (2) De dysenter. p. 290.
 - (3) Della dissenteria, p. 495.
- (4) Treatisse on medical and pharmac. chymistry, vol. III. p. 268. Lond. 1788. 8.
 - (5) Diss. de cortice simalouba. Helmstad 1746. 4.
 - (6) Transact. of the roy. soc. of Edinb. v. II. p. 73.
 - (7) Retz observ. botan. fascic. IV. p. 5.
- (8) Experimenta circa res diversas naturales, p. 142.

 Amestold. 1675. 12.
- (9) Adversarior. var. argum. lib. I. p. 78. Leid.
- (10) Diss. physico-med. p. 136. Francof. ad Viadr. 1775. 8.

raccomandò nella diarrea biliosa (1). Tomm. Percivall, che ci fornì un trattato compiuto intorno a questa sostanza, confermò la facollà sedativa attribuitale già da Gaubio (2); e Carlo White dimostrò, che la radice di colombo mercè la sua virtù corroborante previene la generazione della bile (3), osservazione comprovata da Gio. Andree (4) e da Dan. Monro (5).

La corteccia di Winter, confusa sovente colfa canmanenti i più singolari ed attivi. Il paese, d'onde si trae
la Terra del fuoco nello stretto Magellanico, scorge talmente di rado avvicinarglisi de' viaggiatori, che molti non
temono di spacciare per questa delle altre corteccie. Gio.
Winter compagno di viaggio del famoso navigatore Drake,
portò seco nel 1579, una piccola quantità di sì potente
aroma, di cui n'ebbe dappoi una porzione Carlo Clusio (6).
Dopo di lui non pochi scrittori accennarono e descrissero
la corteccia Winterana; ma egli è certo, che solo dopo
gli ultimi viaggi di Cook ne fu nuovamente portata in
Europa una considerevole quantità. Solamet (7), e Giorgio Forster (8) dettero una esatta descrizione della pian-

⁽¹⁾ Methodical introd. to the theory and pract. of medic. vol. I. p. 467.

^{. (2)} Essays , vol. II. p. 3-37.

⁽³⁾ Treatise on the management of the pregnant and ying-in women, p. 70.

⁽⁴⁾ Collez. pei medici pratici, vol. XIV. p. 71.

⁽⁵⁾ Treatise on medical and pharmaceut, chymistry vol. III. p. 76.

⁽⁶⁾ Exotic. p. 75.

⁽⁷⁾ Medical observat. and inquiries, vol. V. p. 46

⁽⁸⁾ Viaggio attorno il mondo, P. III. p. 316, Berlino 1784, 8. Nov. acta upsal, v. III. p. 181.

ta; ed il secondo s'occupò specialmente nell'indicare i caratteri che la distinguono dalla cannella bianca.

51. Le ghiande meritano un posto distinto nella classe dei corroloranti e nutritivi. Sembra, che la panizzazione, onde gli abitanti della Norvegia si servono di questa produzione ne abbia additato le prime tracce per
l'uso medico (1); e Fed. Gius. Gugl. 'Schroeder professore di Marburgo si rendette benemerito coll'essere stato
il primo a tentare e a raccomandare un medicamento sì
attivo nelle scrofole e nella rachitide (2). Quindi Marco
Gius. Marx illustrò viemmeglio l'efficacia di questa sostanza nelle cachessie procedenti da congestioni addominali (3).

Ebbe l'istessa origine l'uso medico che si fa del lichene islandico da circa trent' anni. I Lapponi e gl' Islandesi lo conosecvano già come sostanza alimentare (4); ma Olao Borricchio lo accenna come medicamento fin dal 1673. (5), ed Urbano Hjarne dieci anni appresso lo decanta contro l'emottisi e la tisi polmonare ulcerosa (6). Dobbiamo però al sommo Linneo (7) e a Gio. Ant. Seo-

⁽¹⁾ Bortholin, medicin, danor, domest, pag. 404 Hafn, 1765, 8.

⁽²⁾ Degli effetti delle ghiande per isciogliere le ostruzioni delle glandule nel corpo umano; Gottinga 1774. 8.

⁽³⁾ Nuove esperienze sull'attività delle ghiande. Hannov. 1776. 8.

⁽⁴⁾ OLIFFEN, viaggio in Islanda, vol. I. pag. 84. Copenhagen 1774. 4. - HALLER dissert. pract. vol. VI. p. 723.

⁽⁵⁾ Acta med. et philos. Hafn. vol. I. p. 126.

⁽⁶⁾ Vetensk. acad. Handl. f. a. 1744. p. 170.

⁽⁷⁾ Flor. lappon. p. 340.

poli (1) le prime esatte ricerche intorno a questo vegetabile.

Singolari virtù vennero pure attribuite a due altre specie di licheni, la peltigera canina, e la cladonia pixidata di Hoffmann. La prima, nota sotto la denominazione officinale di Muscus cinereus terrestris, mescolata con pepe, fu celebrata da Giorgio Dampier qual rimedio sicuro contro l'idrofobia, e si mantenne in voga mediante gli elogi fattine dall'esperto e rinomato Mead (2). Codeto pulvis antilyssus cadde però giustamente in obblio. quantunque Dan. Pietro Layard abbia cercato di farlo rivivere qual eccellente diurctico (3). A' giorni di Tommaso Willis il lichene pixidatus era già usato comunemente nella tosse canina (4), attività confermata dagli esperimenti di van Woensel (5). Ma con maggior precisione ed imparzialità esaminarono questo medicamento D. Emmanuelle de Azconovieta (6), e G. B. Gius. Dillenius (7).

52. In nissun' epoca furono decantati tanti antelmintici, quanti dopo la metà del penultimo secolo, Si cominciò dalle due spigelie, l'anthelmia e la marilandica. La seconda era già in uso da lungo tempo come rimedio domestico nella Carolina meridionale, priacchè Aless. Garden ne avesse instituita alcuna ocservazione o datane con-

⁽¹⁾ Ann. histor. natur. 1. p. 112, 2. p. 107. 118,

⁽²⁾ Opp. med. tom. II. p. 119. 126.

⁽³⁾ Saggio sull' idrofobia, pag. 86. Lispia 1778. 8.

⁽⁴⁾ De medicam. operat. p. 62.

⁽⁵⁾ Histoire de la soc. roy. de medec. v. II. p. 295. (6) Extractos de las juntas generales celebradas por

[#] R. soc. Basconhada, 1781 p. 43-56. (7) Dissert. de lichene pyxidato, Mogunt. 1785. 8.

tezza (1). Altri due medici di Charlestown, Gio. Lining (2) e Liouello Chalmers (3) confermarono queste notizie. Acquistò per altro maggior voga l'altra specie, spigelia anthelmia, che cresce spontaneamente nel Brasile et nelle Indic occidentali, dietro appunto gli elogi di Pat. Browne che la vautò contr'ogni sorta di vermi (4). In seguito Linneo ha descritto esattamente la pianta (5) e e Brocklesby ripetò le raccomandazioni di Browne (6).

Eduardo Bancroft e Jac. Kerr introdussero le due specie di dolico americano (dolichos pruriens e dolichos urens) quai rimed sicuri contro gli ascaridi l'ombricoidi (7); indi Gugl. de Chamberlsine confermò con un'apposita discrtazione l'efficacia di questo coà detto stisolobio (8), che ugualmente trovasi lodato da Arr. de Paiva medico e naturalista Erasiliano (g).

Gugl. Vright (10) e Nic. Bondt annoverarono fra gli

(1) Nuove esperienze ed osservazioni della soc. d'Edimb. vol. 111. p. 139.

(2) Ivi vol. I. p. 453.

(3) Sul clima e sulle malattie della Carolina meridionale, vol. I. p. 66. Stendat 788.

(4) The civil and natural history of Jamaica, p. 157. Lond. 1756. fol.

(5) Amoenit. academ. vol. V. p. 133.

(6) Oeconom. and medic. observ. p. 282.

(7) Storia natur. della Guiana, pag. 241. Fref. 1769. 8. - Edimb. Comment. vol. II. p. 209. dove si trova la descrizione botanica del dolichos persiens.

(8) Tratt. pratico sulla virtù antelmintica dello sti-

zolobio. Altenb. 1786. 8.

(9) Memorias de historia natural, p. 63.61. Lisbon 1790. 4.

(10) Philosoph, transact. v. LXVII. p. 606- 512.

antelmintici due specie di geoffroea, cioè la Geoffrova inermis e la surinamensis (1). Parecchi autori Inglesi accennano la corteccia della prima sotto la denominazione di cabbage-bark (2).

Fu tentata come antelmintica anche una specie di conferva, fucus Helminthochortos. Questa produzione marina passò dalla Corsica in Francia l'anno 1775, e venne frequentemente impierata dai medici di quella nazione. Ant. Luigi de la Tourette (3) e Pietro Giuseppe Schwendimann (4) ne trattarono estesamente; e Bonvier ne fornì un'esatta analisi chimica (5).

53. Anche l' olio di cajeput è un medicamento introdotto verso il principio dello scaduto secolo, ed usato pressochè esclusivamente dai medici Tedeschi, Massim, Locher ne ha fatto il primo cenno l'anno 1717, come di un olio aromatico (6); e poi Schendo van-der Beck (7), Gio. Crist. Coetz e Trew lo vantarono contro l'epilessia ed altre affezioni spasmodiehe, contro l'odontalgia e la paralisi (8). Per lungo tempo portò til nome d'olio Witnebiano, perchè un certo ecelesiastico di Wolfenbuttel

⁽¹⁾ Diss. de cortice Geoffracae surinamensis, L. B. 1788. 8.

⁽²⁾ CHAMBERLAINE I. C.

⁽³⁾ Journal de physique, tom. XX. p. 166. 184.

⁽⁴⁾ Diss. Helminthochorti historia, natura atque vires. Argentor: 1780. 4.

⁽⁵⁾ Annales de chimie, tom. IX. p. 83-95.

⁽⁶⁾ Ephent nat. curios. cent. V. VI. app. p. 147. (7) Act. nat. curios. vol. I. app. p. 111.

⁽⁸⁾ Commerc. literar. Norie. a. 1731. p. 36. a. 1734. p. 35.

chiamato Witneben avea insegnato il modo di prepararlo (1). Pare, che sotto questa denominazione si vendesse sovente dell'olio di cardamomo. Giorgio Ever. Rumphius (2) ed indi lo stesso Linneo (3)hanno dimostrato, che il vero olio di cajeput si ottiene colla distillazione dalle foglie della metaleuca lucuadendron.

Dopo la metà del passato secolo venne decantato un nuovo specifico contro l'artritide, cioè la rosa bianca della Siberia (rhodendron chrysanthum) descritta la prima volta da Gio. Giorgio Gmelin sotto il nome di andromeda fol. ovatis utrinque venosis (4). Questo scrittore assicura, che gli abitanti del lago di Buikal, del fiume Lena e delle isole di Beering adoperano l'infusione teiforme di questo piccolo arbusto qual rimedio sicuro contro l'artritide ed i reumatismi. Pietro Sim. Pallas ha data dipoi una descrizione più esatta di questa pianta (5), e ne spedì una discreta quantità a Guthrie di Pietroburgo e ad Aless. Bern. Koelpin di Stettin, perchè ne instituissero dell'esperienze. Il primo ne fece avere una porzione al dott. Duncan di Edimburgo, ma non si seppero giammai i risultati delle loro osservazioni (6). Koelpin lo sperimentò sopra quindici artritici, ora con vantaggio ora senza (7).

- (1) Murray appar. medicam. v. III. p. 323.
- (2) Herbar. amboin. vol. II. p. 72.
- (3) Spec. plantar. ed. Willdenow, tom. III. P. II. pag. 1429. V. Joh. FEDER. CARTHEUSER dissert. selectior. p. 87-112.
 - (4) Flor. Sibir. tom. IV. p. 121. tab. LIV.
 - (5) Viaggi in diverse provincie della Russia, vol. III. p. 369.
 - (6) Edinb. Comment. vol. V. p. 471.
 - (7) Riflessioni pratiche sull'uso della rosa bianca di

Mi rimane da far mensione del catrame e della trementina , resine liquide ambedue, cui furono attribuite delle virtè particolari contro certe malattie. Gih da lungo tempo nella Germania e nella Norvegia il primo era considerato qual domeștico specifico per le febbri epidemiche (1), ma il vescovo Giorgio Berkeley ne dichiarò l'infusione un eccellente rimedio contro il vajuolo, lo scorbuto, le malattie cutanee e l'artititde (a). Parimente Nils Rosen di Rosenstein lodò l'acqua di catrame almeno per rendere più mite l'eruzione vajuolosa (3). Quanto allo spirito di trementina, alcuni lo proposero come un solvente specifico de' calcoli biliari. Boerhaave lo prescriveva nell'itterizia cagionata da concrezioni biliose (4). E Durande lo univa per tale oggetto all'etere solforico (5).

b) Medicamenti minerali.

54. In questi ultimi secoli la materia medica ricevette un considerevole aumento dal regno minerale. Dobbiamo però allo spirito de tempi moderni un solo criterio sull'uso de' medicamenti terrosi ed assorbenti, degli acidi cotanto esaltati in addietro. Il becoar, le madri perle, i boli, le terre sigillate, e i coralli, l'unicorno fossie, i diamanti ed altre pietre preziose, in somma tante terre si-

Siberia nelle affezioni artritiche, Berlino 1779. 8.

- (1) HERMANN, mat. med. vol. 1. p. 660.
- (2) Siris, or inquiries concerning the virtues of tarwater. Lond. 1744. 8.
 - (3) Underrattelse om Barns-sjukd, p 157.
 - (4) Swieten constitut. epidem. v. I. p.112.
- (5) Nouvell. mem. de l'acad. de Dijon 1782. sem. 1. p. 199. sem. 2. p. 26.

liece ed argillose furono tutte dichiarate inutili e nocive, concorrendo l'analisi chimica a spargere principi più giusti ed esatti-sull'uso di questi così detti specifici. A dir vero Boerhaave ed Hoffmann avean già confutato quei chimiatrici, i quali risguardavano gli antacidi per rimedi universali nelle malattie febbrili, supponendo di rinvenire negli acidi la cagione principale della febbre. Ma Rosenstein (1), e Baldass. Luigi Tralles (2) s' opposero con viemmaggiore energia e fondamento ai pregiudizi che aveno regnato fin allora intorno alle terre assorbenti. Pringle ha dimostrato (3), ma con esperienze instituite sopra fluidi morti, che le terre promuovono la putrefazione, e de Haen disapprovà il loro uso specialmente nelle malattie cautte (4).

In luogo di queste terre insolubili fu introdotta fino dalla metà del scoolo diciassettesimo la magnesia vantata da Hoffmann principalmente per neutralizzare gli acidi del ventricolo e per procurare una blànda evacuazione (5) Dopo di lui Gius. Black (6) e Andr. Sigism. Margraf (7)

(1) De medicamentis absorbentibus, corumque perverso usu. Upsal 1749.

(2) Ewamen rigor. virium, quae terreis medicamentis. tribuuntur. Vratisl. 1740.

(3) Observat. on the army, p. 398. Lond. 1752. 8.

(4) Rat. medendi P. I. p. 16.

(5) Opp. vol. IV. p. 479. 500. V. Jo. Adr. Slevest et Burch. Jo. Lembechen diss. magnesia alba, nosum et innoxium purgans. Jen. 1709. 4.

(6) Nuove esper. ed osservaz. della società d' Edim-

burgo, vol. II p. 172-254.

(7) Opere chimiche, vol. II, p. 20, 32. Berlina 1767. 8.

distinsero con maggiore accuratezza la magnesia dalla calce; e Tomm. Henry farmacista a Manchester (1) indico i pregi della magnesia preparata coi sale d'Empson, in confronto di quella ottenuta dal capomorto del nitro. P. Hunauld medico in Hangers fu il primo a riconoscere nella medesima una leggiera facoltà calmante (2).

55. Le virtù della calce, specialmente dell'acqua di calce, degli alcali e del sapone contro i calcoli orinari, formarono verso la metà del penultimo secolo, il soggetto di moltiplici ricerche. Anche ne' tempi più rimoti la calce de' gusci di conchiglia fu risguardata come un rimedio sicuro contro l'accennata affezione (3). Per altro i Paracelsisti raccomandarono in vece gli alcali; e Basilio Valentino non che Olao Borricchio, impiegarono a taleffetto i gusci d'ostrica bruciati (4). Ultimamente, cioè del 1730, menò in Inghilterra gran romore il segreto di Giovanna Stephens, svelato al Parlamento per la somma di cinque mila lire sterline. Fatte intorno allo stesso alcune indagini, si rilevò, ch'esso trovasi composto di guscid' ostriche e di sapone di Spagna (5). Intanto cotesta divulgazione occasionò non pochi esperimenti sui litontritici. Theof. Lobb negò a dirittura qualsisia facoltà di sciogliere i calcoli all'acqua di calce ed agli alcali, e raccomandò piuttosto le sostanze acide, spiritose e leggier-

⁽¹⁾ Medical transactions, publ. by society of physicin Lond. I. II. p. 230. a. 1770.

⁽²⁾ Dissert. sur les vapeurs et les pertes de sang, p. 260. Paris 1771. 8.

⁽³⁾ PLIN. histor. natur. lib. XXX. c. 8.

⁽⁴⁾ BARTOLIN. epist. medic. lib. IV. 79. pag. 451.

⁽⁵⁾ Esperienze ed osservazioni d' Edimburgo, Vol. V. pag. 1310. 1311.

mente fermentanti (1). Del pari Jacopo Parsons (2) e Jacopo Fed. Schreiber rigettarono interamente l'acqua di calce e i saponi (3), protetti in seguito da Dan. Hartley (4) e da Gio. Rutty (5), e poscia rigorosamente esaminati da Baylies (6).

Anche il rimomato Stefano Hales considerò attentamente le virtù degli alcali de' saponaj, e fece vedere, che disseccato a guisa della pietra infernale, non può più agire egualmente contro i calcoli orinarj (7). Parimenti Cheselden trovò in tal caso efficace l'alcali sopramentovato de' saponaj (8); e Rob. Lucas sperimentò utile in sè medesimo l'acqua di calce ed il sapone di Spagna (9).

Morando scemò la grande riputazione dell'acqua di calce, degli alcali e del sapone nella cura delle affezioni

⁽¹⁾ Treatise on dissolvents of the stone. Lond. 1739. 8.
(2) Description of the human urinari bladder and parts belonging to it. Lond. 1742. 8.

⁽³⁾ Epist. ad Hallerum, de medicamento a J. Stephens divulgato. Gott. 1744. 8.

⁽⁴⁾ Aview of the present evidence for and against Mrs Stephens medicines. Lond. 1739. 8. Diss. epistol. de lithonthriptico a J. Stephens nuper invento. L. B. 1748. 8.

⁽⁵⁾ An account of some new experiments on J. Stephens medicine etc. Lond. 1742. 8.

⁽⁶⁾ Experimental essays on medical subjects, p. 200.
(7) An account of some new experim. and observ. on

I. Stephens medicines. Lond. 1740. 8.
(8) Lesle estratto dalle Transaz. filosof. v. III.

p. 65.

⁽⁹⁾ Ivi p. 74. e seg.

calcolose, limitandonie i vantaggi agl'individui provetti ; ed osservò, che le ulceri della vesoica ripuganao all'uso di questi rimedi (1). In oltre Pol. Amed. Schacher (2) e G. C. Springsfeld (3) cercarono di dimostrare la preferenza delle acque minerali di Carlsbad, d'indole alcalina, in confronto dell'acqua di calce per la cura de calcoli orinari.

Ma le più sode ed attente ricerche sopra questo soggetto noi le dobbiamo al noto Rob. Whytt, il quale s'adoprò specialmente a far conoscere l'utilità dell'acqua
di calce ottenuta dai gusci di conchiglie, non, che delle
injezioni della medesima (4). Fra le storie di malattie da
lui descritte, merita maggior attenzione quella del ministro Valpole liberato da un calcolo orinario mediante de
specifico di mad. Stepheus. In seguito la morte prematura di questo paziente venne attribuita all'uso soverchio
di sapone, chie arrecò una totale dissoluzione degli untori (5) Whytt prescriveva l'acqua di calce anche nell'artritide, a tatesa un' apparente affinità tra l'una e l'altra
specie d'infermità (6) Ricc. Lower, Morton (7), Jac.

(2) De thermarum carolinarum usu in renum et vesicae morbis. Lips. 1741. 4.

(4) Opere di pratica, p. 8-238.

(6) L. c. p. 514.

⁽¹⁾ Mem. de l'academ. des scienc. à Paris, a. 1741. p. 256. 268.

⁽³⁾ Comment. de pracrogativa thermar. carolinarum in dissolvendo calculo vesicae prae aqua calcis vivae 1756. 4.

⁽⁵⁾ Wil. Adams' diquisitions of the stone and gravel, p. 39. Lond. 1774. 8.

⁽⁷⁾ Opp. tom. III. p. 41.

Grainger (1) e Giorgo Crist. Detharding (2) la vantarono anche in altre malattie croniche, specialmente in quelle che seguono i morbilli e la dissenteria.

Browne Langrish confermò le osservazioni di Whytt sulla preferenza della calce tratta dai gusci delle conchiglie (3), me in generale riputò più attivo l'alcali de' saponaj. Egli propose le injezioni di questo litontritico nell'uretra, perchè l'uso dell' acqua di calce è men sicuro; nel che fu seguito da Gugl. Butler, avvegnachè questi risguardasse la calce come più attiva del sapone (4) Rob. Whytt mosse quistione con Carlo Alton sui pregi della calce' di conchiglie, e sostenne, che l'acqua di calce mantiene a lungo le sue proprietà e non soffre dall' aria alcuna decomposizione (5).

Niuno però tentato avea prima di Dav. Macbride una teoria, per ispiegare gli effetti dell' acqua di calce e dell'alcali de' saponaj. Siccom' egli derivò l'aumento di coerenza in tutti i corpi dell'acido carbonico, attribul la facoltà solvente dell'acqua di calce e dell'alcali alla loro affinità coll'acido carbonico, e quindi stabilì la regola di non mescolare giammai colla prima le sostanze suscettibil di fermentazione, come sarebbe il latte, e simili (6). Non

⁽¹⁾ Nuove esperienze ed osservazioni di Edimburgo, vol. II. p. 290.

⁽²⁾ HALLER, dissert. pract. vol. VII. p. 258.

⁽³⁾ Physical experiments upon brutes. Lond. 1746. 8.

⁽⁴⁾ A method of cure for the stone, chiefly by injections. Edinb. 1754. 12.

⁽⁵⁾ Dissertation on quick-lime and lime-water. Edinb. 1754. 12.

⁽⁶⁾ Experimental essays, p. 111. 230.

tardò però a contraddirgli Ant. de Haen, il quale ritenne opportunissima l'aggiunta del latte all'uso dell'acqua di calce (1). Per altro lo stesso Macbride cercò di dimostrare, contro l'opinione di Pringle, la facoltà antiettica dell'acqua di calce; e quindi poteva scorgere, che questa al pari di tutti gli altri litontritici aginee, anzichè per effinità chimica, mediante il suo stimolo sulle prime vie e l'accresciuta attività consensuale negli organi secretori dell'orina. Giò potevasi dedurre dalla sperimentata inutilità degli accennati rimedi, per cui Gius, Quer (2), Carlo Abt. Gerhard (3), Mich. Girardi (4), Giò. Andr. Murray (5) proposero di sostituirvi l'arbutui uva ursi, che tanti elogi si meritò di poi anche da Gerardo van Switten (6), e da Ant. de Haen (7).

56. L'uso degli alcali portato tropp' oltre dai chimiatrici del secolo diciassettesimo, e ristretto poscia da Fed. Hoffmann e da Boerhaave, fu rimesso în voga da alcuni medici eccletici di questi ultimi tempi. Senz'appoggiarsi ad ipotesi chimiche, bastavano alcuni imponenti effetti di

⁽¹⁾ Rat. med. P. XIII. p. 132.

⁽²⁾ Dissertacion physico-botanica sobre la passion nephritica, y su verdadero específico, la uva urso. Madr. 1763. 4.

⁽³⁾ L'uva ursina considerata sotto l'aspetto chimicomedico. Berlino 1763. 8.

^{. (4)} De uva ursina, ejusque et aquae calcis vi lithontriptica. Patav. 1764. 8.

⁽⁵⁾ Opusc. vol. I. p. 1-101.

⁽⁶⁾ Comment. in Boerhaav. aphor. vol. V. p. 313-336.

⁽⁷⁾ Rat. med. P. V. p. 181.

queste sostanze a far conoscere la proprietà loro estremamente stimolante, dimostrata già non ha guari colla "maggiore evidenza mercò gli esperimenti di Humboldt e di Fil. Michaelis (1). Cullen attribut con ragione agli alcali una facoltà solvente e diuretica, ripetendo quest' ultima dalla loro combinazione coll'acido del ventricolo, d'onde risulta un sal neutro (3). Anche Franc. Milman trovò utile gli alcali nell' idropisia (3), e da lungo tempo l'ammoniaca volatile fu risguardata come un ottimo eccitante. Bern. Jussieu, le l'éun (4) e parecchi Francesi prescrivevano con profitto l'eau de tuce nella malattia prodotta dalla moricatura della vipera; Darluc, Hernet (5) ed alsti nell' idrofobia; Donaldo Monro nel tifo patrido (6); Majault nella cinanche cancrenosa (7), e Peyrilhe nella stifilide (8).

Tacerò qui degli acidi minerali già lodati ed usati

- Quadro storico-critico dello stato della medicina
 335. 508.
 - (2) Materia medica, p. 133. 576.
- (3) Della natura e del trattamento dell'idropisia, p. 89. Braunschw. 1782.
- Recueil period. d'observat. de medecine, tom.
 pag. 412. Journal de medec., tom. XVIII. p. 150.
 Journal de medec. tom. XIV. pag. 499. tom.
- LXII. p. 584.

 (6) Delle malattie ne' Lassaretti militari, p. 56.
 - (7) Recueil period. tom. V. p. 25.
- (8) Perrinus remede nouveau, contre les maladies enereinnes. Paris 1774 Horn exposition raisonnee des differentes methodes d'administrer le magure dans les maladies seneriennes. Paris 1778, 12.

non solo ne tempi addietro, ma altreà a'nostri giorni. Benà d'uopo è ch'io mi trattenga sull'uso dei gas, l'applicazione medica dei quali dee i maggiori suoi perfezionamenti ai travagli ed agli studi dei moderni.

57. Il gas acido-carbonico, descritto la prima volta da Elmonzio sotto la denominazione di gas sylvestre (4). esaminato dipoi attentamente da Rob. Boyle (2) e da Steff. Hales (3) era già tanto noto, che si avea imparato ad osservare la sua origine nella fermentazione e putrefazione de' corpi , e la sua presenza nelle acque acidule e minerali. Tuttavia si continuava a chiamarlo aria artificiale (aer factitius). Gius. B'ack s' immaginò di estrarlo prima d'ognaltro dagli alcali più blandi e dalla magnesia, lo denominò aria fissa, e derivò la qualità caustica degli alcali dalla mancanza della medesima (4). Enr. Cavendish (5) e Dav. Macbride si rendettero vieppiù benemeriti per la teoria di questo gas. Il secondo considerò la mancanza di esso, qual cagion primitiva della putrefazione (6); ma Gugl. Alexander gli si oppose, facendo vedere, ch'esso piuttosto è una conseguenza dell'accennata dissoluzione (7). Macbride ripetè inoltre l'integrità del mescu-

⁽¹⁾ Storia della medicina, Sez. XIII. S. 19.

⁽²⁾ Opp. aol: IV. p. 236.

⁽³⁾ Statical essans, vol. I. p. 100.

⁽⁴⁾ Nuove esperienze ed osservazioni di Edimburgo, vol. 2. p. 206.

⁽⁵⁾ Philosoph: transact. vol. LVI. pag. 141. LVII.

⁽⁶⁾ Experimental essays , p. 32.

⁽⁷⁾ Esperienze mediche, p. 246.

glio degli organismi viventi dal passaggio dell' aria fissa de'cibi e delle bevande nella massa sanguigna, e propose di prevenire la corruzione degli umori coll'uso dell'aria fissa e delle sostanze fermentanti (1). Quindi la raccomandò specialmente contro lo scorbuto facendo fermentare la potassa coll'acide di limone, o prendere del maho (2). Gibson sprimentò quest' ultimo medicamento anche esternamente sulle ulceri scorbutiche, e lo riscontrò assai giovevole per correggere il fetore della sanie e la dilatazione dell'escara, senz'aver però ottenuto giammai una guarigione radicale (3). Benjamino Rush confermò questi vantaggi (4); ma la testimonianza più favorevole alla scoperta macbridiana la fornì il capitano Cook , che nel secondo suo gran giro attorno il globo ripetè la salute del suo equipaggio dal malto e dai cavoli salati (5). Georgio Brown e Mounsey confermarono l'utilità diquesti ultimi, non che del quass (bevanda fermentante usata dai Russi e composta colla farina di segala) per prevenire lo scorbuto (6). Finalmente anche Enr. Gius. Collin sperimentò quella del malto nelle ulceri e nel tifo putrido (7).

Il sommo fisico Gius. Priestley non solo contemplò più attentamente la natura dell'aria fissa, ma inventò al-

⁽¹⁾ L. c. p. 27. 161.

⁽²⁾ L. c. p. 170.

⁽³⁾ Medical observat, and inquir. vol. IV. p. 180, (4) Isi p. 367.

⁽⁵⁾ FORSTER viaggi, introd. p. 79. Edinb. Comment. vol. IV. p. 313.

⁽⁶⁾ Edinb. Comment. vol. IV. p. 235. 318.

⁽⁷⁾ Observat. circa morbos acutos et chroni P. W.; p. 112.

treà un apparato particolare per applicarla ne' cristei , ovvero esternamente sulle ulcere cancerose onde correggere la sanie delle medesime (1). Anzi credette che si potesse sostituire alle acque minerali di Pyrmont dell'acque semplice impregnata d' aria fissa. Natan. Hulme (2) e Gio. Leake (3) ordinarono nelle febbri puerperali, massime in quelle accompagnate da diarce putride, l' aria fissa che si sviluppa nella bibita di Riverio; e quindi il primo la vantò centro i calcoli della vessica, l' artritide, lo scorbuto e le febbri putride (4); elogi ripetuti dappoi da Bren (5) e da Matt. Dobson (6).

Tommaso Percivali instituì i primi tentativi sull'ispirazione del gas accido carbonico nella tisi, avendo osservato, che.l' atmosfera delle acque minerali di Bath riusciva giovevole agl' individui attaccati da aì fatta malattia, apportando ai medesimi, se non un' intiera e radicale guarigione, almeno un considerevole alleviamento de' sintomi (7).

⁽¹⁾ Philosoph. transact. vol. LXII. p. 257. Directions for impregnating water with fixed air. Lond. 1772.

8. Esperiense ed osservationi sopra differenti specie di aria, trad. dall' Ingl. P. I-III. Vienna 1778. 1780. 8.

⁽²⁾ Treatise on the puerperal fever, Lond. 1772. 8.

⁽³⁾ Practical observ. on the childebet-fever, pag. 161. Lond. 1772. 8.

⁽⁴⁾ Notizie intorno a un rimedio facile e sicuro contro i calcoli renali e della vescica, trad. dall'Ingl. Lipsia 1778. 8.

⁽⁵⁾ Journ. de medec., tom. LXIII. p. 490.

⁽⁶⁾ Delle virtù medicinali dell'aria fissa, trad. dall'Ingl. Lipsia 1781. 8.

⁽⁷⁾ Essays physical and experiment., v. II. p. 73.

Si avea già da lungo tempo ritrovato, che l'esalazioni dalla terra recentemente mossa recavano un notabile solliero a' tisici; ma solanto dalle ultime teorie chimiche si arrivò a comprendere che la terra scavata di fresco tramanda principalmente del gas acido carbonico sotto la forma di gas. Perlochè Franc. Solano de Luque, medico di Antequera nella Spagna, raccomandò cotesti bagni terrestri nella tisi fin dal 1725, facendo coricare o stare in piedi tali ammalati col corpo fin al collo nella terra scavata di fresco. Fouquet imitò questo metodo, e se ne servi non solo per la tisi, ma eziandio per le ulceri inveterate delle gambe (1). Sam. Foart Simmons confermò i vantaggi del nuovo rimedio (2).

Anche l'aria contenuta nelle stalle dei bovini, raccomandata ultimamente da Beddoes nella tisi, agisce principalmente mediante il gas acido carbonico ond'è impregnata. Read, che fu il primo a proporne l'uso, ne ripetò gli effetti piuttosto dalla mite temperatura e dalle esalazioni balsamiche che si manifestavano nelle stalle dei bovini (3). Per altro egli determinò colla massima accuratezza le cautele da praticarsi in tali circostanze. E Pietro Jon. Bergio confermò i vantaggi di questo trattamento in que' casi di tisi, dove riesce troppo stimolante un'aria più pura (4).

Il gas ossigeno proposto da Gio. Priestley per riani-

⁽¹⁾ Gazette de santè, a. 1775. p. 201.

⁽²⁾ Practical treatise on the treatment of consumtions. Lond. 1780. 8.

⁽³⁾ Essais sur les effets salutaires du sejour des étables dans la phtisie. Londres 1767. 8.

⁽⁴⁾ Raccolta pei medici pratici, v. XI. p. 7.

mare le forze nelle morti apparenti, fu sperimentato con buon successo da Gio. Ingenhouss sopra se medesimo e sull'asmatico Mass. Stoll. (1). Ma ultimamente Fourcroy contribuì più d'ogo'altro ad universalizzare l'applicazione di sì importante rimedio (2).

58. Verso la metà del secolo diciassettesimo si cominciò ad introdurre nella medicina il fosforo. Fu usato in Francia contro i dolori colici (3). Ma Mentz medico a Langensalze è stato il primo (nell'anno 1750) a servirsi di questa sostanza, come utile ed opportunissimo eccitante nelle febbri asteniche, facendone prendere tre grani nella conserva di rose, ed ottenendone un aumento di traspirazione e di vigore (4). Fed. S. Morgenstern somministrò senz' alenn profitto il fosforo in una scarlatina (5); all'incontro Emman. Hartmann lo ordinò sciolto nello zolfo, e lo riconobbe assai utile nelle febbri asteniche e nella tisi (6). Boenneken n'ebbe dei vantaggi in un tetano violento (7). Melch. Ad. Weikar lo considerò un ottimo stimolo, fin anche nell'apoplessia, inculcando nello stesso tempo la circospezione da non ommettersi nell' uso del medesimo (8); e Trampel lo ordinò nella podagra e nell'ar-

⁽¹⁾ Miscellan. v. II. p. 387. Vienna 1784. 8.

⁽²⁾ Hufeland Annali della medicina francese, vol.
I. p. 353.

⁽³⁾ Abr. Vater, et Jo. Gabr. Mentz in Haller. dissert, pract. v. VII. p. 292.

⁽⁴⁾ Ioi.

⁽⁵⁾ Sandifort thesaur. dissert. v. I. p. 169.

⁽⁶⁾ Ivi p. 170.

⁽⁷⁾ Osservazioni di fisica e medicina nella Franconia, vol. VI. p. 21.

⁽⁸⁾ Opuscoli misti di medicina, v. 1. p. 747.

tritide, derivando l'origine di queste malattie dalla man-

canza di acido fosforico (1).

Dobbiamo ad Hofkens de Courcelles (a) la prim'analisi, e disamina del bitume judaico, ossia dell'asfalto, risguardato da lungo tempo presso gli abitanti del Wolga e dell'Ural qual potente specifico contro l'esulcerazioni esterne ed interne (3), e conosciuto in Olanda come rimedio domestico pra la tisi (4). De Courcelles dava alla dose di dicci gocce mescolato collo zucchpro l'olio destillato dall'asfalto, e riferisce diversi casi di tisi, in cui riuscì estremamente giovevole un tale medicamento. Anche Fed-Luigi Bang (5) ed Arr. Callisen (6) narrano casi consimili,

59. Fra i metalli, fin anche l'arsenico venne sperimentaco come medicamento. Ho già altrove accennato (7), che gli Arabi e i Greci usarono con frequenza l'orpimento, e che Gabr. Faloppio adoperò lo stesso arsenico nella cangrena e nelle ulceri canecrose (8). Quindi Elmonzio non ha enunziato una novità, allorquando disse

⁽¹⁾ Osservazioni ed esperienze, v. 2. p. 75. Lemgo 1788. 8. (2) Verhandeling, uitg. door de Maatsch, der We-

tensch. te Haarlem, D. VIII. pag. 475. 485. D. IX.
p. 603-623.

(3) Pallas viaggj in alcune provincie dell' Impero

⁽³⁾ PALLAS viaggj in alcune provincie dell' Impero Russo, vol. I. p. 100.

⁽⁴⁾ Journal de medec. tom. XXIII. p. 369.

⁽⁵⁾ Diar. nosocom. Hafn. vol. I. p. 7. 101. 102. 166. vol. II. p. 74. Iufn. 1789. 8.

⁽⁶⁾ Act. societ. med. Havn. vol. I. p. 73.

⁽⁷⁾ Storia della medicina, Sez. V. §. 45. Sez. VI. §. 76. 85.

⁽⁸⁾ Ioi Sez. X. S. 14.

che il Realgar fixum guarisce colla sua proprietà venefica oltre 60 specie di ulceri (1). In queste malattie l'arsenico era impiegato soltanto esternamente; e forse le prime esperienze di somministrarlo internamente derivarono da qualche seguace o traduttore ignorante degli Arabi, che considerò il Dar-sini (cannella) per arsenico (2). Per altro a'tempi di Wepfero era già in voga un febbrifugo arsenicale, di cui Wepfero istesso n'ebbe la descrizione da Gio. Rud. Burkhard professore di Basilea (3). Fr. Gio. Molitor racconta, che parecchi medici ordinarono con buon successo nelle intermittenti l'arsenico bianco, alla dose di un grano unito al cremor di tartaro , locche a me sembra incredibile (4). Il primo che abbia insegnato ad usare questo minerale colla dovuta circospezione, fu Gio. Grist. Jacobi , il quale per far evaporare l'acido arsenicale, mescolo l'arsenico bianco colla potassa, e lo sciolse in 169 parti d'acqua (5). Tuttavolta Ant. Stoerk assicura, che anohe questo mescuglio non ha mancato di produrre delle terribili conseguenze (6). Heuermann e Fo-

(1) Seab. et ulcera schol. p. 259.

(2) Storia della medicina Sez. VI. §. 46.-Dav. & PLINISCANPY preseriveva internamente l'arsenico nella sifilide alla dose di 5. a 7. grani. V. Girtanner delle malattie veneree, vol. II. p. 238.

wler seguirono il metodo di Jacobi (7), ma più frequen-

(3) Histor. cicutae aquaticae, p. 291.

(4) Dissert. de febre continua maligna. Heidelb. 1736.4. (5) Act. academ. elector. Mogunt. v. I. p. 216.

(6) Ann. med. 1. p. 80.

(7) Medical reports of the effects of arsenic in the

cure of agues. Lend. 1786. 8.

temente fu impiegato nelle ulceri cancerose secondo quelle del Le Febure di s. Idelfonso (1). Verso il fine del passato secolo, parecchi tentarono di rimettere in voga la calce di bismuto, dopo che gli alchimisti del precedente, senz' averne instituita alcuna esperienza, n' erano divenuti i panegiristi soltanto coll'appoggio de' fondamenti teosofici (2). Odier fu il primo a ripeterne l'uso (1785) contro lo spasmo del ventricolo, dove alle volte giovò, e sovente riuscì eziandio inutile (3). Bonnat (4) lo impiegò con profitto ne' dolori cronici del ventricolo, e Carminati (5) nell' isterismo.

Parte il caso, parte i progressi naturali della chimica fecero discoprire e perfezionare in questo intervallo varie preparazioni antimoniali. Nel secolo diciassettesimo generalmente non si conosceva che l'antimonio . il vetro d'antimonio e qualche altro composto. Ade. Mynsicht trovò il tartaro emetico, mediante la combinazione del croco d'antimonio col cremor di tartaro (6). Sì fatta preparazione del tartaro emetico conservossi la più universale, quantunque dietro la proposizione di Bergmann, la farmacopea Svedese preserisse quella della polvere d'Algarot (7). La scoperta del solfo dorato si perde ne' tempi alchimistici; perocchè almeno Basilio Valentino ne ha già

⁽¹⁾ Raccolta pei medici pratici, v. II. p. 170.

⁽²⁾ L. F. Jacobi dissert. de bismutho , p. 20. Erf. 1697.

⁽³⁾ Journ. de medec. tom LXVIII. p. 49. (4) Ivi tom. LXXIV. p. 170.

⁽⁵⁾ Opuscula therapeutica, vol. I. p. 30.

⁽⁶⁾ Thesaur. et armament. medico-chymicum, p. 13. Ham. 1631. 4.

⁽⁷⁾ Pharmacop, suec. p. 111.

lasciato menzione (1). Ai giorni di Hoffmann era generalmenté in uso: eppure questo mio predecessore lo confondeva collo zolfo comune (2). Gio. Aug. Unzer lo raccomandò in piccole dosi contro le periodiche (3); e Andr. Plummer additò una combinazione del solfo dorato colle soluzioni mercuriali , la quale annoverar si dee fra i medicamenti più attivi (4). Jacobi ridusse in forma liquida il solfo dorato (5), e Seb. Fed. Hermbstadt perfezionò questa preparazione (6). In Inghilterra divenne famosa la polvere di Jacobi, la quale sarà stata verisimilmente una combinazione dell' antimonio col fosfato di calce (7). Il chermes minerale rimase lungo tempo un segreto. Secondo le notizie lasciateci da Lemery (8), l'onore del ritrovato appartiene a Rod. Glauber, uno scolare del quale lo comunicò a la Ligerie, chirurgo francese, da cui un certo Simon, farmacista in Parigi e Monaco Certosino, lo imparò nel 1713. Poscia d'ordine del re fu pubblicato il metodo per comporre questa così detta polvere de Certosini.

(1) Opere chimiche, p. 168.

(2) Opp. vol. IV. p. 520.

(3) Magazz. d' Amburgo , vol. VIII. p. 860.

(4) Nuove esper. ed osservaz. d'una società d'Edimb. eol. I. p. 359.

(5) Acta academ. Mogunt. vol. I. p. 231.

(6) Esperienze ed osservaz. fisico-chimiche, vol. II. p. 117.

(7) Don. Monno nella raccolta pei medici pratici, vol. V. pag. 202 vol. XIII. p. 243.

(8) Memoir. de l'academ. des scienc. à Paris, a. 1720. p. 542. — V. Hoffmann Opp. vol. IV. p. 525.

60. Un altro importante medicamento, cioè la calce di zinco, sortì dalle mani di un empirico verso la metà dello scaduto secolo. I così detti fiori di zinco erano stati adoperati esternamente fino dal tempo di Rod. Glauber (1); ma l'uso interno non fu conosciuto se non dopo che Girol. Day. Gaubio ne apprese il metodo da un certo Ludemann, calzolajo ed astrologo di Amsterdam, che vendeva questo rimedio sotto il nome di luna fixata. Gaubio non riscontrò avverati tutti gli elogi che il ciarlatano profondeva sulla virtù antiepilettica della nuova calce metallica, ma lo trovò bensì giovevole per neutralizzare gli acidi delle prime vie, e per sedare le convulsioni (2). Jac. Hart, Black, Beniam. Bell e Goodsir (3) furono i primi a confermare l'efficacia del proposto antispasmodico. Soprattutto riuscirono interessanti le osservazioni di Tomm. Witer sulle virtù medicinali del medesimo nell' asma convulsivo (4), e quelle di Gugl. Hufeland nel vajuolo (5).

Lo stegno, lodato già da Paracelso come antelminico, venne nella stessa epoca raccomandato anche da Carlo Alston (6) e da Borbon (7); anzi quest'ultimo suggerà contro la tenia un amalgama di stagno e mercurio.

⁽¹⁾ Furni novi philosoph. P. I. p. 94. Francof. ad Moen. 1652. 8.

⁽²⁾ Adversar. var. urgumenti, p. 113. 118. Leid. 1771. 4.

⁽³⁾ Edinb. Comment. vol. I. p. 91. 120. 467.

⁽⁴⁾ Dell'asma, e delle virtà medicinali dei siori di zinco, trad. dall'Ingl. Lipsia 1787. 8.

⁽⁵⁾ Osservazioni sul vajuolo, p. 122.

⁽⁶⁾ Medical essays of a soc. of Edinb. v. V. P. I. p. 89.

⁽⁷⁾ Recueil period. d' observ. vol. II. p. 140.

Goulard fu il primo ad inseguare la preparazione e l'uso dell'aceto e succliero di saturno (1), esisgerande tuttavia soverchiamente l'attività dei saturnoi; talche Aikin (2) ed un anonimo (3) s'accinsero ad esporne e a determinarne con chiarezza e precisione le più giuste indicazioni e controindicazioni.

Il cupro ammoniacale cotanto decantato ultimamente. contro l'epilessia, fu proposto per la prima volta nel 1956 da Gio. Feder. Weismann (4). Gio. Heysham, Storer (5), Gins. Walker. (6), e specialmente Greding (7) e Thilenio (8) esaminarono più attentamente questo medicamento. Risultò dalle loro osservazioni, ch'esso non debb'essere considerato come specifico contro l'epilessia, il ballo di s. Vito, e gli accessi isterici, avvegnacchò, usato prudentemente, possa arrecare non pochi vantaggi in diversi casi.

61. Bensì i mercuriali soggiacquero in questo intervallo a più numerosi ed importanti perfezionamenti. Durante la maggior parte del secolo dicissettesimo non usarono che alcune preparazioni assai riprovevoli del mercurio, cioè il turbit minerale, il precipitato bianco o ros-

⁽¹⁾ Traité sur les effets des preparations de plomb. Pezenas 1760. 8.

⁽²⁾ Osservazioni sull'uso esterno dei saturnini Altenb, 1776.

⁽³⁾ Dell' uso esterno dello zucchero di saturno. Halla 1783. 8.

⁽⁴⁾ Nov. act. nat. cur. vol. I. p. 276.

⁽⁵⁾ Edinb. Comment. vol. VII. p. 31. 91.

⁽⁶⁾ Ivi vol. X. fac. 2. p. 33.

⁽⁷⁾ Opuscoli misti, vol. I. p. 103.

⁽⁸⁾ Osservazioni mediche e chirurgiche, p. 130.

so e gli unguenti esternamente, e l'etiope minerale internamente. Cemmunemente credevasi di non poter guarire la sifilde senza la salivazione; opinione addotta infra gli altri anche da Tommaso Sydenham (1). La mancanza di opportune preparazioni e di cognizioni sode per l'uso dei mercutio, eccitò in parecchi medici una speciale diffideza verso questo metallo, la quale li costrinse a ricorreta piuttosto a delle decozioni di guajaco, di salaspariglia, e di altri simili vegetabili (2). Lo stesso Feder. Hofmann (3), non. che, il sommo Boerlnave (4), quantunque preferissero il mercurio dglee, ritenevano tuttavia per indispensabile il ptialismo; anzi il secondo vi aggiunse una dieta severissima debilitante ed estenuante.

Il primo, che abbia rigettato il cinabro, fu G. L. Hannemann (5), ed il primo che faccia menzione del surblimato, quantunque non lo abbia usato senza mescolarvi qualche altro medicamento, fu Rico. Wisemann (6). In seguito Dan. Turner (1717) lo dava sciolto nello spirito di vino (7), ed in tal modo si continuò allora nel Palatinato ad impiegarlo coll' appoggio dell' autorità di Brunner (8). Gli elogi di Ger. van Swieten procurarono al sur

(1) Opp. p. 211

(2) BLEGNY zodiac. med. gall. a. I. p. 108.

(3) Opp. tom. III. p. 419.

(4) Tract. de lue venerea. Lugd. 1751. 8. (5) Ephem. nat. cur. dec. II. a. 6. p. 566.

(6) Eight chirurgic. treatises, v. II. p. 306. Lond. 1734. 8.

(7) Syphilis, a practical treatise on the lues venerea, p. 150. Loud. 1717. 8.

(8) Medicus raccolta di osservazioni , P. II. p. 70.

blimato, verso la metà del passato secolo; una voga straordinaria (1). Per di lui ordine tutti i medici e chirurghi dell' armata Austriaca doveano curare le malattie veneree con questo medicamento. Brambilla però ne assicura , ch' essi conoscendo gli effetti incerti e sovente pericolosi del sublimato, mentre lo lodavano, vi sostituivano segretamente il mercurio dolce (2). Sembra che Mass. Locher, I quale asserisce d'aver guarito radicalmente col sublimato 488 sifilitici nello spazio di ott' anni (3), abbia inventato tutte le sue storie (4); perocchè Ant. Stoerk sostiene a ragione, che dall'uso frequente dell'accennata soluzione ne seguirono generali estenuazioni (5). Tuttavia dietro le insinuazioni di Pringle essa venne introdotta anche nelle armate Inglesi; ne mancarono testimonianze favorevoli sull'utilità della medesima (6). Crist. Luigi Hoffmann osò prescrivere il sublimato anche in forma 'di pillole', e ciò non ostante anche questo pessimo metodo ebbe i suoi difensori (7). Finalmente l'esperienza determinò il merito di sì decantata preparazione; e le osservazioni di Gio.

Comment. in Boerhal. apho. vol. V. p. 570.
 Del flemmone e del suo pronostico, v. II. p. 325.
 Vienna 1775. 8.

⁽³⁾ Observat. pract. circa luem veneream. Vienna. 1762. 8.

⁽⁴⁾ BRAMBILLA l. c.

⁽⁵⁾ Anna. med. II. p. 215.

⁽⁶⁾ Medical observat. and inquiries, vol. I. p. 465-408.

⁽⁷⁾Dello scorouto, della luc venerca ec., p. 280. Munster 1782. 8. - FRANC. JACOBI nella Raccolta pei medici pratici, vol. I. p. 136,

Gardiner (1), di Tomm. Gataker (2), di Giorgio Henermann (3) e di And. Duncan (4) ne fecero conocere compiutamente alla repubblica medica Pincertezza e la nocevole qualità.

62. Nic. Pechlin' (5) e Fr. Chicoyneau (6) furono i primi che riconobbero il detrinento della sglivazione nel acura' delle malattie venerce ; e Jac. Grainger. (5) non che Rosenstein la giudicarono inutile (8). Ond'evitarla Pietro Desalt male, a proposito s'immagino di proporre; derivativi (9) prescrivendo i catartici contemporanemente alle frizioni dell'unguento mercuriale. Sembro più confacente all'uopo il trattamento di Arr. Haguenot, che cercò di agire sulla cute e di rianimare le forze opli, uo interpolato dei bagni, colle sospensioni periodiche, della

- (i) Muove esper. ed osservaz. della società d'Edimb. vol. III. p. 360.
 - (2) Essay son medical subjects. Lunc. 1764. 8.
 (3) Osserv. e ricerche mediche, v. II. p. 30.
- (4) Degli effetti e dell'uso del mercurio nelle malattie venere. Lipsia 1773. 8.
 - (5) Observ. lib. I. p. 194.
- (9) The practice of salivating, shewn to be of no use or efficacy in the cure of the venereal disease translated by Willougher Lond. 1723. 4.
 - (7) HALLER dissert. pract. vol. I. p. 511.
 - (8) Under om barn-sjukd. p. 502.
- (9) Dissertat. sur les malad. vénèr. Bordeaux 1733.
- (10) Mémoire contenent une nouvelle methode de traiter la verole. Montpell. 1734, 8.

frizioni e colla dieta corroborante; metodo adottato e difeso da Tommaso Goulard (1).

Affine di guarentirsi dalla salivazione e di ottenere una compiuta guarigione dalle malattie veneree, furono preferiti da lungo tempo i mercuriali leggiermente acidificati, ovvero ossigenati. Le pillole di Ag. Belloste cotanto celebri nel principio del secolo decimottavo, erano composte di mercurio alquanto ossidato mediante la triturazione del medesimo collo zucchero e colla jalappa (2). Anche le dragee di Gio. Keyser riducevansi ad un leggiero ossido di mercurio triturate con draganti, zucchero, e fior di farina (3). Quindi Girol. Ludolf additò la preparazione d' un mercurio alcalino (4), ed Astruc cercò di combinarlo colla polvere degli occhi di cancro (5). In seguito venne generalmente applandito il mercurio gommoso di Plenk (6), e raccomandato anche da Theden (7) e da Clark (8).Per qualche tempo'si preferirono a tutte le altre preparazioni gli ossidi imperfetti, che si formano dalla precipitazione

⁽¹⁾ Remarques et observ. pratiques sur les malad. vemèrienn. Pezenas 1760. 12.

⁽²⁾ GIRTANNER delle malattie veneree, vol. II. p. 367.

⁽³⁾ HAUTESIERE recueil d'observ. vol. II. p. 511.

⁽⁴⁾ Vittoria della chimica, p. 77.

⁽⁵⁾ De morb. vener. p. 455.(6) Methodus nova, tuta et facilis argentum vivum

aegris venerea labe infectis exhibendi. Vindob. 1766. 8.
(7) Istruzione pei sotto-chirurghi dell'armata, P. II.

⁽⁷⁾ Istruzione pei sotto-chirurghi dell'armața, P. II. p. 100.

⁽⁸⁾ Osservazioni sulle malattie derivanti dai vinggj lunghi, p. 226.

dei muriati o dei nitrati di mercurio, solubile d'Hahnemann su sostituito in questi ultimi tempi al così detto cinereo di Saunder (1).

63. Fra i minerali ferruginei Paracelso raccomandò anche la calamita, se non per uso intereo, almeno per l'esterno (2). Alcuni seguaci di Paracelso, la usarono e nell'una e nell'altra maniera; ma Gugl. Gilbert ha posto già in dabbio le guarigioni operate dalla calamita (3). Nulladimeno verso la metà del secolo diciassettesimo e Tallor (4) e Gio. Jac. Wecker (5) e Pietro Borelli (6) ne riferirono alcune, specialmente di cefalce e di odontalgie.

Nel secolo susseguente l'esperienze sui portentosi fenomeni dell' elettricità rinnovarono quelle della calamita. Fr. Gugl. Klurich fisico in Gottinga, fu incontrestabilmente il primo ad esaminare attentamente l'attività di quest'ultima, massime nei dolori de' denti; e di-fatti in cento e trentasei riscontrè assai efficace l'applicazione cella calamita artificiale. Hollmann e Kaestner confermarono questi sperimenti, ed osservarono che la calamita nel luogo del contatto produceva prurito, dolore ed aumento di traspirazione (7). Quindi Crist. Weber medico in Welsrode, tentò di applicarla in un ammalato che ad'

⁽¹⁾ Istruzioni pei chirurghi sulle malattie veneree. Lipsia 1789. 8.

⁽²⁾ Storia della medicina, T. III.

⁽³⁾ De magnete lib. I. c. 14. pag. 34, Sedin, 1628. 4.

⁽⁴⁾ BIRCH history of the roy. soc. vol. IV. p. 37. (5) De secretis lib. II. p. 107. Basil. 1667. 4.

⁽⁶⁾ Histor et observ. physico-med. cent. VI. p. 35.

⁽⁷⁾ Notizie di Gottinga, a 1765 714. 777.

ogni piccola indisposizione vedeva tutti gli oggetti duplicati o triplicati (1); e trovò che avvicinando il polo settentrionale all'occhio, si manifesta un senso di gelo e di dolore acutissimo, una copiesa lagrimazione e maggior chiarezza subitanea della vista. La calamita operò grandi effetti anche nelle ottalmie, e cagionò pure negli orecchi uno strepito violento. Gio. Aug. Fil. Gesner arrivò a vincere collo stesso mezzo alcuni spasimi in una mano (2); ed il celebre De la Condamine rilevò, che il polo settentrionale della calamita diminuisce nelle ottalmie i dolori, mentre l'opposto gli accresce; che essa non giova nelle odontalgie reumatiche, ma bensì in quelle prodotte da carie dei denti, ove vengano applicati tutti e due i poli (3).

Onde spiegare sì sorprendenti fenomeni, si ebbe ricorso a diversi espedienti meccanici. Weber e Glaubrecht dimostrarono, che non bastavano a tal uopo nè la fregazione, nè la pressione della calamita, nè il freddo della medesima (4); e Gio. Dan. Reichel fu perciò giustamente d'avviso di dover prendere in considerazione gli effluvii magnetici (5).

64. L'uso della calamita e la teoria del magnetismo presero un' altra direzione allorquando Antonio Mesmer . medico Viennese, reso dall' astronomo Hell attento alle

⁽¹⁾ Dell'azione della calamita in una singolare malattia d'occhi. Annover 1767. 8.

⁽²⁾ Raccolta di osservazioni mediche, p. I. p. 220. Wordl. 1769. 8.

⁽³⁾ Journal de médecine , 1. XXVII. p. 265.

⁽⁴⁾ Analecta de odontalgia. Argent. 1766. 4.

⁽⁵⁾ Dissert. de magnetismo in corpore humano. Lips. 1772. 4.

cure magnetiche; comiuniò praticarle con un metodo, alquanto perfezionato nel mese di novembre del 1774. Le particolari sensazioni prodotte dall' applicazione della calamita e gli effetti salutari della medesima egli li ripetè fin d'allora da un magnetismo originario del corpo umano, che si può mettere in attività, senza il concorso della calamita artificiale (1). Il gran romore, che imenarono le cure di Mesmer, diede luogo a diverse indagini, fra le quali quelle di Gio. Crist. Urare riuscirono favorevoli al nuovo sistema, e quelle di Gio. A. Heinsio vi si opposero interamente (2). Anche Giosch. Fed. Bolten attesta d'aver sperimentato totalmente inutile la calamita artificiale nelle malattie nervose e reumaticlie (3).

Ebbero un esto più felice le ricerche di Andry e di Thouret (4) sull'uso delle calamita nella medicina. Egitmo hauno dimostrato primieramente, dhe gli effetti della medesima non dipendone nè da pressione; nè da freddo; nè da fregagione; che differiscono da quelli, che la calamita può cagionare come sostanza ferruginea sul corpo animale; e che non derivano unicamente dalla sua attra-

⁽¹⁾ Lettera ad un medico straniero sopra le cure magnetiche. Vienna 1775. 8.

⁽²⁾ GLO. CRIST. UNERR, descritione d'alcuni esperimenti instituiti colla calamita artificiale. Amburgo 1795 8: - GLU. A. HEINSIO, supplementi alle esperienze instisuite colla calamita artificiale in diverse malattie. Espsia 1776. 8.

⁽³⁾ Notisie di un esperimento fatto collà calamita artificiale. Amb. 1795. 4.

⁽⁴⁾ Osservazione e ricerche sull'uso della calamita nella medicina, trad. dal Franc. Lipsia 1785, 8.

zione verso il ferro, quantunque sembrino avere la stessa sorgente. I due lodati serittori attribuiscono alla calamita una facoltà stimolante e sedativa (1); e sostengono la vantaggiosa sua influenza sulle malattie nervose, in ispezialtà sull'epilessia (2), sull'asma spasmodico, e sulle convulsioni del ventricolo (3); come Pojol l'applico con profitto anche nel dolore della faccia (dolor faccia; tic doulourcux) (4) e Stark nella sciatica (5).

Il magnetismo anima'e appartiene ad un altro argomento, di cui in appresso si tratterà (6).

c) Applicazione dell'elettricità a pres la che

65. Hauksbeo s'occupò verso il principio del secolo decimottavo in estaninare più attentamente i fenomeni elettrici, soggetto 'giù da qualche tempo degli studj e delle esporienze dei fisici. Tuttavia non arrivò a concepire una chiara idea della diversità tra i corpi elettrici e non-elettrici, di cui appunto Desaguliers determinò le leggi, e chiamò primo d'ognaltro conduttori i secondi (7). Del 1729. Stefano Grey instituì i primi tentativi elettrici sul corpo ani-

- (1) Ivi p. 259.
- (2) Ivi p. 192.
- (3) Ivi p. 142. 144.
- (4) Memoria sul trismo doloroso, trad. dal Franc.
 - (5) Norinb. 1788. 8.
- (6) Kumpel, dissert. ce magnetismo et minerali et animali, p. 21 Jen. 1788. 4.
 - (7) PRIESTLEY, storia dell'elettricità, trad. di Kru-NITZ, p. 42. Berl. 1772. 4.

male, sospendendo sin aria un fanciullo col mezzo di funi di crini (1). Reca però maraviglia la lentezza, onde progredirono queste scoperte; perchè solo in capo ad ott'anni, cioè del 1737. Du Faye potè estrarre delle scintille dal corpo umano, e su il primo a distinguere l'elettricità resinosa dalla vitra (2).

Dacchè la scoperta della boccia di Leyden destò l'attenzione de fisici, si moltiplicarione eziandio l'esperienze dettriche sul corpo umano. Dapprincipio esse ebbero origine dalla curiosità; ma il terrore concepito da Musschenbrock nella prima scossa fu talmente grande, ch'egli e parecchi altri non desideranon di sentirla un'altra volta (3). Contemporaneamente al ritrovato della boccia di Leyden (1745), il P. Gordon Benedettino, professore in Ærtur, sottutu diverse interessanti esperienze sugli animali, ed osservò negli elettrizzati un acceleramento del polso (4); effetto confermato dalla maggior parte degli dettrologi, in ispezialta poi da Derman e da Cuthbertson (5). Soltanto Ant. Paets van Troostwyk e C. R. T. Krayenhoff sostenaero, che l'elettricità non opera che sul-

66. Il primo medico, che abbia tentata l'elettricità

⁽¹⁾ Ivi p. 23.

⁽²⁾ Ivi p. 30.

⁽³⁾ Ivi p. 35.

⁽⁴⁾ GRALATH, esper. ed osserv. della soc. fisica di Danzica, vol. II. p. 357.

⁽⁵⁾ Deiman degli effetti salutari dell' elettricità in diverse malattie, Pa L trad. da Kunn, p. 11, 12. Lipsia 1993. 8. Caribara e de Caribara

⁽⁶⁾ Kunn , aggiunte a Detman , p. 55.

qual nuovo ed importante stimolante nelle malattie di debolezza, fu Crist. Amed. Kratzenstein, professore in Copenhagen. Egli trovò, che le scintille estratte da dita paralitiche vi arrecavano un grandissimo vantaggio; e che la scossa elettrica produceva un acceleramento del polso ed un aumento di traspirazione (1); fenomeni spiegati da Nollet con attribuire all'elettricità un'influenza speciale sull'ascesa dei fluidi ne' vasellini capiliari , e con risguardare il corpo animale come un complesso di questi ultimi (2). Il fisico francese fu inoltre il primo ad osservare. che l' elettricità promuove l' incremento de' vegetabili . e che il corpo animale, mercè la traspirazione accresciuta, diventa più leggiero (3). La trovò poi assai utile contro la paralisi, ma non in tutte le malattie, ed inculcò grande circospezione nell'uso delle boccie di Leyden (4). Il prof. Jallebert di Montpellier operò la cura radicale d'una paralisi in un uomo, che n' era stato attaccato da oltre 15. anni (5).

Eppure enche in questo argomento gli errori oscuraxono per qualche tempo la verità. Nel 1549; alcumi Italiani s'immaginarono che le sostauze odorifere diffondessero mediante il vetro elettristato i loro effluvi ad una con-

⁽¹⁾ Dell'uso dell'elettricità nella medicina. Halla 1745. 8.

⁽²⁾ Saggio d'un tratt. sull'elettricità dei corpi, dal franc. Erf. 1749. 8.

⁽³⁾ Mêm. de l'academ. des siene, a Paris, a. 1748., p. 194.

⁽⁴⁾ Ivi a. 1746. p. 1. a. 2749. p. 28.

⁽⁵⁾ JALLABERT, esperimenta electrica usibus medicis applicata pag. 117. Basil. 1750. 8.

siderevole distanza, e che perciò si potesse rendere attivi alcuni medicamenti senza introdurli nel corpo, allorquando li rinchiudessero in bottiglie elettrizzate. Il primo a concepire sì strana idea fu un certo Pivati , avvocato Veneziano, che diede a questo metodo la denominazione d'intonacatura , servendosi specialmente del balsamo peruviano per curare delle paralisi e delle affezioni artritiche col mezzo de' tubi vitrei elettrizzati e ripieni dello atesso balsamo (1). Gius, Veratti professore in Bologna, Gio. Battista Biauchi professore in Torino, e Gio. Arrigo Vinkler professore in Lipsia ripeterono tali esperienze e confermarono la giustezza delle medesime. Ma allorchè quest' ultimo, dietro invito della società di Londra ; le spedì nel 1851. alcuni tubi di vetro., Gugl. Vatson insieme con parecchi altri membri non riscontrò in verun modo avverati codesti esperimenti (2). Nè mancò al Nollet, viaggiando in Italia, l'opportunità di convincersi della inesattezza delle cure di Pivati, e di riconoscere, che i tubi vitrei elettrizzati posseggono un'attività loro propria, che nulla giova il riempirli di medicamenti, e che nemmeno l'odore si diffonde per mezzo del vetro (3). Sì fatte esperienze vennero confutate col maggior fondamento da Gio. Fortunato Bianchini, il quale fece vedere, essere stata pura illusione quanto si è vantato sull'odore e virtù medicinali degli accennati tubi di vetro (4). Final-

⁽¹⁾ Recueil sur l'électricité médicale, to. I. p. 1 44. Paris 1752. 8.

⁽²⁾ PRIESTLEY 1. c. p. 100.

⁽³⁾ Mem. de l'academ. des. scienc. à Paris, a. 1749. p. 444.

⁽⁴⁾ Recueil sur l'electr, mèdic. to. II. p. 1.

mente lo stesso Benjam. Franklin, e Gio. Cr. Vilke concorsero nel medesimo sentimento (1).

67. Tuttavolta questi errori contribuirono a far viemmeglio esaminare l'elettricità come rimedio. Veratti malgrado l'infelice riuscita della proposta intonacatura i ripetè nuovi sperimenti sull' elettricità, e comprovò la facoltà irritante e solvente della medesima nelle paralisi, ne' reumatismi ed in altre malattie di simil fatta (2), Franc. Boissier de Sauvages, Gio. Amed. Schaeffer, Gio. Flaver, Gio. Lindhult, Lor. Spengler e Sam. Teod. Quellmalz meritano di essere annoverati fra i primi e più distinti difensori dell' elettricità medica. 'Sauvages la impiegò non solo nelle paralisi, ma eziandio ne' tumori freddi ed in altre conseguenze delle febbri intermittenti (3). Schaeffer ne approfittò per le adontalgie, per le artritidi ; per le paralisi, e notò che sovente riesce più giovevole negl'individui giovani di quello che ne' vecchi o nei cachettici (4). Gio. Floves medico di Dorcester la trovò utile nell'amarrosi (5), e Gio. Lindhult ha il merito insieme con Linneo e Strommer d'averla introdotta in Isvezia. I due ultimi la sperimentarono efficace nelle contratture (6) ; ed il

(2) Observations physico-med. sur l'eletricité. Paris 1750. 12.

(3) Nosol. method. vol. II. pag. 469. - Acta societ. Upsal. pag. 1. Stokolm. 1751. 4. - HALLER dissert. pract. vol. 1. p. 16-47.

(4) La virtù e gli effetti dell'elettricità nel corpo animale. Ratisb. 1752. 8. La medicina elettrica, p. 78. Ratisb. 1766. 4.

(5) DEIMAN I. c. p. 53.

(6) Vetensk, acad. Handl. f. a 1753. , p. 193.

⁽¹⁾ Benjam, Franklin lettere interno all'elettricità, p. 111. 270: Lipsia 1758: 8:

primo la tentò con felicissimo successo nell' epilessia, nelle intermittenti, rdell' artiride, nelle odoutalgie, e nell'amarrosi (1). Lor. Spenyler confermo simili vantaggi in tutte le specie di paralisi, nell' epilessia, nelle cefalee, ne' reumatismi, nell'artiride, nella gotta serena, ed anco nell' amenorica (2). Sain. Teod. Quellmalz verificò principalmente quielli riscontrati nell'amarrosi (3).

Cadwallader Evans raccomando l'elettricità contro le afficioni isteriche e le convulsioni croniche (4); Ant. de Haen nel ballo di s. Vito, melle paralisi imperfette accompagnate da tremore, e nell'umarrosi incipiente (5); Gugl. Watson nel trismo (6); Fachsel nelle consequenze de pedignori (7); Wuslay nelle intermittenti; nell'epilessia le ne tumori freddi (8); Gost. Fed. Hjortherg nelle odontalgie; ne remantsimi ed in altre malattie, perfino contro la tenia (6).

68. A fronte di tanti elogi, coi quali parcechi scrittori decantavano l'elettricità come eroico "rimedio", non mancarono altri di rifferire dei casi, dov'essa non manifestò alcuna attività, forse' anche perchè non crano state stabilite le indicazioni, che dovesero richiederla, o perchè non si comprendevano i diversi metodi di applicarla.

(1) loi p. 305. f a. 1753. p. 137. 143.

(2) Lettere che contengono alcune esperienze sugli effetti elettrici nelle malattie, vol. 1. 2. Copenhagen 1754. 8.

(3) HALLER dissert. pract. vol. I. p. 54.

(4) Medical observations and inquiries, vol. I. p. 83. (5) Rat. med. P. I. p. 52. 229, 234.

(6) Philosoph. transact. vol. LIII, p. 10

(7) Acta academ. Mogunt. vol. II. p. 465.

(8) Desideratum, or electricity mode plain and use full. Lond. 1760. 8.

(9) Vetensk. acad. Handl. f. a. 1765. p. 163. 266

Benjam. Eranklin accusa principalmente l'uso delle sciutille ossia delle boccie di Leyden, ogni qualvolta l'elettrioità o non ha prodotto effetti salutari, ovvero ha cagionato delle conseguenze pregiudicative (1). Haller si dittinne fra i primi antagonisti dell'elettricih medica, come si arguisce dalla sua critica dell'opera di Kratzenstein (2), e dal racconto di alcune cure elettriche malavventurate (3). Parimenti Ilast, medico nello spedale di Shrewabury, non riscontrò alcun profitto dall'applicazione dell'elettricità nelle paralisi (4); ed asseriscono lo stesso Pietro Zetzell (5) Andr. Bern, Hirchvogl (6) e Gugl. Rowley tiguardo all'amarrosi (7).

Ma il primo perfezionamento del metodo di elettriza, re noi lo dobbiamo incontrastabilmente ad un certo Amed. Fed. Roessler, il quale distinse esattamente i casi suscettibili di a fatto rimedio, ed additò molte cautele da praticarsi nel gradativo rioforco dell' elettricità. Egli cominciò dal bano elettrico, e dove occorreva elettrizzare un membro paralizzato, limitava ad esso soltauto la sossa elettrica (8). Sauvages pure indicò i danni ridoudanti dall'uso incauto di quest'ultima, e quindi raccomandò

⁽¹⁾ LESHES estr. dalle Transaz. filosof. vol. V.

⁽²⁾ HALLER diario medico, vol. I. p. 28.

⁽³⁾ Opera minora, vol. III. p. 368.

⁽⁴⁾ Philosoph, transact. vol. XLVIII. P. II. p. 786.
(5) Haller dissert pract. vol. I. p. 59.

⁽⁶⁾ Diag med pract p 128

⁽⁶⁾ Diar. med. pract. p. 178.

⁽⁷⁾ Treatise on the principal diseases of the eye, p. 149.

⁽⁸⁾ Notizie letterarie di Gottinga , a. 1768. fasc. 123.

piuttosto le semplici scintille. Gio. Fed. Hartmann d' Annover determino esattamente le differenze dei diversi metodi di elettrizzare, ed incu'cò prima d'ognaltro di unire l'elettrometro colla boccia di Leyden, anche quando si tentano delle scosse, acciocchè si possa riconoscere il grado dell' intensità (1). Dopo sì fatti avanzamenti dell'elettricità Fed. Mein. Wilhelm (2), Nic. Lovet (3), Mauduyt de la Varenne (4), Masars de Cazeles (5) e Gio. de Birch (6) la impiegarono in diverse malattie, e specialmente nell'amarrosi, nella sospensione de'menstrui, nei dolori topici e nelle affezioni artritiche. Carlo Darwin sperimentò con profitto le scosse elettriche nell'itterizia (7), Geller nell' anchilosi (8), Hufeland nell' assissia (9) Wathen nella cateratta incipiente (10), e Paets van Troostwyk e

⁽¹⁾ De ll'elettricità come rimedio di alcune malattie del corpo umano. Annoo 1770. 8.

⁽²⁾ Observ. electrico-medicar. decur. IV. Wirceb. 1774. 8

⁽³⁾ Electrical philosopher , Worcester 1775. 8.

⁽⁴⁾ Estr. dai migliori seritti francesi v. II. p. 297-307. vol. IV. p. 1-208 - Kunn storia dell'elettricità , P. 11. p. 74-392.

⁽⁵⁾ Estratto ; l. c. vol. II. p. 1-52.

⁽⁶⁾ Raccolta pei medici pratici , v. V. 575.

⁽⁷⁾ HEBENSTREIT saggj medico-chirurgici, vol. I. p. 88.

⁽⁸⁾ BALDINGER nuovo magazino , vol. VII. p. 347. (9) Kunn storia dell' elettricità , vol. II. p. 328.

⁽¹⁰⁾ Diss. on the theory and cure of cataract. Lond.

^{1785. 8.}

e Krayenhoff nell' apoplessia astenica (1). L'opera di quest'ultimo, secondo il parere di Kuhn (2), è una delle più commendevoli, perchò determina le specie delle malattie, dove fu proposta l'elettricità come rimedio. Oltre gli serittori fin quì citati, si rendettero a' nostri giorni benemeriti dell' elettricità medica Bertholon de s. Lazare(3), Tib. Cavallo (4), Gio. Lor. Bockmann (5), Carlo Amedi, Kuhn (6), France. Lowndes (7), Er. Gugl. van Barreveld (8), Gio. R. Deiman (9), e Gio. Giorgio Bocckh (10).

(1) De l'application de l'elettricità à la physique et a la medecine. Amsl. 1788. 4.

(2) Aggiunte a Deiman, p. 38.

(3) Applicazione ed attività dell'elettricità per la conservazione e pel ristabilimento della solute del corpo umano, vol. 1. 2. dal Franc. trad. di Cr. Kuhn. Weissenfels 1768. 8

(4) Saggio di una teoria per l'applicazione dell'elettricità medica, trad. dall'Ingl. Lipsia 1782. 8.

(5) Opuscoli fisici, p. 175. Carlsruhe 1789. 8.

(6) Storia dell'elettricità fisica e medica, vol. 1. 2. Lipsia 1783. 85. 8. Aggiunte a Deima degli effetti salutari dell'elettricità. Lipsia 1793. 8. Nuove scoperte sull'elettricità fisica e medica, Lipsia 1796. 8.

(7) Osservazioni sull'elettricità medica, trad. dall'

Ingl. Berl. 1:92. 8.

(8) Elettricità medica, trad. dall Olard. Lipsia 1787. 8. (9) Degli effetti salutari dell'elettricità in diverse

malattie, trad. dall' Oland. v. 1. 2. Lipsia 1793. 8.

(10) Saggj speriment. per l'applicatione dell' elettri-

cità sul corpo umano. Erlang. 1791. 8.

Osservazioni sopra malattie.

69. L'ascendente di Bacone (1) e di Leibnizio (2) ed ancor più l'evidenza dei bisogni dell'arte costrinse i medici in questi due ultimi secoli a studiare con gran fervore ed incessante attenzione la storia naturale delle malattie in tutti i climi e paesi; ed osservare specialmente le mutazioni epidemiche, a descrivere con diligenza e criterio le malattie nuove, ad estendere la conoscenza delle già note coi travagli dell'anatomia patologica, ad esaminare più accuratamente i segni degli stati interni occulti, a determinare i caratteri delle affezioni simili , e ad instituire degli esperimenti a compimento di sistemi nosologici, onde ridurre in ordine scientifico le innumerevoli forme di malattie. Di fatti sono totalmente straordinari i progressi della parte storica e dogmatica della patologia in questo periodo di tempo, che per comprenderne i punti più importanti , d' uopo è dividere in altrettanti articoli i soggetti principali delle nostre investigazioni.

a) Epidemie e malattie nuove.

70. Il ristabilimento della medicina Ippocratica ridestò primieramente l'attentione sull'andamento dell'epidemie; e in tutto il corso di questo intervallo i seguaci del metodo Ippocratico semplice si distinsero colla somma loro venerazione alla potente influenza della così detta costituzio-

⁽¹⁾ V. più sopra p. 132.

⁽²⁾ Opp. tom. II. P. II. p. 111.

ne doninante e del carattere epidemico. Convien però confessare, che in tal guisa si agevolò non poco la cognizione ed il trattamento delle diverse forme di malattie, quantunque i medici non abbiano mal desistito fino a'nostri giorni dal commettere i seguenti errori.

- Essi estesero soverchiamente l'idea della costituzione dominante, riscontrandola sempre la stessa, ed assoggettondo tutte le malattie al predominio d'un certo carattere epidemico.
- 2- Calcolavano oltre la possibilità i rapportidello stato barometrico, e termometrico dell'atmosfera colle correnti epidemie, e pretendevano sovente di quindi presagirle o spiegarle.
- 3. Mostravansi troppo ligi alle osservazioni normali del medici Greci, e d'altri già forniti di celebrità eriputazione, e considerarono le conseguenze delle epidemie osservate dagl' Ippocratici nelle isole dell' Arcipelago, nella Macedenia e nella Tracia, niente diverse da quelle della Normandia, di Londra, Vienna e Padova.
- 4. S'immersero in una sorgente d'errori, ove dichiararono permanenti alcune epidemie, come destinate a dominare per un dato intervallo in tntte le stagioni, e a modificare secondo la lor natura tutte le malattie.
- 5. Del pari insussistente ed erronea si è la classificazione dell'epidemie, perchò fondata coi fenomeni predominanti, senza riconoscere la fallacia dei medesimi, ed appoggiarsi piuttosto al carattere dinamico.
- 71. Fra i più antichi e celebri osservatori di epidemie io annovero primieramente Gugl. Ballohio (Baillou) (1). La

⁽¹⁾ Fu decano della facoltà medica di Parigi, n. 1538. m. 1616. V. la di lui vita nell'ediz di TRONGRIN. BALLONII op. omnia, tom. 1. 4. Geney. 1762. 4.

storia dell'epidemie dal 1570 fino al 1578., sulla quale è principalmente fondata la di lui fama, non merita certamente tutti gli encomi della posterità imparziale. La descrizione del carattere dominante delle malattie o viene trascurata o trattata senza la conveniente esattezza, e dappertutto si adotta la necessità delle missioni di sangue, quando si manifesta il più piccolo sospetto d'infiammazione. Non si può a meno di leggere con rammarico e spavento la morte di un ammalato da peripneumonia astenica, seguita appunto dopo il salasso. E tuttavia l'autore lagnasi con se stesso di non averlo eseguito ancora più di frequente (1): e perciò lo prescrive parimenti ne' dolori colici, perchè teme l'infiammazione (2). Ma riferendo la storia di un ammalato rimasto evidentemente vittima del salasso in una infiammazione astenica . confessa . ch' esso può talvolta riuscire nocivo (3). Poco importa. che Ballonio risguardi costantemente per cagion prossima delle febbri la bile e la pituita; e conseguentemente inculchi le più abbondanti evacuazioni (4). Perfino nel reumatismo, di cui ci ha Jasciato un trattato di nessun profitto, raccomanda replicate missioni di sangue (5). Stabilisce nel mesenterio il fondamento d'innumerevoli febbri lente, e determina le infiammazioni di questo viscere (6). Per altro Ballonio si rendette benemerito colla sua opera intitolata, Paradigmata et historiae morborum, la quale

⁽¹⁾ Opp. tom. 1. p. 16. 63.

⁽²⁾ Ivi p. 17.

⁽³⁾ Ivi tom. II. p. 500

⁽⁴⁾ Ivi tom. I. p. 84.

⁽⁵⁾ Ivi tom. IV. p. 314.

⁽⁶⁾ Ivi p. 292. tom. II. p. 224. 225.

contiene alcune brevi notizie della sua pratica e specialmente delle sezioni interessanti di cadaveri (1).

Dopo di lui si distinse Carlo Lepois (Piso), figlio di Nicolò (2), medico anch' esso del duca di Lorena e professore a Pont-a-Monsson (3). Il trattato delle malattie dipendenti dalla colluvie sierosa (4) ha già goduto non poca riputazione; ma la critica illuminata de' nostri giorni vi scorge per entro un complesso d'ipotesi appoggiate, ad osservazioni false ed alla più incongruente teoria umorale. La sovrabbondanza del siero occupa secondo lui principalmente la milza. Ora egli riporta infinite osservazioni di malattie, nelle quali si manifestarono delle raccolte ed evacuazioni sierose, o dei tumori acquosi, d'onde risulta una serie di varietà patologiche. È però da dolersi, che i nosologi del passato secolo , segnatamente un Sauvages ed un Daniels, gli abbiano tennto dietro fedelmente, e considerato ciascuna delle sue osservazioni come una spezie singolare di malattia. Tuttavia non puossi negare, che non se ne riscontrino molte d'interessanti, p. e. dell'idrocefalo, dell'idrope del pericardio (5), di calcoli (6) e d'ipatidi polmonari (7) e di mole idatidiformi (8).

- (1) Opp. tom. III. p. 521-549.
- (2) Storia della medic. Sez. VIII. S. 116
- (3) N. a Nancy 1593. m. 1633.
- (4) Selectiorum observationum et consiliorum de praesereitis hactenus morbis adfectibusque praeter naturam ab aqua seu serosa colluvie ortis, liber singularis. Ponte ad monticulum 1618. 4.
 - (5) Ivi p. 164.
 - (6) p. 195.
 - (7) p. 215.
 - (8) p. 332.

Soprattutto però ci dee recar meraviglia il suo trattamento d'una dissenteria epidemica, poichò ordina dappiniopio abbondanti missioni di sangue, in seguito il rabarbaro, e, quando s'aumentano oltre modo i dolori, l'oppio (1).

72. Attorno a quest' epoca (1610. - 1620) fut per la prima volta osservata la cinanche cangrenosa, nalattia, che ha posto i medici in non leggiero imbarazzo. A dir vero e Mead (a) e Van-Swieten (3) hanno proteso di riscontrarla in Areteo (4), ed Aezio (5); ma i sintomi enunciati da questi scrittori antichi sembrano anzichè bastanti ad alludere alla proposta affezione, indicare delle fungosità ulcerose e cangrenose. Certo è però, che Francesco Nola pubblicò nel 1016 una esatta descrizione della sovraccenanta malattia allora appunto epidemica in Napoli (6). Contem- poraneamente essa reguò nella Castiglia, ond'è che Gio. de Villarcal (7), Fran. Perez Casales (8) e Gio. Alfonso

⁽¹⁾ Discours de la nature, causes et remedes des maladies populaires accompagnées de dysenterie. Pont-amousson 1623. 7.

⁽²⁾ Monita et praecepta medica p. 52.
(3) Comment. in Bobrass. S. 52.

⁽⁴⁾ Causs. acut. lib. 1. c. 9. p. 40. Egli la chiama ulcera dell' Egitto e della Siria.

⁽⁵⁾ Tetrab. II. serm. 4. e. 46. col. 397.

⁽⁶⁾ De epidemica phlegmone anginosa, grassante Neapoli, Venet. 1610. 4.

⁽⁷⁾ De signis, caussis et curatione morbi suffocantis, lib. II. Complut. 1611. 4.

⁽⁸⁾ De morbo Garotillo appellato. Madrit. 1611. 4.

de Fontecha (1) la descrissero come una malattia nuova terribile , dandole il nome spagnuolo di garotillo . senso di stringimento e soffocazione, con cui si nifesta. In capo ad ott'anni codesta epidemia si sviluppò nuovamente in Napoli, e venne descritta esattamente da Gio. Andrea Sgambati (2), che fissò specialmente la sua attenzione sulla crosta bianca delle tonsille e sul fetente alito degli ammalati, ed impiego già l'acido solforico in istato di concentrazione. Un' estesa notizla di tale epidemia l'abbiamo pure avuta da Gio. Ant. Foglia (3). Ne tratto eziandio con lode Marco Aurelio Severino , senz' allontanarsi gran fatto da Areteo e da Aezio. ed adottando nel metodo curativo gli acidi solforico e muriatico (4). Fra i primi scrittori intorno alla medesima malattia deonsi pure annoverare Ildefonso Numez (5) Cristof. Perez de Herrera (6), Tomm. de Agujar (7) Tomm. Broucoli (8); Gio. Domen. Prosimi (a), Aezio

(1) De Angina et Garotillo puerorum. Complut, 1611. 4. (2) De pestilenti faucium adfectu Neapoli saeriente,

opusculum. Neap. 1620. 40.

(3) De Anginosa passione. Neap. 1620. 4:

(4) De recondita abscessuum natura, p. 513. LB.

(5) De gutturis ulceribus anginosis. Hispat. 1615. 4.
 (6) De scientia, caussis, praesagio et curatio-

(6) De scientia, caussis, praesagio et curatione faucium et gutturum anginosorum. Madrid. 1615. 4. (7) Apologia adversus Nunnez. Murc. 1621. 4.

(3) De populari horribili ac pestilenti gutturis et an-

nexarum partium affectione. Neapoli 1622. 4.

(9) De faucium et gutturis anginosis et pestiferis ulceribus. Messan. 1633. 4. Cleto Signini (1), Tomm. Bartolino (2), Gio. Battista Carnevala (3); Marco Ant. Alayma (4) e Andr. Tamajo (5),

Per altro quanto fosse incongruente il metodo curativo le si scorge evidentemente dall' struzione di Franc. de Romani (6), il quale nel primo stadio preserive copiose missioni di saugue, purganti, applica ventose, fa prendere del bolo armeno con pietre preziose, usa per le parti affette i gargarismi di acido vitriolico allungato con entrovi dell'allume sciolto.

73. Questa terribile malattia regnò tra il 1747 ed il 1751 per la Francia, l'Inghilterra e l'Italia, dove valentì medici la osservarono e la descrisero esattamente, en estabilirono un più sodo e ragionevole utatamento. Sopra ognattro si distingue il trattato classico di Gio. Fothergill' (7), dhe inculca il metodo corroborante e stimolarte come il più confacevole y e disapprova altamente gli evacuanti e i refrigeranti (8). Gio. Starr medico a

(2) De angina puerorum Campaniae Siciliaeque epidemica. Neapo. 1653. 8.

⁽¹⁾ De morbo strangulatorio. Rom. 1656. 4.

⁽³⁾ De epidemico strangulatorio affectu. Neap. 1620. 4.

⁽⁴⁾ Discorso intorno alla preservazione del morbo consultatio pro ulceris syriaci curatione. Palermo. 1625. 6.1 - Consultatio pro ulceris syriaci curatione. Panormi 1625. 4.

⁽⁵⁾ De morbo Garrotillo. Madrit. 1621.

⁽⁶⁾ Consultat. med. chirurg. p. 311. Neapol. 1669. fol.

⁽⁷⁾ N. 1711. m. 1780.

⁽⁸⁾ An account of the sore-throat, attended with ulcers. Lond. 1751.

Liskard della Cornovaglia osservò oltre questa specie di cinanche, anche la poliposa (1), ed egli, non che Fordyce, usarono nella prima specialmente l'acido muriatico (2). Ne diede pure un'eccellente descrizione Gio. Huxham medico a Plimouth, che la curava cel'a china, coll'acido solforico, colla tintura di mirra e con altri simili stimolanti (3). In Francia se ne occuparono Malouin (4), Garnier (5) e Chomel (6), Il primo risguarda come sintoma pericoloso l'emorragia dal naso, e riferisce, che nella Piccardia parecchi bambini attaccati dalla cinanche cangrenosa morivano nello spazio di nove ore. Garnier male a proposito la tratta coi salassi e cogli emetici, ripetendola da vizi della linfa, e Chomel vi aggiunse l'uso della canfora e dei vescicatori. Chiunque conosce le ulceri cangrenose non crederà certamente, che Boucher e Raulin le curassero collo zucchero di saturno (7). Martino Grisi, medico di Cremona, fu il primo in Italia ad os-

(2) Raccolta pei medici pratici, vol. XIV. p. 448.

(3) Opp. tom. III. p. 92-140.

(4) Mêm. de l'academ. des scienc à Paris, a. 1746.
 p. 151. a. 1747. p. 563. a. 1748. p. 531. a. 1846. p. 113.
 (5) Quaestio medica: an anginae gangrenosae eme-

ticum. Paris 1950. 4.

(6) Dissertation historique sur l'espèce de mal de gorge gangreneux, qui a regné parmi les enfans l'an dernier, Par. 1749. 12.

(7) Recueil périodiq. d'observat. de mèdec. tom. VIII. p. 577. - RAULIN des maladics occasionée par les variations de l'air, p. 261.

⁽¹⁾ LESKE estr. dalle Transaz. filosofiche, vol. III. p. 26.

servare ques' angina, e ad accorgersi, ch' era seguita generalmente da peripneumonie (z). Nel 1752 la malatita sviluppossi anche nel Simmenthal, dove su eccellentemente descritta da Dan.Langhans (2). Dieci anni appresso, Dupny de la Porcherie la riscontrò a Chiaron, e quantunque avesse sperimentato assai nocivo il salasso, usò tuttavia un metodo troppo inefficace (3). Del pari sembrano insigniscanti i suggerimenti di F. Peurose, che ripone una speciale confidenza nell' antimonio ricoperto di cera. (4).

74. Vexto la metà del secolo decorso manifestossi più frequentemente e con carattere epidemico una imponente e quasi nuova malattia , la febbre miliare, stata giù osservata anche in addietro-qual sintoma di altre febbri, come hanno dimostrato Gio. Luigi Seip (5), Gio. Fanto. ni (6), Dan. Gugl. Triller (7); Carlo Allioni (8), Cristof. Molinari (9) ed altri. Cl' Ippoerativi descrivono un' epidemia, in cui si appalesarono delle asprezze aventi la

⁽¹⁾ Lettere mediche. Cremona 1746. 8.

⁽²⁾ Descrizione d'alcune singolarità del Simmenthals Zurigo 2753. 8.

⁽³⁾ Journal de medicine, tom. XVIII. p. 496.

⁽⁴⁾ A dissertation on the inflammatory, gangrenou and putrid sore throat. Oxf. 1766. 8.

⁽⁵⁾ De purpura, morbo antiquo. Gott. 1741.

⁽⁶⁾ De antiquitate et progressu febrium miliarum. Aug. Taurin. 1747. 8.

^{. (7)} Opusc. vol. II. p. 70.

⁽⁸⁾ De miliarum origine progressu et curatione. Aug. Taurin. 1758. 8.

⁽⁹⁾ De miliaris exantematis indole et tractatione. Vienn. 1764. 8.

forma del miglio, e simili alle punture delle zauzare, le quali upon producevano gran prurito, ma recavano un singolar sollievo nel sesso femminile (1). Anche il follone di Ciro e Ferecide soggiacquero ad una somigliante eruzione (2). Erodoto medico Romano (3), e lo stesso Aviceana (4) accennarono parimenti la febbre miliare come un sintoma di altre malattie, e di fatto riscontrasi in non pochi scrittori qualche cenno sulla sopravvenienza di tale esaptema ad altre febbri, senza che i medici vi abbiano mai dedicata una particolar attenzione.

Solo dopo il 1650 à fatta eruzione diventò un sintoma ordinario e quasi costante in molte epidemie. Essa fa osservata per la prima volta in Lipsia, come afferma Crist. Gio. Lange, professore in quella città (5). Due anni appresso ne trattò Gio. Hoppio in una apposita dissertazione inserita nella biblioteca di Platner (6). Più nota però è quella di Goff. Welsch e di Sigism. Rup. Sulzherger, in cui viene già ammessa la distinzione di miliare bianca e rossa, ma si scopre altreal il sommo imbarazzo pel metodo curativo (7). Mancaci a dir vero ogni precisa conteza del carattere dinamteo della febbre, a cui la miliare sopravvenne come sintoma costante; ma le congetture più

⁽¹⁾ HIPP, cpidem. lib. II. sect. III. p. 1020.

⁽²⁾ Ivi lib. VII. p. 1229. 1230.

⁽³⁾ AET. tetr. II. serm. 3. e. 129. col. 244.

⁽⁴⁾ Storta della medicina, Tom. II.

⁽⁵⁾ Opp. tam. II. p. 96. tom. II. p. 608. ed. RIVIN. Lips. 2715. fol.

⁽⁶⁾ De purpura. Lips. 1652. 4. HALLER bibl. med. pract. vol. III. p. 9

⁽⁷⁾ HALLER dissert. pract. vol. V. p. 447.

ragionevoli la fauno supporre d'indole astenica, perche ne rimanevano attacate specialmente le puerpere, e Velsche assicursa, che codesta cruzione, annichie alleviare, ingrandiva il più delle volte il pericolo (1). Certo è, che la malattia andò propagandosi da Lipista (2), e se ciò accadde mediante il contaggio, come taluni opinano, essa progredì con sorprendente rapidità, poichè Sydenham fino dal 1605, accennò la miliare per un'eruzione nota da lungo tempo nell' Inghilterra (3).

75. I medici alla prima comparsa della febbre miliare, in vece di investigare le condizioni remote, dalle quali dipendeva la maggior frequenza di sì fatta cruzione, si perdettero in ricerche sofistiche ed inutili sulle alterazioni morbose degli umori come cagione fondamentale della medesima ; e seguendo la teoria chimiatrica dominante pretesero di averla ritrovata nell'acidità della linfa (4). Egliuo fondarono troppo precipitosamente questa deduzione d'odore acido sieroso del sudore, che accompagna costantemente lo sviluppo della miliare , e del pari erroneamente arguirono, che gli alcali e i diaforetici produr dovessero effetti salutari in questa malattia, al cui andamento è tanto necessaria l'eruzione delle miliari, quanto quella del vaj uolo. all' andamento della febbre vojuolosa. Senza i pregiudizi, onde rimase accecato l'intelletto, si avrebbe trovato ciò che si dovea aspettare dall'esperienza di un secolo, essendo l'accennato esantema una conseguenza del sudore violeutemente espresso, d'un abuso del metodo riscaldante e

⁽¹⁾ Ivi p. 451.

⁽²⁾ Acta med. Berolin. decr. I. vol. II. p. 1.

⁽³⁾ De novae febris ingressu, Opp. p. 356.

⁽⁴⁾ MICH. ETMULL. Opp. tom. II. p. 300. Lip. 1688:

dei diaforetici; ed accadendo assai di rado, che le miliari si sviluppino sotto un adattato regimine. Sembra assai verisimile, che la propagazione dei sistema chimitatico e dei medicamenti da esso introdotti abbia resa più frequente la comparsa delle miliari. Imperocche l'esperienza ha fetto vedere in seguito, che questo esantema di rado si manifesta, quando la febbre viene trattata corrispondentemente al carattere dinamico, e al grado di stenia; locchè si scorge apertamente confrontando le osservazioni posteriori sulle miliari.

Fed. Hoffmann ei laseiò un' etiòlogia più soddisfacente di quella d' Etmullero, quantunque ammetta anch'egli per cagion prossima la corruzione degli umori, ripetendo le miliari bianche da un acido predominante, e le rosse dalla sovrabbondanza d'alcali negli umori (1). Per altro il trattamento proposto da lui e da Gio. Mich. Pehr (2) non meria molta approvazione, perchè entrambi hanno riguardato soltanto all'esantema e non alla febbre. Anche Dav. Hamilton archiatro del re d'Inghilterra (3), Binninger (4) ed Aless. Camerario (5) seguirono gli stessi principi à nella patologia cème nella terapeutica delle febbri miliari.

26. Fantoni e Pinard furone i primi a proporre ri-

⁽¹⁾ Opp. tom. II. p. 68. 99.

⁽²⁾ Anchora sacra, s. de scorzonera, p. 50. Jenae 1666. 8.

⁽³⁾ Tractatus duplex, prior de praxeos regulis, alter de febre miliari. Lond. 1710. 8. Inserito nelle opere di Sydenium opp. p. 380-441.

⁽⁴⁾ Acta helvetica . p. 76.

^{, (5)} HALLER, dissert. pract. vol. II. p. 237.

medj più convenienti. Il primo (1) rigettò il pronostico dal colore, e raccomandò gli acidi, i cor roboranti e i vescicatori (2). Pinard oltre questi ultimi lodò l'acido solforico (3), ma suppose troppe complicazioni della febbre miliare con altre malattie, e stabilì per causa prossima della medesima un'infiammazione dei nervi.

Dalla descrizione dell'epidemia Novarese di Antonio degli Agostini sembra, che in alcuni casi auche le febbri steniche vengano accompagnate dall'accennato esantema (4) perchè trovò, che l'epistassi ed il salasso recarono talvolta notabili vantaggj. La famosa opera di Carlo Allioni non ha sparso gran lumi sulla natura e sul metodo curativo della febbre miliare (5).

Antonio de Haen, cui dobbiamo le più accurate ricerche sull'origine di questa malattia, dimostrò primieramente, che un tale esantema, anzichè essenziale a certe febbri, è piuttosto una conseguenza accidentale del cattivo regimine dietetico e dell'abuso dei diaforetici; per lo che non si può attendere da esso una crisi, e si arriva a prevenire l'eruzione del medesimo, evitando il trat-

⁽¹⁾ Storia della medic. Tom. V. S. 148.

⁽²⁾ Novum specimen observationum de ortu febris miliaris. Opus posthumum. Picaeae 1762, 8.

⁽³⁾ Dissert. sur la sievre miliaire maligne. Rouen 2747. 8.

⁽⁴⁾ Osservazioni medico-pratiche intorno alle febbri miliari. Novara 2755. 8.

⁽⁵⁾Tractatus de miliarium origine, progressu; natura et curatione. Aug. Taurin, 1958. 8.

tamento riscaldante (1). Tuttavolta si danno incontrastabilmente dei casi, nei quali malgrado il metodo più confacente., ha luogo l'eruzione per una speciale disposizione della cute ; eccezione dipendente dalle osservazioni di Gins. Quarin (2), di Ant. Stoerk, di Matt. Collin (3) e d' altri. [Gio. Pringle giudicò critica la miliare (4), e Rob. Wallace Johnson la riscontrò utile nelle puerpere (5), del qual avviso furono Crist. Molinari (6) e Planchon (7). Ma Giovanni Jacobo Wernischeck andò accorgendosi coll'esperienza, che la febbre miliare dopo l' introduzione d' un trattamento più conveniente è divenuta più rara (8). Felice Asti la osservò assai di rado al suo tempo (1783) nel Mantovano (9), e Carlo White non la trovò mai critica nelle puerpere (10). Gio. Fordy ce acceuna e nello stesso tempo rigetta un' opinione manifestata da alcuni scrittori iutorno all' origine e propagazione dell' esantema mi-

⁽¹⁾ Rat. med. P. V. p. 3. P. VIII. pag. 103. P. IX. p. 93. P. X. p. 194.

⁽²⁾ Method. med. febr. p. 78. 79.

⁽³⁾ Ann. med. III. p. 100.

⁽⁴⁾ Diseases of the army, p. 107.

 ⁽⁵⁾ New oystem of midwifery, p. 367. Lond. 1769. 4.
 (6) De miliaris exanthematis indole et tractat. Vienn.
 1764. 8.

⁽⁷⁾ Edinb. Comment. vol. II. p. 234.

⁽⁸⁾ Quesito: d'onde dipendono tante febbri putride r perché son divenute rare le febbri miliari? Vienna 1786. 8.

⁽⁹⁾ Terzo anno medico. Mantova p. 63.

⁽¹⁰⁾ Del trattamento delle gravide e delle puerpere, trad. dall' Ingl. Lips. 1775. 8.

liare occasionata, secondo i medesimi, dall' uso del caffe (1).

77. L'opinione di de Haen trovò un valente disensose nell' archietro Svezzese Schulz di Schulzenheim, il quale dimostrò, che la miliare non costituisce una specie di malattia . ma solo un sintoma di certe febbri; che non è contagiosa; che il più delle volte viene originata dai medicamenti: e che nelle febbri steniche si arriva a prevenirla col mezzo dei refrigeranti (2). Non altrettanto era illuminata la Francia intorno al presente soggetto, mentre ancora del 1779. Bouteille indicò diverse specie e complicazioni della febbre miliare e fra le altre la febris miliaris Forcalqueriana (3). Più giudiziosamente opinò Baraillon sull'epidemie accompagnate da tale esantema, facendo vedere, che l'epoca dell'eruzione non'determina alcun pronostico per l'esito della medesima (4). Contemporaneamente Franc. Beretta pubblicò il suo pregevole trattato, dove decanta specialmente le dosi abbondanti di etere solforico (5). Baraldi sperimentò prima d'ognaltro in queste febbri la china (6), e Carlo Gius. Damilano distinse ac-

(1) Historia febris miliaris Lond. 1763. 8.

(2) Svar pa Academiens fragan; Huru all slags Frn sel kan forekommas och bottas? Stockh. 1770. 8.

(3) Journal de medicine, tom. LI. pag. 173. 249. 259. 351. 403.

(4) Historie de la soc. roy. de medec. à Paris, p. 193.

(5) De miliaris differentia, natura et curatione. Mediol. 1778. 8.

(6) Storia d'una constituzione di febbri miliari. M dena 1781. 8. curatamente le miliari critiche dalle sintomatiche (t), ma Le Tual negò l'esistenza delle prime (2). Gastellier derivò generalmente questo canatema dalla soppressione della traspirazione, diversificò la miliare puerperale dalla comune, e ne presagì la comparsa dal polso intermittente (3).

78. Solo in questi ultimi tempi s'imparò a distinguere la scarlatina dalla rosolia e dai morbilli , mentre gliscrittori antichi generalmente confondono questi esantemi. Parecchi stranieri non hanno per anco ammessa la dovuta distinzione; perchè Sauvages accenna la rubcola ed i morbilli come una stessa malattia (4); perchè i Francesi li comprendono amendue sotto la denominazione di rougcolë; perchè anche gl' Italiani esprimono i morbilli e la rosolia soltanto con quest' ultimo termine, gl' Inglesi con quello di meastes, e gli Svezzesi con quello di maessling. All' incontro i Tedeschi hanno apposto un nome particolare a ciaseuno degli accennati esantemi; distinzione conosciuta fino dagli Arabi , ond' è che a torto Sauvages , Gruncr e Reiske asserirono essere stati dai medesimi con-. siderati per una stessa malattia i morbilli e la rosolia, mentre i traduttori del medio evo osarono prendere indistintamente come avente un solo significato i vocaboli ora di morbilli, ora di roscolae (5) Rhazes su realmente il

⁽¹⁾ Trattato sulle miliari, trad. dall'Ital. Gottinga 1782. S.

⁽²⁾ Journal de medecine, tom. LXIX. p. 193.

⁽³⁾ Della febbre miliare delle puerpere, trad. dal Franc. Manh. 1782. 8.

⁽⁴⁾ Nosolog, method. tom. I. p. 432.

⁽⁵⁾ GRUNER morbor. antiquit. p. 99.

primo ad accennare la rosolia sotto la denominazione di Hamikah trasportats in blactiae dal tradutore. Eccone la descrizione: questo esantema non si solleva sopra la cute, forma una gonfiezza risipolatosa, e comparisce soltanto nel terzo giorno della malattia (1). Werlbof vi riconosce giustamente la rosolia (2). Alì figlio d' Abba distingue l' Hhamikah dal vajuolo e dai morbilli Hhasbah, ed indica prima d'ognaltro le vescicole che alle volte si manificato stano sopra il tumore risipolatoso (3). Parimenti Avicenia fa differenza tra l' Hhamikah ossia la rosolia e l' Hasbah ossia i morbilli ed il vajuolo, e colloca la prima tra i due ultimi (4).

Foresto ci ha lasciato la storia d'una rosolia epidemica del secolo sedicesimo (5), e Prospero Marziano la desortive latinistandone la denominazione Italiana di rosolia (6) Sembra che Dan. Sennerto sia stato il primo ad osservare la scarlatina, a vvcenacchè egli la risquardi per una degenerazione dei morbilli. (7) Tomm. Sydenham (8) e Ricc. Morton (9) ne fanno menzione come di malattia già nota; anzi il secondo ci porge il ragguagho d'una scarlatina astenica discernendola computamente dai mor-

⁽¹⁾ RHAZ. contin. lib. XVIII. c. 8. f. 382. d. 383.c.

⁽²⁾ De variol et antrac. p. 63.

⁽³⁾ Theoric. lib. VIII. c. 14. f. 56.

⁽⁴⁾ Storia della medicina, Sez. VI. 5. 83.

⁽⁵⁾ Observat. lib. I. c. 17.

⁽⁶⁾ HIPPOCRAT. illust. epidem. lib. II sect. 3.

⁽⁷⁾ Med. pract. tom. II. lib. IV. c. 12. p. 178.

⁽⁸⁾ Opp. p. 126.

⁽⁹⁾ Opp. tom. III. p. 17. 24. 43.

billi. Anche la rosolia riscontrata epidemica da Gio. Miclis Fehr non è stata che una scarlatina (1). Fed. Hoffmani non tratta a parte nè della rosolia nè della scarlatina, ma parlando dei morbilli s'esprime nella seguente maniera: Rubcolae e la rossalia differiscono dai morbilli in quanchi e s' avvicinano maggiorimente alla risipola e formano macchie più piecole (2) i caratteri contradetti entrambi dall'esperienza. Goli nel 1710. assicurò , che la scarlatina era recentemente provenuta dall' Ingbilterra, e che confondevasi frequentemente colla rosolia (3). Egli stesso però incorse in questo errore, polchò ne animette l'eruzione nel quarto giorno della mulattia, mentre sì tardi non si sviluppanò che la rosolia ed i morbilli (4).

Gio. Storch ha composto un trattato particolare sulla scarlatina (5), e descritto un'epidemia della medesima sotto il nome di rossalia (6). Ant. de Haen (7) e Navier (8) s'occuparono egualmente con lode intorno al medesimo oggetto. Ma la storia più compiuta della scarlattina, e specialmente della sua affezione succedanca; cioòdella gonfiezza del corpo, l'abbiamo avuta da Marc' An-

- (1) Anchora sacra, s. de scorzonera, p. 100.
- (2) Opp. tom. II. p. 63.
- (3) Acta med. Berlin. dec. I. vol. II. p. 4. (4) Ivi p. 20.
- (5) Trattato della scarlatina. Gotha 1742. 8.
- (6) Annali medici, vol. 11. p. 534.
- (7) Theses sist. februam divisiones, p. 20. Vindob.
- (7) Theses sist. Jeorium aivisiones, p. 26. Villado.
- (8) Dissert. sur plusieurs maladies populaires, qui ont regne a Chalons sur Marne, p. 208. Paris 1753. 8.

tonio plenciz (1). Gugl. Withering riconobbe a Birmingham una scarlatiua epidemica e determino la dagnosi tra cessa e la cinanche cangrenosa (2). Finalmente Cr. Gio. Antonio Ziegler si rendette benemerito per aver indicati collar maggior precisione i contrassegui che diversificano i tre mentovati essattemi (3).

7g. Mon ha guari si cominciò a conoscere un'angina epidenica detta poliposa , ossia il croup degl' Inglesi, di cui, per quanto mi venne fatto di rilevare, l'opera ainatomico-patologica di Crist. Bennet contiene il primo cenino (4). Cli accadde appunto di osservare; che un ammalato dopo una violentissima tosse, sembrò espettorare la membrani interna della trachea e quigidi congetturò, che in seguito essa siasi rigenerata. Nic. Tulpio riscontrò la stessa malattià in un sarto, ma non sapendo dapprincipio qual fosse l'origine di quella membrana straordinaria argoì; che provenisse dalla trachea (3).

"Una tale malatia fu osservata come epidemica nella Francia, nell'Italia e nell'Inghilterra del 1715. fino al 1746. Il mediei di Farigi trivarono, che dopo i più valent sforzi veniva cacciata fuori del petto una membrana grossa come una pergamena (6). Martino Ghisi la riscontrò in Cremona, ne-diede un' eccellente descrizione, e propose

⁽¹⁾ Opp. tom. III.

^{1 (2)} Edinb. comment. vol. VI. p. 294.

⁽³⁾ Osservazioni di medicina, p. 93. Lipsia 1787. 8.

⁽⁴⁾ Theatr. tabidor. p. 55. Londin. 1656. 8.

⁽⁵⁾ Observat. med. lib. IV. cap. 9. pag. 294. Amstelod. 1685. 12.

⁽⁶⁾ Mem. de l'academ des. scienc. à Paris, a 1746. p. I. 157, 1748. p. 526.

nel primo periodo il salasso (1). In Inghilterra Stare fu il primo a darne contezza e a far delineare la indicata membrana morbosa (2).

Tra il 1755. e il 1791. quest' angina regno indemicamente in diverse provincio della Svezia. I medici, Svezzesi Rolando Martin , Darelio e Standberg ragguagliarono Rosenstein della sezione di un bambino morto di tal malattia (3). Walbom , Engestrome e Hallenio ne informarono il governo, di quel regno (4), e Roseustein, dopo aver raccolti molti casi da se stesso osservati, riuni con essitezza i contrassegni della malattia (5). Sam. Aurivillio. E Wilke ne diedero parimenti una diligente descrizione, quantunque supponessero, che la membrana in quistione fosse realmente la interna della trachea (6).

Poco appresso Franc. Hume form un eccellente trattato intorno la stessa affezione, apponendole prima, d'ognalto il nome di croup. Non volle però considerarla d'indole infismmatoria, e derivò la membrana morbosa da un induramento, del muco naturalo delle glandole tracheali (7). Gio. Andrea Murray abbraçciò la stessa opinione,

⁽¹⁾ Lettere mediche, tom. II. p. 100.

⁽²⁾ Leske, estr. dalle Transaz. filosof. vol. III. p. 26.

⁽³⁾ Rosenstein, underrattelse, p. 433.

⁽⁴⁾ Ivi p. 445. Voget nuova bibliot. med. vol. VII. p. 149.

⁽⁵⁾ Ivi p. 450. 454.

⁽⁶⁾ De angina infantum in patria recentioribus annis observata. Upsal. 1764. 4.

⁽⁷⁾ Inquiry into the nature, cause and cure of the croup. Edinb. 1765. 8.

ma ne limità il trattamento alle missioni di sangue, ai vescienti, e all' ispirazione di vapori acquosi (i). All'incontro Gio. Johnston dichiarò la malattia di genere putrido ed affine alla cinanche cangrenosa (2), e rigettò quiudi mercurio raccomandato da parecchi medici, e fra gli altri da Fed. Ben. Lentin (3).

Crist. Fed. Michaelis si rendette sopra tutti benemerito della conoscenza e della cura dell'angina poliposa, poich'egli dimostrò la natura infiammatoria della medesima, paragonò la formazione della membrana morbosa a quella dei polipi in altre parti del corpo, raccolse i risultati pratici più interessanti, e propose il metodo antiflogistico, specialmente gli emetici, i vescicatori e fia anche l'apertura della trachea (4).

Era poi riservato a Gio. Millar l'onore di determinare l'importante distinzione tra il croup e l'asma spasmodico dei bambini, non che di riconoscere a trattare fondatamente quest'ultima cotanto singolare e pericolosa malattia (5).

80. La rafania, di cui ho accennato trovarsi qualche vestigio nell'antichità, fu osservata epidemica più volte ne'tempi moderui, e diligentemente esaminata, in ispezialtà dai medici tedesch i(6).

Del 1668. essa regnò nella Voigtlandia, e del 1650,

⁽¹⁾ Nov. commentar. Gotting. col. IV. p. 44.

^{. (2)} Osservazioni di malattie epidemiche, p. 157.

⁽³⁾ Edinb. comment. vol. VI. p. 230.

⁽⁴⁾ De angina polyposa. Gotting. 1778. 8.

⁽⁵⁾ Riflessioni sull'asma e sul callo de piedi, tradot, dall' Ingl. Lipsia 1769. 8.

⁽⁶⁾ Storia della medicina, Tom. III.

1674. 1675. nella Francia e nell'Inghilterra (1). Tomm. Willis parla dell'epidemia di quest' ultimo anno , allorchè descrive questa terribile malattia (2). Anche Gio. Corr. Erunner ne ha dato ragguaglio, attribuendone la causa alla segala cornuta, ossia al'ogliata, com'era accaduto verso la fine del secolo sedicesimo (3). Ma da quell'epoca l'ergot, che alcuni non esitarono di confondere colla rafania, ha fatto deplorabili stragi nel piccolo paese di Sologne tra la Loira od il Cher, Le continue inondazioni di quel territorio paludoso , la miserabilità degli abitanti , e la sovrabbondanza di formento annebbiato e misto di segale allogliata rendono colà frequenti le febbri periodiche, le idropisie, le paralisi, l'epatitidi, ed endemico l'ergot (4). Nel 1710. si propagò fino ad Orleans lungo le sponde della Loira, attaccando quasi unicamente il sesso maschile. Nöel chirurgo d'Orleans tentò di recidere le parti cangrenose, ma tuttavia gli ammalati perivano (5). In quell' anno medesimo si manifestò per la prima volta anche nella Lombardia (6).

La rafania divenne più universale nel 1717, poichè andò propagandosi per tutta la Germania, e specialmente

⁽¹⁾ Gott. Budeaeus consilia medica. Budissin 1717. 8. - Carlo. Nic. Lang dell'uso nocivo del secale cornutum. nel pane. Lucerna 1717. 8.

⁽²⁾ De morb. convuls. c. 8. p. 45.

⁽³⁾ Ephemer, nat. curios. dec. III. a. 2. p. 348. (4) Encycloped, method. Agricolture, art. Excor.

Jour. des Sav. a. 1676. t. IV. p. 79.

(5) Mêm. de l'académ. des scieinc. a Paris, a.

^{1710.} p. 8.

⁽⁶⁾ Ginanni, delle malattic del grano in crba. Pe-, saro 1759. 4.

nell' Holstein, nella Lusazia, nella Sassonia e nella Svizzera. Fra i medici Sassoni uno dei primi ad osservarla fu il rinomato Giorgio Wolf. Wedel di Jena, che la derivò dalla segale cornuta, ed insieme cogli altri scrittori suoi contemporanei ne descrisse i sintomi come di affezione puramente convulsiva, senza far menzione della cangrena secca riscontrata in Francia come costante caratteristica dell' ergot (1). Mostrasi dello stesso parere Crist. Amed. Wilisch medico di Pirna, che ripete le convulsioni diquesta malattia da un sale corrosivo volatile contenuto nella segale cornuta (2). Ne ha dato una più esatta descrizione Gio. Dan. Longolio zelante Stahliano (3), negando la presenza della febbre ed accennando in vece come sintoma il bulimo, e come rimedi gli acidi, fra i quali l'aceto. Oltre la segale cornuta, dopo il di cui uso si sviluppano bene spesso immediatamente dei sintomi pericolosi , può annoverarsi fra le cause occasionali di questa malattia anche la melata, da cui generasi un fermento putrido il quale cagiona le infiammazioni de' visceri. Buddeo ammette la stessa origine, e per la cura suggerisce gli emetici, e segnatamente l'ipecacuana (4). Gio. Cristiano Gaberkorn, medico di Camenz, accusa ora la segale cornuta, ora la melata, in cui suppone l'esistenza di un voleno mercuriale che attacca i nervi (5).

⁽¹⁾ HALLER, dissert. pract. v. VII. p. 557.

⁽²⁾ Notizia d'una nuova malattia convulsiva Pirna 1717. 8.

⁽³⁾ Dell'epidemia del grano, 1717. S.

⁽⁴⁾ Consilia medica etc. Budissin 1717. 8.

⁽⁵⁾ Pensieri intorno la nuova malattia nervosa o spasmodica. Budissin 1717. 8.

Secondo le notizie di Gugl. Uld. Waldsch (1) midoo de malattia mastrossi nell' Holstein sotto le medesime apparenze. Egli non riconosse la segale per causa costante ed unica, perchò talvolta non ha prodotto alcuna cattiva conseguenza, ma piuttosto l' atmosfera umida e le nebbie troppo dense e frequenti; nel qual sentimente concorrono parimenti i medici di Breslavia (2).

Nella Svizzera la malattia sembrò in quell' anno medesimo alquanto diversa. Carlo Nic. Lang. valente scrittore accenna la cangrena secca qual sintoma [ordinario , senza essere accompagnato dalla febbre, e delle segale reputa novica e velenosa specialmente quella che ha provato l'influenza della melata (3).

81. Nel 1722. la rafania i si manifestò nuovamente a Stettin, dóve secondo la relazione di Muller essa attaccò specialmente i pescatori, i marinaj e i contadini (4). Attorno a quest' epoca anche Fed. Hoffmann la osservò e la descrises senza far menzione della cangrena, ma soltanto di ulceri e di pustole negli arti. (5).

Del 1/36. la malattia tornò ad imperversare nella Slesia, dove se ne occoparono Gio. Ant. Serime di Wartenberg e Burgart di Schweidultz (6), Il formicolamento, i dolori, le convulsioni, il bruciore interno, il bulimo, le illusioni de'scusi ed il delirio n'erano i sintomi ordinari. Quantunque lungo fosse il corso dei medesimi, man-

⁽¹⁾ HALLER diss. prac. v. VII. p. 518-550.

⁽²⁾ Collez. di Breslavia 1717. Sett. p. 76.

⁽³⁾ Dell'uso nocivo della segale cornuta. Lucerna 1717. 8.

⁽⁴⁾ Acta med. Berolin. dec. II. v. VI. p. 50,

⁽⁵⁾ Opp. vol. III. p. 34.

⁽⁶⁾ Satir. Med. Siles, spec. III, p. 35, 57,

eava però il pericolo di contagio e la presenza della febbre. Talvolta comparivano in fine delle macchie sopra gli arti, resi sovente paralitici. La segale cornuta sembrò la eausa più evidente di tatti questi fenomeni, perchè un cane che ne avea mangiato fu sorpreso da violente convulsioni.

Per altro dall'epidemie che regnarono tra il 1741. e 1742, 'nella marca di Brandeburgo e nell' Holstein, mauon nel territorio di Brunschwich, avveguacche ivi appunto la nebbia avesse guastato tutto il grano, si potè arguire che non sempre la malattia riconosca la stessa origine e le medesime cause (1). Carlo Aug. di Bergen professore a Francfort sull' Oder ripetè la rafania principalmente dall'uso del formento corrotto dalla melata, e suggerì per rimedj l'ipecacuana, il castoreo e i sali volatili (2). Ma nell' Holstein la malattia non cessò punto, benchè il governo avesse di già inibito il consumo de' grani recenti sospetti, e quindi Kannengiesser argomentò, che piuttosto. l'aria racchiudesse la cagion primitiva di quella epidemia (3). Alcuni anni appresso vi si oppose Rosenstein, e ritenne la divisione secondo Lang della segale cornuta in innocente e venefica (4). Linneo descrisse l'epidemia che desolò nel 1746, e 1747, le provincie della Westrogozia, Smalandia e Beklingia, Avendo però osservato, che ne.

⁽¹⁾ Bruckmann commerc. literar. Noric. a. 1743.
p. 50.

⁽²⁾ HALLER disser. pract. vol. I. p. 75.

⁽³⁾ Act. natur. curios. Vol. VII. p. 103.
(4) De morbo spasmodico-convulsivo epidemico.

⁽⁴⁾ De morbo spasmodico-convulsivo epidemico. Lundin. Goth. 1742. 4.

rimangono attaccati gl' individui soliti a nutrirsi di pane d'orzo, s'immaginò che l'erisamo (raphanus raphanistrum) pianta comune ne' seminati d'orzo e cotanto acre, potesse essere risquardato per cagion primitiva d'affezione à singolare. Passò dipoi a considerare l'ipotesi per un fatto, ed inventò quindi il nome di rafania (1).

82. Quanto differisce l'Ergot dalla rafania, lo si scorge specialmente dalla descrizione datane da Mulcaille di Pluviers nel Gatinese. Il sintoma principale si è la separazione delle parti, consequentemente alla cangrena secca delle medesime. Mulcaille accusa la segale macinata in istato d'umidità ed avvelenata dalla melata, e propone per rimedi in principio le missioni di sangue, indi i corroboranti (2). Da lì a non molto Salerne instituì altre più accurate ricerche intorno alla stessa malattia (3), e trovò che la segale cornuta nerastra o rossigna riesce egualmente nociva ne porci, e produce la cangrena. Osservò eziandio, che se le parti cangrenose vengono recise, la morte divien più sollecita; e se cadono da sè, gli ammalati possono ancora vivere per qualche tempo. Salerne non ha mancato di dipingere l'influenza, che l'aria paludosa ed il terreno pantanoso di Sologne esercitano sul corpo e sullo spirito di quegl' infelici abitanti. In seguito Sauvages adottò nel suo sistema nosologico l'ergot sotto la denominazione di necrosis ustilaginea, riportando ad un altro or-

⁽¹⁾ Amoenit. academ. vol. VI. p. 430.

⁽²⁾ Mem. de l'academ. des scienc. a Paris, a. 174. p. 528.

⁽³⁾ Mem. presente à l'acad. des scienc. à Paris, vol. II. p. 155-164.

dine la rafauia della Germania (1). Ma G. G. Zimmermann (2). e Tissot non distinsero punto l'una dall'altra (3). Saillant però ne indicò una differenza essenziale, dando un'esattissima descrizione dell'orgot (4), cui si può paragenare quella di Read per l'epidemia d'Arras del 1764 (5).

83. Dopo la metà del secolo passato i Tedeschi s'accinsero ad esaminare nuovamente la segale computa ed il carbone del formento , onde viemmeglio determinare l'influenza di tali difetti del grano sull'origine della rafania. Mich. Cristof. Hanow (6) e Giorgio Gio. Model (7) cercarono di dimostrare, che nè la ruggine del formento , nè lar qualità della segale potevano cagionare effetti sì perniciosi. Ma l'ultima epidemia, che regnò tra il 1770. ed il 1771. in Sassonia, Svezia e Danimarea, o ceasionò unuore ricerche sull'argomento. Nella Svezia M. And. Wahlin medico di Jonkoping trovò falsa coll'esperienza le teorie di Linneo (8), megò la proprietà contagiosa della malattia, ed opinò che con ribussero a produrla degl'insetti umetattidi inelata. Nell'Hol-

⁽¹⁾ Nosolog. method. vol. II. p. 623. vol. I. p. 554. Sawages commette l'errore di risguardare l'ergot ora qual necrosis, ora qual convulsione.

⁽²⁾ Dell' esperienza, vol. IV. p. 413.

 ⁽³⁾ Oeuvres complet, vol. VI. p. 171.
 (4) Edinb. Comment, vol. IX. p. 161.

⁽⁵⁾ Traité du seigle ergoté. Strasb. 1771. 12.

⁽⁶⁾ Singolarità naturali ed economiche, vol. I. p. 290. Lips. 1753. 8.

Model, continuazione delle sue ore chimiche,
 p. 1.-69. Pietroburgo, 1968. 3.

⁽⁸⁾ Vetensk. Academ. Handl. f. ann. 1771 p. 14-43.

stein e n'lla Danimarca le relazioni de medici provinciali illustrarono alquanto la natura della malattia. La più interessante tra queste è quella di Fil Gabr. Hensler (1), che ne ha datà una diligente e soda etiologia, ed ha proposto per rimedi curativi gli emetici, i vescicatorj, i diaforetici, e per preservativo la valeriana (2).

84. L'archiatro Gio, Taube ha descritto circostanziatamente e dottamente la rafania manifestatasi nel circolo di Zelles Egli assicura d'aver rilevato dopo molti esperimenti, che aveale dato origine la segale corrotta dalla melata, e che gli ammalati non si riavevano, finchè non mangiavano del pane di farina vecchia e purgata. Di 600 rafanitici osservati dall'autore, ne morirono 97. La malattia si sviluppava realmente sotto doppio espetto, cronico ed acuto, dipinto e l' uno e l' altro in una maniera grandemente istruttiva. Riscontrò rarissim o il passaggio in cangrena, ed ottenne considerevoli vantaggi dall'uso degli emetici in principio, e di poi degli stimoli volatili, della serpentaria, dell' alcali volatile', non che dalle scosse clettriche (3). Altri insistettero di bel nuovo a supporre innocua l'accennata segale; opinione sostenuta con ragionamenti e con fatti spezialmente da Teod. Aug. Schleger di Cassel (4), da Rod. Ag. Vogel (5), da L. E,

⁽¹⁾ Relazioni e riflessioni concernenti la rafania. Copenh. 1772. 8.

⁽²⁾ Tode, bibl. medico-chirurgica, vol. I. fasc. 1. p. 150.

⁽³⁾ Storia della rafania. Gottinga 1782. 8.

⁽⁴⁾ Esperienze colla segale cornuta. Cassel 1770. 4:

⁽⁵⁾ Apologia della segule, ec. Gott. 1771. 8.

Eschenbach prof. di Rostock (1), e da Gio. Laud. Le idenfrost prof. in Duisburgo, che risguardò piuttosto co-

me causa la penuria de' viveri (2).

Gio. Ern. Wichmann, medico aulico in Hannover, ha dato egli pure un'eccellente descrizione della malattia, in cui la paragona al ballo di S. Vito, e nega che si verifichi in essa la cangrena secca (3). L. F. Ben. Lentin la giudicò molto somigliante alla colica saturnina (4). Arr. Matt. Marcard osservò a Stade una malattia convulsiva simile alla rafania, ma diversa per la mancanza del bulimo, per l'indole sua contagiosa e per la copiosa evacuazione da' vermi; e nella stessa occasione espose alcune sue saggie riflessioni intorno alla differenza notabile che passa tra l'ergot di Sologne e la rafania della Germania (5).

85. Finalmente in questi ultimi tempi s' instituirono muove e più esatte indagini, per determinare le circostanze, sotto le quali esse si generano e comunicano alla fatina le proprietà nocive. Tillet ripete il guasto della segale dalla soverchia maturazione (6). Tessier dal terreno

(2) De morbo convulsivo epidemico Germanorum.

Duisb. 1771. 4.

(3) Della rafania che regnò nel duc. di Luneburg del 1770. 1771. Zelle 1711. 8.

(4) Osservazioni sopra alcune malattie, p. 1-80.
Gott. 1774. 8.

(5) Esperienze mediche: vol. II. p. 1-62.

(6) Dissert. sur la cause, qui corrompt et noircit les grains de bled dans les épis, Bordeaux 1755. 4.

⁽¹⁾ Del preteso nocumento della segale allogliata. Rostock 1771. 4.

troppo concimato (1), Ag. Dion. Fougeroux de Bondaroy dalla letaminatura di colombina (2). Le indagini però di Tessier informo a quest'a agomento riescono importantissime (3). Parmentier trovò che il ble braine eagiona realmente delle convulsioni (4), ed il cel. Fel. Fontana cunamente delle convulsioni (4), ed il cel. Fel. Fontana cunamente in dei risultati in parte falsi confondendo la cangrena colla motte, cui soggiace il formento durante il germogliamento, ed asserendo d'avret rinvenuto nella prima degli animali infusori (vibrio), i quali promuovono l'inferione di tali malattie de grani (5), opinione abbracciata primenti da Maur. Roffren (6) e rettificata dipio da Carlo Amed. Rafa (7), non che da Fed. Rainville (8), che alla denominazione di cangrena, sostituì quella di urcedo (9).

86. Negli ultimi due o tre secoli comparvero non poche storie di epidemie, appiunto perchè i medici aveano adottato il costume di non prendere in veruna considerazione i rapporti dinamici delle malattie, senzaenfrare nell'investigazione dei medesimi, mediante l'opportunità e le condizioni rimote, e di attenersi puramente ai sintomi,

⁽¹⁾ Mêm. de la societé de medec. a Paris, ann. 1776. p. 417-430. ann. 1777. 1778. p. 587-615.

⁽²⁾ Mem. de l'academ. des. scienc. a. 1783. p. 101.

⁽³⁾ Mêm de l'academ. des scienc a. 1783, p. 101.

⁽⁴⁾ Traité des grains. Paris 1783. 8.

⁽⁵⁾ Journ. de phys. tom. IV. p. 144.

⁽⁶⁾ Osservazioni sopra la ruggine del grano. Lucca: 1767. 8. Journ de phys. tom. VII. p. 369-385.

⁽⁷⁾ Dammarks og Holsteens Flora, D. I. p. 307. Kiobenhavn 1796. 7.

⁽⁸⁾ Journ. de phys. tom. VI. p. 380.

⁽⁹⁾ RAFN l. c. p. 311.

ammettendo per conseguenza altrettante specie di epidemie, quanto diversi apparivano i sintomi predominanti. Quindi avvenne, che comparvero le descrizioni di epidemie catrarali, biliose, pituitose, nervose, retumatiche, infianmatorie, putride e verminose, che si riscontrarono dappertutto infiaite complicazioni a misura che si manifestavano fenomeni differenti, e che si rendette oltre modo complicato ed irregolare il metodo curativo.

Ecco il sentiero perfettamente fallace dell'osservazione, dove Tomm. Sydenham fu l'antesignano di tutti i medici posterio (1). Egli è certamente tra quei pochi si può dire con ragione che abbiano tanto giovato, quanto hanno pregiudicato. È dovere dello storico di non lasciarsi o accecare dall' autorità, e d. ascendente di alcuno, o o assaire da verum pregiudizio, o condur fuori della via della verità con preventive persuazioni. Non farò dunque eccezioni nemmeno a questo antico idolo della mia venerazione, massime anche perchò la critica più severa non osa negare le di lui grandi, e reali benemerenze.

Quando si riflette, che Sydenham visse in un tempo, in cui Franc. Silvio, Ottone Tachenio e Tomm. Willis aveano fatto salire al suo apice la chimiatria, ed in cui i seguaci di que' corifei erano allora nell'Inghilterra Dan. Duncan, Gio. Jones e Nat. Hodges; quando si considera, che dall' altro canto i jatromatematici, fra' quali' si distinguevano Arsibaldo Pitcairn e Gugl. Cole, mostravansi ligi alle sofisticherie sopra oggetti meteorici del pari che i loro antagonisti chimici; d'uopo è riconoscere il merito

⁽¹⁾ N. del 1624. a Winford-Eagle nella contea di Dorset, m. a Londra nel 1689.

di Sydenham, per aver egli dimostrato la fallacia e l'incongruenza di tutte le ipotesi del suo tempo, e ricondotto i medici sul quasi abban lonato sentiero della natura edell'esperienza.

87. Il suo sentimento sui principi, dietro i quali debb'essere studiata e trattata la medicina, egli lo esprime precisamente in una digressione che incontrasi nel suo sag-

gio intorno alla cura dell' idropisia (1).

» Ippocrate riprende chiunque si applica con maggiore studio e curiosità alla fisica speculativa, che alla fisica pratica. Del pari gli uomini illuminati de' nostri giorni han ragione di tacciare coloro, i quali credono non potersi la medicina meglio promuovere, che co' nuovi ritrovati de'chimici. Poichè sarebbe un atto d'ingratitudine il non riconoscere di buon grado dalla chimica il vantag-; gio ch' essa ci ha recato, col proporci de' medicamenti assai utili e nel tempo istesso altrettanto opportuni a soddisfare certe indicazioni; e contenuta entro i limiti della farmacopea, essa diventa pure un'arte lodevole Le più squisite dissertazioni di tal-sorta altro non sono chegrazise ed eleganti metafore, le quali a guisa di tutte le cose che han per base la imaginazione, anzichè la natura , saranno dal tempo distrutte e annichilate ; giacchè i giudizi della natura aggiunte alla realtà delle cose non periscono che colla natura medesima Che se io avessi incominciato con un'ipotesi, non sarei stato men pazzo di colni, che per fabbricare una casa voless' erigerne i piani superiori prima di gittarne le fondamenta; locche è proprio di que' tali , cui piace come suol dirsi, fabbricare castelli in aria. »

⁽¹⁾ Opp. p. 339-341.

Sydenham definisce la malattia per un conato della natura, tendente ad eliminare la materia morbosa. Ove questi sforzi per la separazione delle sostanze nocive dagli umori, si verifichino con molta celerità, ne segue una malattia acuta; e qualora gli ostacoli di tai conati, ovvero la materia morbosa sia di tal natura, che non possa essere separata in uno spazio conveniente di tempo, la malattia diventa cronica. Fra le acute ve ne hanno diverse provenienti da una costituzione particolare e quasi incomprensibile dell'aria; e queste sono l'epidemie. Sydenham considera la somma diversità delle malattie epidemiche per un oggetto indispensabile della più diligente investigazione; poichè la moltiplicità dei sintomi ci può guidare ad un metodo curativo speciale, che può giovare in un'epidemia e nuocere in un'altra. E siccome le malattie intermedie assumono il carattere epidemico dominante, si scorge quindi , che nel vajuolo , nella dissenteria ne' morbilli, e simili, converrà ora un metodo, ora un altro, Frustranei dunque riescono i tentativi di que' medici, che investigano le cause delle malattie iu certe sostanze occulte del corpo. Perocchè anche l'uomo il più sano, quando s' espone all'influenza d'un clima d'una stagione capace di produrre dell' epidemie, ne può rimanere attaccato. Bisogna dunque prendere in considerazione non tanto la diversità dei sintomi e l'esito dei metodi curativi, quando, l'azione delle cause morbose occulte. Lo spediente più sicuro per conoscere le diverse specie di epidemie, consiste nella fedele e naturale descrizione delle medesime, secondo l'ordine con cui si succedono le une alle altre (1). 88. Come modello di sì fatta diligente descrizione della

6. Come modello di si latta dingente descrizione della

⁽¹⁾ Ivi p. 19-26.

successione delle malattie epidemiche, Sydenham narra la storia nel periodo corso del 1661 fino al 1675, durante il quale suppone d'aver osservato cinque costituzioni l'una dopo l'altra, senz' alcuna interruzione. Egli considerô per fondamento generale una febbre stenica, detta da lui febbre depuratoria, da cui fa dipendere le intermittenti, e persino la peste che regnò in progresso. A cotesta sebbre depuratoria si possono a bell' agio applicare tutti i principi Ippocratici concernenti la cozione e la crisi. Onde poi distinguere le singole e diverse costituzioni epidemiche, e riconoscere il carattere pratico delle malattie dominanti, Sydenham propone primieramente l'esatta osservazione di tutte le affezioni complessivamente e partitamente, e l'esatta considerazione dei siutomi. Egli accorda, che parecchi sintomi si manifestino in tutte le febbri, e fra gli altri non è cosa singolare, che in quasi tutte si riscontrino degli stravasi di bile. Non mancano tuttavia alcuni segni distintivi delle febbri puramente epidemiche, nè sfuggono essi all'occhio dell'attento osservatore. Qui appartiene specialmente lo stato umido e secco della cute, da cui si può arguire le specie della febbre, ammenochè l'arte non abbia alterato il carattere della malattia (1).

Di leggieri si scorge, che i principi proposti da Sydelam per distinguere le costituzioni epidemiche, sono malsicuri e vacillanti. Imperocchè, s'è vero, che i sintoni divengono indispensabili per riconoscere i diversi stadj delle malattie acute e l'influenza dei medesimi sopra i singolari organi; no basterà giammai p. e. l'umidatà o la sicecità della cute per comprendere il carattere dinamico o pratico d'una malattia acuta. Ma talo fu pure l'errore di

⁽¹⁾ Ivi p. 156-158.

tutti gli osservatori posteriori di epidemie, i quali seguirono fedelmente l'esempio del prototipo inglese.

89. Nella desorizione della prima epidemia tra il 1661 e il 1661. Sydenhum derivò la febbre stenica da un ebolimento del sangue, e rigottò la supposizione d'una materia particolare che corrompa la massa del sangue, mentre anche gl'individui più sani vengono assalti da tale febbre epidemica. Il di il un tetodo curativo non si allontana punto da quello suggerito dai chimiatrici suoi contemporanei, nello stesso genere di febbri. Dopo il salasso ordina un emetico antimoniale, e dipoi un narcotico di capi di papavero. Verso il fine della febbre corre ai coà detti cordiali, alla contrajerva e al bezoar. Inoulca di guardarsi dai medicamenti viscaldanti, che promuovono il sudore, e biasima il trattamento sintomatico, facendo vedere, che tutti i sintomi provenienti dall'epidemia richiedono la stesso cura della malattia universale (1).

Sydenham considerò le febbri intermittenti, che si manifestano nell'epidemie, sotto lo stesso punto di vista delle continue, ritenendo ogni parossismo delle prime per una piccola febbre continua. Disapprova però fortemente le missioni di sangue e i catartici, e raccomanda piuttosto i diaforettici e gli oppiati. Nella prima epidemia usò la china, ma colla più grande incertetza ed angustia; effetto appunto della poca sna conoscenza del rimedio. Propone verso il fine delle intermittenti un leggiero purgante, ommettendo il quale teme la sopravvenienza d'una specie di delirio, come conseguenza naturale di à fatto genere di febbri, cui cerca di prevenire cogli oppiati e colla china (2).

⁽¹⁾ Ivi p. 36. 38.

⁽²⁾ Ivi p. 58. 60.

L'epidemia degli anni 1665 e 1666, che infestò la città di Londra, fu d'indole pestilenziale, manifestandosi co' carbonchi e buboni. Io ne ho fatto già altrove menzione (1). Sydenham l'attribuì ad un'infiammazione del sangue, perchè riscontrò contemporaneamente delle angine e delle pripneumonie, e perchè il sangue estratto mostrava una cotenna infiammatoria. Ei s'avvide, che in una malattia sì pericolosa si attendevano inutilmente i cenni della natura, e cominciò quindi la cura dal salasso, dopo il quale riuscirono più utili i diaforetici. Durante l'aumento di traspirazione, la natura oppressa va riacquistando un grado di alleggerimento e di vigore. L'espressione di natura non si riferisce ad un significato sofistico, ma abbraccia il complesso delle cause naturali (*).

Nella susseguente costituzione degli anni 1667, 1668 e 1669 regnò una febbre tendente ad una durata piuttosto lunga, e comunemente accompagnata da sudori colliquativi e talvolta da petecchie. Talora i cardiaci ed un regimine fiscaldante contribuivano a darle un fine sollecito. quantunque il trattamento stimolante desse sovente luogo a conseguenze pericolose, per cui convenne adottare il metodo opposto, cioè il refrigerante, che riuscì cotanto utile nel vajuolo e nelle febbri continue di questa costituzione (**). Sydenham s' attenne allo stesso piano di cura nella dissenteria epidemica dei tre anni successivi, cercando tuttavia di promuovere l'evacuazioni intestinali, avvegnachè nella precedente epidemia avesse posto ogni stu-

⁽¹⁾ Storia della medic. Sez. XIII. S. 80

^(*) Opp. p. 70-77. ---

^{(&}quot;) Ivi. p. 90-100.

dio per arrestare i sudori colliquativi; contraddizione, che nemmeno il più zelante veneratore di Sydenham saprebbe difendere. Sydenham seguì il metodo antiliogistico anche nella costituzione tra il 1673. e il 1675., in cui suppose lo sviluppo d'una febbre di nuovo genere, accompanta da dolori pleuritici e reumatici, da letargo e da stupore de' sensi, ed evitò gli eccitanti e i diaforetici, prescrivendo dopo il salasso soltanto i vescicatori e i clistieri. Ritenne poi come affatto nuova ed incognita la febbre del 1684., in cui le illusioni de' sensi ed il delirio sembravano essere i sintomi principali; ma tuttavia vi applicò quello stesso trattamento da lui prescelto per tutte le precedenti costituzioni epidemiche (*).

qo. Dalle esposte riflessioncelle intorno all'epidemie osservate da Sydenham s'inferisce a dir vero, che, se le malattie popolari ivi descritte dipendevano tutte realmente da accresciuto eccitamento, il metodo debilitante vi fosse assolutamente indicato, e che Sydenham si abbia procacciato un gran merito col ristabilimento dell'autica e semplice pratica Ippocratica. Ma io temo grandemente, ch' egli guardandosi da un difetto, sia intanto caduto nell' opposto. Imperocchè come mai si può credere, che tutte quelle epidemie sieno state generalmente d' indole stenica? Mentre è d'altronde probabile, che la sola apparenza di accresciuto eccitamento nelle forme asteniche lo abbia indotto all'uso dei debilitanti, e che l'avviamento passeggiero, che sogliono produrre gli evacuanti anche nelle febbri asteniche, lo abbia inganuato. E chi vorrà persuadersi, che la peste del 1665., e la nuova febbre del 1684. non richiedessero realmente alcun altro rimedio fuori delle missioni di sangue, della birra allungata, dei purganti? Chi mai approverà il divisamento di Sydenham, di distinguere cioè, senz' alcun riguardo alle diverse proporzioni delle forze, l'epidemie unicamente a norma dei siatomi predominanti e di ritenere sì fatte distinzioni per essenziali, quantunque pel corso di 23. anni non abbia in veruna circostanza cangiato il metodo curativo? Finalmente, quando anche dubitar non si voglia della sincerità dell'osservatore, chi non dovrà confessare, che gli stimolanti somministrati dopo il salasso abbiano grandemente giovato a togliere la debolezza cagionata dall'abuso delle antecedenti evacuazioni?

`A dir breve, per quanto grandi possano essere le benemerenze di Sydenham nel trattamento delle malattie steniche, ogni lettore imparziale delle di lui opere non potrà a meno di accordare, che gran danno ne ridonderebbe seguendone ciccamente le massime, e concorrerà nel sentimento di Huxham (†) e di Brown (*) nel risguardare il sistema di Sydenham come troppo parziale ed immeritevole della generale imitazione. E giustamente riflette Jackson, che la teoria di Sydenham differisce dalla pratica; perocchè se la febbre consiste in un conato della natura tendente ad eliminare la materia nociva o morbosa, le missioni di sangue, e l'evacuazioni non saranno certamente i rimedj più opportuni per promuovere l' andamento della natura (††). Nun so poi come si potesse

^(†) Opp. tom. II. p. 100.

^(*) Sistema di medicina, trad. da PFAFF, S. 406.
n. 5.

^(††) Treatise on the fevers of Jamaica, p. 377. Lond. 1791. 8.

difendere l'opinione di Jac. Hatchinson, il quale sostiene che dopo il tempo di Sydenham tutta la costituzione soggiacque a notabili cangiamenti; e che le febbri steniche sono oggidì divenute generalmente asteniche (**).

91. Il sin qui detto intorno al metodo di Sydenham nell'osservare e curare le malattie epidemiche vale eziandio pel famoso suo trattato della podagra. Egli descrive, a dir vero, con tutta l'esattezza la forma attiva di questa affezione, che lo tormentò per lungo tempo; ma trovasi poi in grande imbarazzo al momento di proporne le indicazioni curative generali. Riflette però giustamente, che il fondamento di questa malattia consiste in una diminuzione delle forze digerenti; ma che siccome gli accessi della medesima si manifestano con delle congestioni attive, si corre sempre rischio di scegliere un trattamento contraddittorio. I medicamenti atti a vincere l'atonia . accrescono le congestioni, e quelli atti a togliere queste ultime, fanno risorgere la prima. Sydenham considera gli amari, i corroboranti, e i leggieri aromatici come i rimedj più opportuni all' uopo, e cerca di regolare la dieta in maniera, che le congestioni non vengono impedite, e cessi altresì la debolezza del ventricolo (1).

Del pari non meritano a'cun' approvazione i suoi codi detti processus integri per la cura di tutte le malattie, perchà appogiati in gran parte al più cieco empirismo. Per esempio, nel vajuolo confluente ordina il salasso, e fa prendere un emetico antimoniale, indi della birra luppolata con acido solforico, del laudano e simili. Il pregio

^(**) Dissert. de mutatione febrium e tempore Sydenhami. Edinb. 1782. 8.

⁽¹⁾ Opp. p. 314.

principale di quest' opera consiste nell' esatta e quasi pittoresca descrizione de' sintomi d' ogni malattia.

92. Ma soprattutto reca meraviglia, e desta un nuovo sospetto sulla parzialità di Sydenham, il vedere, che Riccardo Morton suo celebre collega ed avversario assicura d'aver trattato felicemente le stesse malattie con un metodo intieramente opposto. Morton seguendo la massima di Fernelio (1), che le malattie acute provengano da un veleno distruttivo incomprensibile, il quale attacchi gli spiriti vitali , anzichè gli umori , credeva d' aver rinvenuto in questa teoria il filo d' Arianna, che gli additasse il sentiero più sicuro nel vasto labirinto della patologia. Per altro non senza fondamento accusò il suo collega Sydenham di calcolar troppo il mescuglio degli umori e le qualità alterate, e di considerare la morte nelle febbri maligne come una conseguenza della distruzione prodotta da una cangrena interna, senza riconoscere il veleno della causa febbrile (2). Parimenti lo biasima di aver proposto nel vajuolo maligno soltanto il regime rinfrescante, l'acido solforico e simili altri medicamenti, guardandosi troppo scrupolosamente, dall' uso di tutti gli stimolanti ed antisettici. Morton accorda bensì, che qualora il calore esterno tormenta soverchiamente gli ammalati, ovvero qualora gli spiriti vitali possono vincere il veleno , il metodo refrigerante non arrechi alcun pregiudizio. Narra però d'aver osservato in innumerevoli casi, che essendo stati trascurati gli stimolanti, ed applicati in vece i debilitanti, non da altro motivo si poteva ripetere l'esito fatale del vajuolo c di simili malattie acute. E più volte

⁽¹⁾ Storia della medic. Sez. VIII. §. 66.

⁽²⁾ MORTON , opp. tom. III. p. 86. 87.

gli accadde di osservare, che gli ammalati caduti in gran pericolo mediante l'abuso dei refrigeranti non potevama vincersi se nost oggli oppiati e con altri stimolanti ed antisettici. Ond'è che Sydenham, negli ultimi anni della sua vita, modificò le sue massime ed abbandonò quasi interamente il metodo antifogistico (1).

Per quanto giuste possano essere queste riflessioni di Morton intorno al metodo di Sydenham; convien tuttavia confessare, ch'esse s'appoggiano in parte a delle idee arbitrarie ed ipotetiche. Imperocchè come dimostrare l'estenza degli spiriti vitali, o la presenza d'un veleno distruttore nelle malattie acute? Eppure ei si vanta di uon esser ligio a veruna ipotesi, e di battere unicamente il sentiero della natura e dell'esperienza, desumendo le indicazioni curative dal mescuglio degli umori, il quale può venire alterato da quella sostanza fermentante venefica, che minaccia la distrusione degli spiriti vitali. Seguendo le ultime indicazioni, la cura è soltanto sintomatica, nè diventa radicale se non quando si cerca di climinaro il veleno.

93. Morton nella sua definisione delle malattie epidemiche sale fino ai primi fondamenti della fisiologia. Egli crede di poter arguire l'esistenza degli spiriti vitalì, come di una specie di sostanza aerca, dal senso di assopimento che si manifesta dopo la pressione sui nervi. Questi spiriti vitali costituiscono il primo principio attivo del corpo, l'elemento della fermentazione generale, che mantiene tutta la massa degli umori in un mescuglio uniforme, e che si comunica specialmente al saugue, perchè i nervi gli servono bensì di canale, ma non lo racchiucia

⁽¹⁾ Ivi p. 88. 89.

dono costantemente. Tutte le malattie, in ispezialtà le acute e le epidemiche, derivano dalla moltiplice corruzione di questi spiriti vitali. Nelle convulsioni soggiacciono ad un' esplosione troppo forte, nella paralisi rimangono stupidi, nello scorbuto inerti e condensati, nel reumatismo aridi ed infiammati (1). L'origine rapida dell' epidemie da' cangiamenti dell' aria e dal raffreddamento, il celere sviluppo di altre affezioni dai patemi d'animo, la singolare simpatia degli organi, le improvvise metastasi sembrano dimostrare le primitive alterazioni degli spiriti vitali. Del rimanente non si ha da lui alcuna descrizione del miasma eterogeneo che attacca codesti spiriti , perchè non si può rappresentarlo sensualmente. Esso si genera però in un momento, sotto l'influenza delle passioni, dell'aria corrotta, e di errori dietetici, eccettuando il caso della febbre efimera , la quale non proviene da un miasma, ma da un semplice ebollimento degli spiriti vitali , mentre all' opposto le intermittenti , le continue e le remittenti dipendono dall'avvelenamento degli spiriti vitali.

Morton descrive dipoi quella medesima costituzione epidemica del 1665. osservata e descritta da Sydenham. El però approva coloro che usarono la china (3), ri-guarda la dissenteria unicamente come sintoma della febbre nniversale, e dichiara erroneo il preteso tratamento specifico di questa malattia, in cui giovò soprattutto la china stessa unita col laudano di Sydenham (3). Morton fa spiccare in ogni luogo delle sue opere una continua attenzione al carattere generale della febbre accompagnata

⁽¹⁾ Opp. tom. II. p. 12.

⁽²⁾ Ivi p. 237.

⁽³⁾ Ivi p. 239.

da certi determinati sintomi, ed in tal guisa dipinge egli impareggiabilmente il vajuolo, i morbilli, e la searlatina; e le numerose sus torie di malattie sono incontrastabilmente le più istruttive fra quante ne ha tramandato il secolo diciassettesimo.

94. Meno interessanti e pregeroli riuscirono le osservazioni d'Isbrando Diemerbroekio intorno alle malattie epidemiche (1). Esse si riferiscono alla pestilenza di Nimega tra il 1635 ed il 1637, all'epidemic del vajuolo e dei morbili i, non che a diverse altre malattie. La storia dell'accennata peste dimostra principalmente quanto sieno fallaci i sintomi per riconoscere la proporzione delle forze; perocché ad onta del polso normale e dell'orina sanissima gli ammalati morivano. Diemerbrockio rigettò nella cura le pietre preziose; ch'erano allora assai in vogal, e s' attenne piuttoto agli alessifarmaci e ai diaforetici. Nel vajuolo ordinò il salasso avanti l'eruzione; indi i diaforetici, e seguì lo stesso metodo in una febbre nervosa che desolò l'armata francese (2).

I diaforetici furono pure trovati utili contro la febbre pestilenziale che dominò del 1680. in grau parte della Germania e nominatamente a Lipsia: Aug. Quir. Rivino (3), riflette nella sua egregia descrizione di questa malattia, che il timore ha ingrandito il pericolo, e che le diarree arrecarono il maggior nocumento (4). Parimenti L. Mortey e L. Schacht giudicarono favorevolmente del

⁽¹⁾ Storia della medic. Sez. XII. §. 142.

⁽²⁾ Opp. omnia. Ultraj. 1685. fol.

⁽³⁾ Storia della medic. Sez. XII. §. 126.

⁽⁴⁾ De peste Lipsiensi. Lipsiae 1680. 8.

metodo diaforetico, descrivendo la così detta epidemia scorbutica che regnò in Olanda negli anni 1678. e 1679. (1).

95. Fra i Tedeschi si distinsero come zelanti ed attenti osservatori, dietro l'esempio di Sydenham e di Morton, specialmente i membri dell'academia dei curiosi dila natura, e segnatamente Luca Schraeck, presidente della medesima, per la costitutione epidemica d'Augusta, Gust-Casim. Gabrliep per quelle di Berlino, Rod. Jac. Came. rario di Tabinga, Kanold di Breslavia, Andrea e Carlo Fed. Loew dell' Ungheria (2). La principal malattia descritta dagli accennati medici qual epidemia permanente verso il fine del secolo diciassettesimo ed il principio del susseguente, fu un tifo accompagnato da peteochie e dasintomi catarrali, denominato perciò da Fed. Hoffmann febris catarrhalis maligna petechizans.

Intorno alla stessa epoca l'Italia ebbe un rinomato osservatore di costituzioni epidemiche in Bernardo Ramazzini. Vedemmo però altrove, ch' egli amava troppo il sistema chimiatrico e che per conseguenza non poteva essere risguardato come un indagatore imparziale della natura (3). All'incontro Giorgio Baglivio quantunque ligio alla teoria di Pacchioni sul movimento delle meningi, si mantenne, relativamente alla pratica, fedele alle massime di Bacone e di Sydenham (4). Conobbe e determinò e-

⁽¹⁾ De morbo apidemico observationes. Lond. 1686.12.

⁽²⁾ Tutte queste osservazioni trovansi raccolte nel secondo volume della citata edizione dell'opere di Sydenmam. Ginevra 1769. 4.

⁽³⁾ Storia della medic. Ses. XIII. §. 62.

⁽⁴⁾ Ivi Sez. XII. S. 137.

gregiamente gli ostacoli della vera osservazione, e li riscontrò spezialmente nella trascuranza degli antichi, nelle opnionio preventivamente adottate, nella falsa applicazione dell'analogia, e nell'uso incauto ed indiscreto delle altrui esservazioni. Egli espone in brevi aforismi i suoi principi generali sulla prognosi e cura delle malattie, e crede che tal metodo giovi grandemente all'istruzione. Ci ha poi lasciato una succiota descrizione delle apoplessie epidemiche che regnarono in Roma nel 1694 e 1695, e cella coà detta febbre mesenterica di Ballonio (1).

Ma Gio. Maria Lancisi ha trattato ancor più minutamente e fondatamente delle sovraceonate applessie epidemiche, che si rinovarono tel, 1705 e 1706 (2), e ne attribul la cagiene in parte alle continue variazioni dell' atmosfera, ed in parte al vivere epulonesco dei più factolosi fra gli abitanti di Roma (3). In un'altra opera spiegò l'influenza dell' esalazioni delle paludi Pontine, e nello atesso tempo parlò della febbre reumatica, che infestò Roma negli anni 1708 e 1709 (4). Finalmente pubblicò una dissertazione in cui stabilisce l'origine d'un gran numero di febbri asteniche, dall' aria palustre (5). Non è del pari pregevole quanto lasciò scritto Carlo Richa della febbre petecchiale, che regnò a Torino nel 1720. accompagnata da parecchi sintomi assai simili a quelli della peste (6).

⁽¹⁾ Prax. med. p. 683. 707.

⁽²⁾ Storia della medic. Sez. XII. §. 64.

 ⁽³⁾ De subitaneis mortibus. Opp. Genev. 1718. 4.
 (4) De nativis deque adventitiis Romani coeli quali-

⁽⁴⁾ De nativis deque adventitis Romani coeli qua tatibus. ib.

⁽⁵⁾ De noxiis paludum effluviis ib.

⁽⁶⁾ Morb. vulg. hist. s. Constitutio epidem. Taurin. 1720. Aug. Taurin. 1721. 4.

96. Gli avanzamenti della politia hanno contribuito a render più rare nel secolo decimottavo l' epidemie pestilenziali. Tuttavolta nella prima metà del medesimo se ne svilupparono alcune, le quali vennero descritte da eccellenti osservatori. Mercè queste indagini e l'esperienze non ha guari institutie nell'oriente, si è acquistata gradatamente la vera conoscenza di sà terribile malattia, ed imparato il modo di determinare più esattamente il metodo curativo.

Nel 1708. la Prussia e la Germania meridionale fa inofestata dalla peste. Dapprincipio i medici si servirono con vantaggio degli emetici, ed in seguito ricorsero alle nafte e agli alessifarmaci (1). Più pericolosa però e più universale fu quella tra il 1711. ed il 1714. (2). Glo. Fed. Boetticher la osservò in Copenhagen (3), Bart. Ad. Beringer in Wirtzburgo (4), Alkofer in Ratisbona (5). Corr. Bart. Behrens in Brunschwich (6), e Crausio raccole le osservazioni fatte in Amburgo (7), mentre Ramazzini compilava quelle di Vienna (8). Intanto Lod. Ant.

⁽¹⁾ Lett. di alcuni medici pubblicate da Gio. Ka-NOLD, Breslavia 1711. 4. PEIMA DE BEINTEMA hist. constitut. pestilentis a. 1708. Vienna 1714. 4)

⁽²⁾ CHAMBERLAYNE in LESKE estr. delle transaz. filosof. vol. I. p. 331.

⁽³⁾ Morborum malignorum, imprimis pestis, brevis et genuina explicatio. Hamb. 1713. 8.

⁽⁴⁾ De peste in genere et lue epidemico morbo grassante. Herbipol. 1714. 4,

⁽⁵⁾ Della peste di Ratisbona 1714. 8.

⁽⁶⁾ Della peste di Brunschwich 1714. 8.

⁽⁷⁾ Excerpta quaedam ex observatis in nupera peste Hamburgensi. Jen. 1714.

⁽⁸⁾ Opp. p. 804.

Muratori pubblicò il famoso suo libro del governo della peste e della maniera di guardarsene (1).

Dopo quell'epoca non si vide mai più la peste nella Germania; ma del 1721. infestò di bel nuovo Marsiglia e tutta la Francia meridionale. Antrechau ripetè il contagio dagli animali infusori, e propose alcune saggie riflessioni sulla propagazione di questa malattia (2). Astruc fece vedere, ch' essa provenuta era dal levante, e che si potea evitare l'infezione, rinchiudendosi a guisa di monache in luoghi separati e solinghi (3). Ant. Deidier istituì de .le esperienze sul sangue degli appestati, ed injettandolo nelle vene dei cani, cagionò la morte improvvisa dei medesimi. Suppose dipoi negli umori l'esistenza d'un acido originato dal veleno pestilenziale (4). Per altro la miglior opera intorno a questa epidemia noi la dobbiamo a Franc. Chicoyneau, il quale fu spedito insieme con Deidier e Verny a Marsiglia, onde presedere al governo della peste e al trattamento degli ammalati (5). Egli dimostrò contra Astruc, che la peste non è propriamente contagiosa, e che soltanto regna epidemicamente : perchè i facoltisti di Monpellieri instituirono senz' alcuna dannosa conseguenza molte esperienze sugli ammalati, e ne aprirono i ca-

⁽¹⁾ Del governo ec. Modena 1714. 8.

⁽²⁾ Notizie della peste di Tolone del 1721.

⁽³⁾ Sur l'origine des maladies épilémiques, princip. de la peste. Montpell. 1721. 8. — Dissert. de la peste de Provence. Montpell. 1722. 8.

⁽⁴⁾ Dissert. académique sur la maladie contagieuse de Marseille. Paris 1738. 12.

⁽⁵⁾ N. a Monpellieri nel 1672 fu eletto primo medico del re nel 1732, e m, nel 1852.

Mackenzie (1) ed Aless. Bussel (2) istituirono con avvedutezza e diligenza delle ricerche sulla peste del Levante. Ad. Chenot dipinse esattamente quella che desolò la Transilvania tra il 1755. e il 1757. facendo vedere, che questa malattia dovea essere risguardata per una febbre nervosa contagiosa; che non era per ciò necessario un tipo determinato, e che giovavano principalmente i corroboranti e gli stimolanti (3). Egli raccomandò grande circospezione nell'uso dei diaforetici , mentre De Haen li rigettò interamente, ed inculò piuttosto il metodo antiflogistico di Sydenham, avvegnacchè non potesse avere alcuna esperienza in una malattia di tal genere (4). Il discorso di N. R. de Rosenstein contiene puramente dei suggerimenti onde prevenire l'infezione, stante il pericolo, in cui is trovarono le provincie Svezzesi limitrofe alla Russia al momento della peste nel 1771. (5). Essa dalla Valacchia e dalla Moldavia si propagò a Kiovia, indi a Mosca, dove nello spazio di nove messi involò quasi 70,000. individui. Carlo Mertens, uno de'migliori osservatori di questa fatale epidemia, riguardolla per un tifo contagioso, impiegò assai di rado il trattamento debilitante, ed ottenne piuttosto dei vantaggi dall' uso della china e degli

⁽¹⁾ Philosoph. transact. vol. XLVII. p. 384. vol. LIV. p. 69.

⁽²⁾ The natural history of Aleppo, p. 190. Lond. 1756. 4.

⁽³⁾ Tract. de peste. Vindob. 1766. 8.

⁽⁴⁾ Rat. med. P. XIV. p. 338.

⁽⁵⁾ Tal om pesten och om dess utestangande ifran etland, hallit for K. Vetensk. Academien. Stockolm 1772. 8.

acidi minerali (1). All'incontro Samoilowitz lodò le fomentazioni fredde ed il ghiaccio (2) e tentò perfino d'inoculare la peste, dietro il progetto di Westpremi (3). Anche F. L. Meltzer (4), Schafonsky (5) e Gust. Orreo (6) ci lasciarono la descrizione di questa malattia.

Finalmente si ritornò a versare sull'oggetto interessante del contagio pestilenziale e della necessità delle contamacie e quarantene, contro la qual disciplina avea già scritto il cel. Chicoyneau. Mart. Lange, medico nella Transilvania, allegò molti argomenti per render sospettu e contamacie (7), e Pasq. Gius. Ferro convalidò viemmaggiormente à fatta opinione (8). Dello stesso avviso mostrossi parimenti Massim. Stoll (9). Per altro Mart. Lange sostiene giustamente e fondatamente, che la peste è suscettibile d'innumerevoli complicazioni, e che innumerevoli sintomi di diversa uatura possono in essa predominare.

98. Questa opinione delle complicazioni nelle malat-

(1) Observationes de febribus putridis et de pest. Vindob. 1778. 8.

(2) Della peste, che infestò la Russia nel 1771. trad. dal franc. Lipsia 1785.

(3) Tentamen de inoculanda peste. Lond. 1755.

(4) Descrizione della peste di Mosca nel 1771. Ivi 1776. 8.

(5) Descrizione ec. Mosca 1776. 8.

(6) Descriptio pestis quae anno 1771. grassata est. Petropol 1781. 4.

(7) Audimenta doctrinae de peste. Vienn. 1784. 8.

(8) Ricerche sul contagio pestilenziale. Vienna 1787. 8.

(9) Rat. med. P. II. p. 59.

tie epidemiche fur ammessa dagli scrittori del passato secolo tanto più universalmente, quanto più si andava trascurando ogni teoria, e quanto più tornava in acconcio di appagarsi dei risultati delle osservazioni semplici. Uno dei primi e più zelanti difensori delle complicazioni epidemiche fu Paolo Valcarenghi medico di Cremona, e professore a Pavia, indi a Milano, il quale godè la fama di sommo osservatore non solo presso i suoi nazionali, ma altresì presso i medici Tedeschi ed Inglesi. Le di lui osservazioni delle costituzioni epidemiche, che dominarono in Cremona tra il 1733 ed il 1740., si riferiscono specialmente alle peripneumonie biliose e pituitose, ed alle così dette complicazioni delle febbri intermittenti (1). Valcarenghi ha dimostrato ancor più apertamente la sua propensione alla ipotesi delle complicazioni, allorchè s'avvisò di dividere le febbri in venose e gastriche secondo la sede delle medesime (2).

Anche Gio. Huxham, uno de' più valenti ossereatori de secolo decimotavo, ed autore di eccellenti riflessioni meteorologiche, non sa vedere che complicazioni bi'iose; nucose, reumatiche. Egli ha però il merito d'essere stato il primo fra i moderni a descrivere esattamente il tifo lento, ossia la febbre lenta nervosa, detta per ciò comu-memente febbre d' Huxham (3). Quasi contemporaneamente

⁽¹⁾ Medicina rationalis ad recentiorum mentem observationibus adaucta. Cremonae 1734. 3. — Continuatio epidemicarum Cremonensium constitutionum. Ib 1742.4.

⁽²⁾ De praecipuis febribus specimen practicum. Cremon. 1761. 8.

⁽³⁾ Opera physico-medica, tom. 1-3. ed. Reichel. Lips. 1774. 8.

G. Manningham ha dato un'altra descrizione di questa stessa febbre, ed additandone con somma perspicacia e fondata pratica il vero metodo curativo (1).

oo. Nelle descrizioni dell' epidemie del passato secolo. la costituzione biliosa riscontrasi la più frequente fra tutte le complicazioni. Ma per la comparsa accidentale d'uno stravaso bilioso, a torto si vuole ammettere immediatamente una complicazione, o dar quindi una denominazione al carattere della febbre, ed adattarvi un metodo curativo particolare. Sydenham, il modello degli osservatori moderni, giudicò più giustamente, allorquando risguardò il mentovato fenomeno qual circostanza fortuita nelle febbri di carattere assai diverso. Anche Stahl cercò di limitare in qualche maniera l'idea della febbre biliosa, avvegnachè ritenesse la bile corrotta per la vera cagione di tali febbri (2). Gio. de Koker avea già stabilito la massima, che la bile produca la maggior parte delle malattie acute e croniche (3); e Gio. Battista Bianchi colla sua storia del fegato, favorì grandemente la supposta universalità delle complicazioni biliose (4). Tissot considerò d'indole biliosa l'epidemia di Losanna nel 1755., e la trattò coi sali, coi saponacei e cogli acidi (5). Fed. Cas. Medicus riferisce un' epidemia biliosa del 1761, in cui giovò principalmente il metodo tonico (6); e Ottavio Ne-

⁽¹⁾ The symptoms, nature, causes and cure of the febricula, commonly colled the nervous fever. Lond. 1746. 8.

⁽²⁾ HALLER, dissert. pract. vol. V. p. 153.

⁽³⁾ Ivi p. 217.

⁽⁴⁾ Historia hepatica. Aug. Taurin. 1710. 4.

⁽⁵⁾ Dissert. de febribus biliosis. Lausanii 1758. 8.

⁽⁶⁾ Raccolta di osservazioni , vol. I. p. 30.

recei ne trattò una consimile a Sieña cogli stinolanti (1): Fil. Gior. Schroeder fece supporre à generale e dominance la costituzione biliosa nella Germania, che ogni febbre remittente, dove si riscontrava dapprincipio la lingua alquanto imbrattata, non-veniva curata che cogli evacuamite e coi risolventi (2). L'ascendente di Gugl. Grent mantennte questo pregiudizio, avendo egli considerato le costituzioni, biliosa ed atrabiliore, conne le sole dominanti in certe stagioni (3). Rice. Brockleshy riputò d'iudale biliosa le febbri autunnali, che regnano uegli spedali militari (4), e Lion. L. Finke illustrò sopra ognaltro la teoria delle malattie biliose anomale (5).

Massimil. Stoll però influì eminentemente a diffondere, e a sostenere un sì fatto pregiudizio. Quautunque medico di somma capacità, non andò però severo dagli errori del suo tempo e della sua scuola, ed assegnò a tutte.
le stagioni certe peculiari costituzioni epidemiche, le quali
modificano secondo il proprio loro carattere, tutte le malattic. Nei tre primi volumi della sua methodus medendi
descrive, come generalmente bitiosa, la costituzione epidemica di Vienna tra il 1776. e di il 1780., deriva da,
questa sorgente tutte le infiammazioni, i cutarri, i reumatismi e le dissenterie, e le tratta a uorma di sì fatta
influenza epidemica. Egli opinò, che negli ultimi quattro
anni del suo professorato, siasi cangiata la oosituzione e

⁽¹⁾ ROEMER delect. opuscul, ital. vol. I. p. 389.

⁽²⁾ Opusc. vol. I. p. 45. p. 93.

⁽³⁾ Enquiry into the nature, rise and progress of the fevers, p. 321. p. 364.

⁽⁴⁾ Oeconom. and. medic. observat. p. 166.

⁽⁵⁾ De morbis biliosis anomalis. Monaster. 1780, 8.

divenuta infiammatoria. Stoll vedeva dappertutto infiammazioni occulte, e, quel ch'è peggio, le trattava co'rimedi debilitanti (1).

Egli fa conoscere minutamente i suoi principi negli aforismi. Evvi la febbre biliosa, allorguando sovrabbondi la bile, o manifesti una singolare acrimonia, nel qual caso fermenta e viene eliminata dal corpo mediante i movimenti febbrili. Questa febbre domina qual epidemia annuale durante la state, assume ogni tipo, s'associa a moltiplici sintomi , fra' quali spiccano quelli della bile fermentante. La bile cagiona sovente delle metastasi; si trasporta al capo, e vi produce delle apoplessie, delle convulsioni, delle manie; agli occhi, dove genera le cateratte e l'amarrosi; al petto, dove sviluppa le infiammazioni e l'emottisi; al basso-ventre, dove occasiona le dissenterie e le coliche : alle parti esterne , dove manifesta i reumatismi, le risipole e gli esantemi (2). Fnalmente si andò tant' oltre nel supporte l'universalità delle febbri gastriche, che Crist. Goffr. Selle non riconobbe alcun' altra febbre remittente, fuorchè la gastrica e l'etica (3); e Crist, Fed. Richter sostenne espressamente, che ogni febbre remittente assume costantemente or più or meno il carattere ga strico (4).

⁽¹⁾ N. a Ersingen nel principato di Schwarzenberg. 1742., professore di Clinica a Vienna dal 1776. fino al 1784, m. nel 1787. - WITWER archivio per la stovia della medicina, fasc. 1. p. 77-119.

⁽²⁾ Aphorismi de cognoscendis et curandis febribus §, 343. 350, 355. Vindob. 1786. 8.

⁽³⁾ Rudimenta pyretologiae methodicae, p. 212, Berol. 1789. 8.

⁽⁴⁾ Supplementi per una piretologia pratica. Berlino 1795. 5.

100. Incongruente del pari si è la distinzione d'un genere particolare di febbri dette verminose, inquanto che la generazione dei vermi è una circostanza accidentale, propria comunemente delle febbri asteniche ed anco diquelle di diverso carettere, maniente essenziale pel metodo curativo. Franc. Torti avea di già osservato, che la sopravvegnenza de' fenomeni verminosi nelle intermittenti epidemiche, non ne alterava punto il trattamento (1); e nello stesso parere concorsero Gio. Pringle (2) e Mich. Sarcone (3). Tuttavolta sussistette il pregiudizio del carattere verminoso di alcune epidemie in Germania, in Francia, ed in Olanda. Il trattato di Moreali è certamente uno dei primi e dei più compiuti , quantunque la febbre da lui osservata altro non sia che un tifo ordinario acuto (4). Morgagni ci ha conservato l'osservazione di Pedratti intorno ad una peripueumonia verminosa; che per nessun sintoma essenziale diversificava dalle altre pulmonie asteniche (5). Marteau de Grandvilliers (6), Marchant (7) e Raulin (8) raccolsero simili osservazioni concernenti tali peripneumonie verminose. Parimenti de Berge diede la sto-

⁽¹⁾ Therapeut. special. p. 295. 296.

⁽²⁾ Diseases of the army, p. 9. 213.

⁽³⁾ Delle malattie di Napoli , P. III. p. 208.

⁽⁴⁾ Delle febbri maligne e contagiose prodotte da vermt. Modena 1739. 8. (5) Mongagnt de sedib. et causs. morbor. ep. XXI

n. 43. (6) Journal de médecine, tom. XVII. p. 24.

⁽⁷⁾ Recueil périodique d'observ. de médec. vol. VII. p. 134.

⁽⁸⁾ Observat, de médec. p. 296;

ria d'un'epidemia verminosa nella Piccardia, la quale altro non era che un tifo lento (1). Sagar riscontrò nella Moravia una febbre della stessa indole, di cui fa consistere i contrassegni nell'odor acido del sudore e della respirazione (2). Lepecq de la Cloture risguardò per verminosa un'influenza nella Normandia, avvegnacchè non accompagnata dalla presenza di vermi, nè curata con metodo specialmente adattato a tale supposta circostanza (3); ma I. J. van den Bosch ripetè tutte le malatite dai vermi, benchè non sappia indicarne alcun segno patognomonico, o dirigere il trattamento terapeutico a norma delle pretese cause occasionali (4).

Bianchini (5), e de H.en (6) mossero i primi dubbj sulla realtà di sà fatta indole verminosa dalle febbri. Il secondo riputò sospetti gl'indizi ordinari dei vermi, e Musgrave derivò piuttosto la così detta febbre verminosa da impurità delle prime vie (7); quando Butter avvicinandosi ancor più alla verità, nè attribuì l'origine unicamente ad un'atonia degli organi digerenti (8); e Beu. Rush ne-

⁽¹⁾ Recueil périodique d'observ. de médec. vol. VII. p. 372.

⁽²⁾ Systema morbor. vol. II. p. 327.
(3) Istrusione per osservare secondo i principi d' Ip-

¹ ocrate, p. 271.
(4) Historia constitutionis epidemicae verminosae. L.

⁽⁴⁾ Historia constitutionis epidemicae verminosae. E. B. 1769. 8.

⁽⁵⁾ Lettere medico-pratiche intorno all'indole delle febbri maligne, Venez. 1750. 8.

⁽⁶⁾ Rat. med. P. XIV. p. 139.

⁽⁷⁾ Co lez. pei medici pratici , v. III. p. 529.

⁽⁵⁾ Ioi ool. VIII p. 348.

gò interamente l'esistenza della medesima, osando perfino sostenere il paradosso, che i vermi ne' casi di rilassamento degl'intestini riescano giovevoli, anzichè nocivi (1).

101. Alla febbre verminosa sembra molto affine la pituitosa o mucosa, ch' è un grado leggiero del tifo accompagnato da stravasi ed altri fenomeni mucosi. Anche questa fu considerata come una nuova specie di sebbre e suscettibile d'innumerevoli complicazioni con altre malattie. Gio. Gior. Roederer e Carlo Amed, Wagler ci fornirono la prima e la più compiuta descrizione di una tale epidemia (2), fissando singolarmente la loro attenzione alle complicazioni della medesima con altre malattie acute e croniche, e all'esistenza della tignuola capillare, ossia dei vermi ricuridi. Sarcone dando ragguaglio dell'epidemia di Napoli la risguarda come una conseguenza della carestia generale, e ne ripone il carattere principale nella sovrabbondanza e separazione del glutine animale (3). Gugl. Grant sotto la denominazione di sinoco non putrido, descrisse quella stessa malattia da se riscontrata epidemica nel 1769 (4); e Massim, Stoll indicò minutamente le occultazioni e le differenze della così detta febbre mucosa.

102. Bensì la forma d'ordinario piu blanda di febbre astanica accompagnata da inflammazioni superficiali de canali aerei, e da accumulamento di muco in quelle parti medesime, detta comunemente febbre catarrale, suscitò nel passato secolo molte diverse singolari epidemie. La pri-

⁽¹⁾ Ricerche ed osservazioni mediche, p. 235.

⁽²⁾ De morbo mucoso liber singularis. Gott. 1765. 4.

⁽³⁾ Delle malattie di Napoli, P. II. p. 170.

⁽⁴⁾ Enquiry into the nature, rise and progress of the fevers, p. 148.

ma viene descritta da Fed. Heffmann. Essa regnò del 1706. dopo un'inverno assai rigido, in Berlino e ne' dinterui. Manifestavasi con gran prostrazione di forze e con apparenze di scarlatina e di macchie, terminava sovente n tabe, ed era trattata da Hoffmann coi diaforetici (1) Una simile epidenia, e,che infestò l'Inghilterra el' Olanda nel 1733, svilinppavasi anche con degli ascessi alle orecebie e con esantemi pustolosi (2). Negli anni 1742. e 1743 e il catarro epidenies à avviciuò maggiormente al grado all' apparenza di peripneumonia; e quantunque la sua crisi consistesse nell' morragia dal naso, tuttavia non tollerava il salasso (3).

Nel 1760 il catarro formò una singolare epidemia , cui venne apposta la denominazione d'influenza. Una somma tendenza alle peripreumonie , accompagnata da notabile prostrazione di forze , caretterizzò la malattà dominance; quindi i dolori più forti al principio e le diarree in seguito gettavano nel maggior pericolo coloro che ne rimanevano attaccati (4). In capo a tredici anni regnò nell'Inghilterra un catarro epidemico accompagnato anch'esso da diarree, e cedente sotto l'uso del salasso (5).

⁽¹⁾ Opp. tom. II. p. 47. 48.

⁽²⁾ SIFIETEN constit. epidem. pag. 351. - HUXHAM opp. vol. II. p. 102.

⁽³⁾ JUCH in HALLER diss. pract. vol. V. p. 297 Hux-HAM l. c. p. 186.

⁽⁴⁾ Witson in Leski estr. dalle Transaz. filosofiche, vol. V. pag. 221. Beeue Be Preste nelle agg. a Monro delle malutie degli spedali militari P. II. pag. 356.-Be Mereenso observat. med. tom. II. p. 1-7. Vindob. 1784. 8.

⁽⁵⁾ FOTHERGILL Comment. & Edimb. vol. IX. fasc. I. p. 214.

Ma la più famosa fra tutte queste epidemie, e quella che più d'ognaltra soggiacque a mutazioni relativamente alla diversita dei paesi e degl'individui , fu l'influenza del 1782. conosciuta altresì sotto il nome di malattia Russa, di catarro Russo. Non mancò chi volle indagarne l'origine e i progressi, cominciando dall'Indie orientali, dove regnò ne' mesi di Ottobre e Novembre del 1781, Passò a Mosca del 1772. in Gennajo, a Pietroburgo in Febbrajo, a Koenisberg in Marzo, nella Pomerania in Aprile, ad Amburgo in Maggio, verso il fine dello stesso mese in Inghilterra, nel mese seguente in Francia, in Luglio si propagò per l' Italia , ed in Agosto per la Spagua (1). Ess' attaccò generalmente l' età media, piuttostochè l'infanti. le o provetta (2), rimanendone quasi del tutto immuni i lattanti (3), avvegnacche i medici di Londra l'abbiano riscontrata frequentemente anche nei giovani più adulti (4). In alcuni paesi , specialmente nei montuosi e più elevati, l'affezione mostrossi assai leggiera e appeua diversa dal catarro comune (5). Generalmente però essa manifestavasi con un grado assai considerevole d'improvvisa spossatezza (6), ed altre volte svaniva sotto l'uso di una tempe-

⁽¹⁾ JOH. GRAY. ne' supplim. medici, vol. I. p. 4. Gott. 1785. 8.

⁽²⁾ LENTIN supplim. per la medicina pratica, p. 33.

⁽³⁾ Supplem. med. vol. I. p. 12.

⁽⁴⁾ Mem. med. della società med. di Londra, vol. III. p. 47.

⁽⁵⁾ LENTIN l. c. - Supplem, med. vol. I. p. 26.

⁽⁶⁾ WITWER del catarro epidemico recente. Norimb. 1782. 8. - R. Hamiston nelle mem. della soc. med. instituita l'Anno 1773. vol. II. pag. 283. - PARR Comment. med. d'Édinburgo, v. IX. fasc. 1. p. 230. - MERTENS L. c. p. 43.

ratura e d' un regime alquanto calefaciente (1). Nelle situa zioni elevate apparve realmente d'indole stenica, perchè giovarono l'emorragie di naso, gli antiflogistici e perfino Je missioni di sangue (2). In altri casi predominavano i sintomi gastrici , l'espeitorazione era biliosa , la lingua imbrattata, e l'evacuazione del basso ventre non che il vomito riuscirono utili (3). D'ordinario i dolori lancinanti al petto, la tosse continua, l'intronamento del capo. la debolezza, le convulsioni, il delirio ne costituivano i sintomi principali. Dichiarossi pericolosa specialmen te pe' vecchi cachettici , nei quali sopravvenivano le peripneumonie asteniche e l'aplopessia. Ond'è, che quasi tutti i medici, massime gl' Inglesi, disapprovarono altamente il salasso, e lodarono piuttosto gli emetici, le scosse del corpo, l'oppio, la china, e i vescicatori (4). Paterson ne assicura, che il primo trasse seco costantemente un esito fatale (5). Parecchi decantarono anche i diaforetici, siccome medicamenti tonici e stimolanti,

(1) Supplem. med. vol. I. p. 32.

(2) Bang diar. nosocom. Hafn. vol. I. pag. 17 19.
20. - Monro Comment. di Edimb. vol. IX. fasc. 1. pag.
222. - Scott ivi p. 239.

(3) LAUR. CRELL et Jo. FR. LANGGUTH diss. sistens historiam catarrhi epidemici 1782. Helmst. 1782. 4-MUN-SEN, breve notizia del catarro epidemico. Amburgo 1782. 8.

(5) Supplem. med. l. c. p. 36.

⁽⁴⁾ R. Hantston I. c. p. 290. - Supplem. med. I. c. p. 32. - J. D. Metzaer Saggio storico intorno allepidemia della primaere del 1782. Koenigb. 1783. 8. - Mutrae Descrisione dell'epidemia conosciuta sotto il nome di catarro Russo. Giessen 1782. 8. - PARR Comment. d'Edimb. I. c. p. 234. 236. - Scort ivi p. 246.

specialmente dipoichè Carmichele Smyth trovò, che il sudore contiene un soprappiù di sali animali, i quali si cristallizzano sulla cute (1).

I Tedeschi e gl' Italiani attribuirono la malattia unicamente al freddo straordinario della stagione e ai venti acrimoniosi di levate (a). Gl'Inglesi però erano già universalmente persuasi della natura contaggiasa della medesima , perchè altrimenti essa sarebbesi propagata con viemmaggiore celerità, e perchè non assaliva gli equipaggi di mare, se non quando questi avvicinandosi alla terra, praticavano gli abitanti del paese (3). Una simile influenza rinovossi nel 1788.; ma pochi medici tedeschi s' acciusero a descriverla (*).

103. Fra le malattie croniche, delle quali si è acquistata in questo periodo di tempo o la prima conoscenza od una più esatta distinzione, dessi notare primieramente la rachitide, ossia la malattia Inglese. Io son d'avviso, che mauchi presso gli antichi ogni traccia di tal malattia, e che la prima notizia sia quella dataci da Bart. Reusser (4) d'un affezione morbosa dominante nella Svizzera ed in Olanda, in cui le ossa s'incurvayano, succedeva una generale estenuazione,

(1) Ivi p. 84.

(2) Lentin I. c. pag. 30. - Mich. Rosa scheda ad c atarrhum scu tussim, quam Russam nominant. Mutin 1782. Mertens I. c. p. 44. (3) Supplem. med. I. c. p. 61, 63. - R. Hamilton

l. c. p. 278.
(*) Gio. Fil. Fogler, della dissenteria, p. 25. Gies-

(*) Gio. Fil. Fogler, della dissenteria, p. 25. Gies sen 1797. 8.

(4) Diss. de tabe infantum. Basil. 1582. 4.

e i fanciulli soffriyano un vero bulimo. Per altro Arnoldo de Boot medico Inglese nell'Irlanda fin dal 1648. descrive ancor più precisamente la richitide sotto la denominazione di tabes pictava, indicando il volume del capo, la tumefazione delle articolazioni , la dimagrazione degli arti e la durezza del basso-ventre (1). Venne dipoi alla luce il trattato classico di Franc. Glisson (2), il quale stabilisce la comparsa delle malattie nelle provincie orientali dell'Inghilterra verso l' anno 1630. (3). Nel 1660. , quando seriveva il già lodato autore, la rachitide era ancora rara nelle provincie settentrionali dell'isola. Glisson fu il primo a darle il nome che oggidì porta, a stabilirne la cagion primitiva nella debolezza dei solidi e nell'inerzia degli spiriti vitali, e a riporne la sede nella midolla spinale e nei nervi provenienti dalla medesima. Risguarda per causa rimota la cattiva maniera di vivere, e raccomanda come rimedi gli emetici, i marziali, e l'osmunda regalis. Non altrimenti opinò Gio. Majow rapporto all'origine e al trattamento di sì fatta malattia (4). Nel secolo diciottesimo Pietro Büchner s'occupò con singolar diligenza e-

⁽¹⁾ Observat. med. de adfect. omissis, c. 12. p. 35. ad calc. Petr. Borelli observat. Lips. 1676. 8. N. a Goreum 1606. m. a Parigi 1653.

⁽²⁾ De rachitide seu morbo puerili, qui vulgo the rickets dicitur. Hag. Comit. 1682. 12.

⁽³⁾ Lo stesso rilevasi dai bills of mortality dell' In-ghilterra, dove non si riscontra nemmeno il termine di Re-CKET avanti il 1634. - v. LAGGHUT in HALLER diss. pract. vol. VI. p. 307.

⁽⁴⁾ Opp. p. 383. Hag. Com. 1681. 8.

perspicacia in esaminare lo stato delle ossa, non che il loro ammollimento, durante la medesima (1).

Gio. Zeviani piantò relativamente alla rachitide una teoria adattata al suo tempo, ripetendola egli da una degenerazione acida del latte, onde si nutrono i neonati, e prescrivendovi conseguentemente gli alcali e i saponacei, oltre il rabarbaro e i fiori di cupro ammoniacale; (ens veneris Boylei) (2). Anche Rosenstein vanta la potassa per estinguere gli acidi, ma tuttavia vi unisce i marziali e la robbia (3). Sim. Pallas biasima gli alcali, loda invece dapprima gli emetici e poscia i corroboranti e in ispezialtà i marziali (4). Le Vacher de la Feutrie determinò pa debolezza delle fibre ossee qual causa della malattia, e propose un'apparato per raddrizzare le ossa contraffatte (5).

104. Alla rachitide è affine in parte il cretinismo, somma imbedillità mentale, accompagnata da una singolare deformità del cranio, e quasi endemica nelle vallate del Valesce del Piemonte, del Salisburghese, della Selva nera e delle Tartaria Orientale. Il primo cenno d'una tal malattia trovasi in un'operetta, d'altronde poco o nulla rilevante, di Volf. Hofer, medico provinciale nell' Austria superiore (6). Egli la riscontrò in alcuni paesi della

⁽¹⁾ HALLER, dissert. pract. vol. VI. p. 300.

⁽²⁾ Della cura de bambini attaccati dalla rachitide. Verona 1761- 4-

⁽³⁾ Underrattelse om barns sjukdom, p. 402.

⁽⁴⁾ Istruzioni pratiche per curare le malattie delle os. sa, p. 180. Berl. 1770. 8.

⁽⁵⁾ Traité du rakitis, ou l'art de redresser les enfans contrefaits. Paris 1772. 8.

⁽⁶⁾ Hercules medicus, seu loci communes, Norib. 1675. 4.

Stiria unita al gozzo, e la derivò dalla torpidezza degli abitanti, i quali menano la loro vita oziosamente presso la stufe e mangiano alimenti troppo grassi. Nessuna menzione però ha egli fatto della deformità del cranio, qual cagion vera di tale fattità; anzi non si parlò più dei cretini , fino a tanto che Haller non s'accinse a rammentar quelli del Valese, e la loro imperfezione ed incapacità di qualsisia stimolo (1). Bensì a' nostri giorni si riconobbe la causa prossima di sì curiosa affezione, e meglio furono determinate le rimote. Vinc. Malacarne seguendo le insinuazioni dell'ill. Bonnet, esaminò prima d'ognaltro lo stato del cranio, e del cervello nei cadaveri dei cretini, e trovò straordinariamente ristretta quella porzione di base del eranio destinata a contenere il cervelletto, oltrechè perpendicolare il foro occipitale, ed orizzontale l'apofisi dell'osso basilare (2). Per tal modo viene impedito lo sviluppo del cervelletto, ond'è che nei cretini esso ha minor numero di fogli, e la midolla allungata trovasi dapprima orizzontale, e poscia tutt'ad un tratto perpendicolare, sicchè rimangono offesi i nervi provenienti dalla medesima. Gio. Fed. Ackermann descrisse ancor più esattamente le deformità del cranio dei cretini ; e dimostrò, che non solo vengono compresse le radici dei nervi, ma che altresì soffre un ostacolo, o una difficoltà il loro passaggio e quello dei vasi pei sori del cranio (3). Mal s'appose però, allorchè-

⁽¹⁾ Elem. physiol. vol. V. p. 570.

⁽²⁾ FRINK de opuse, tom. IV. pag. 241. - FODEREdella struma, e del cretinismo; trad. dal franc. da Lindemann, pag. 101. Berl. 1796. 8.

⁽³⁾ Dei cretini, specie umana degenerata nelle alpi.

ne ripetè la cagione dalla rachitide: mentre Gius. e Carlo Wenzel distinsero adeguatamente queste due malattie, e ci fornirono insieme con Foderè e Fil. Gosfir. Michaelis (1) i migliori trattamenti intoruo al cretinismo (2).

105. Anche riguardo alla lebbra solamente in questi ultimi tempi si acquistarono le nozioni più precise, per essersi osservata in diversi climi-nelle diverse sue complicazioni e modificazioni. Gli scrittori del medio evo la distinsero con soverchia sottigliezza 3 eccondo le qualità elementari; ma in progresso essendo divenuta più rara una tal malattia, se ne trascurò intieramente la patologia.

Quanto alla lelbra nodosa (elephantiasis, lepra Arabum) Jac. Bonzio fu il primo fra i moderni a darue ragguaglio dopo d'averla riscontrata nell' Indie orientali sotto la denominazione di Courap (3). La osservò dipoi anche Stefano Wesepremi, il quale volca curaria col mercurio alcalizzato (4). Gugl. Hillary dipinse meestrevolmente quella di Barbados (5); Raimond la riavenue ne' contorni di Maniglia (6), Gio. Andr. Murray a Gottinga (7), e Bricude nell'Auvergua sotto il nome di mal de s. Mein (8).

Dal 1770. in poi si cominciò a scorgere nell', Italia

- (1) Blumenbach bibliot. med. vol. III. p. 640.
- (2) Del cretinismo, p. 187. Vienna 1802. 8.
 (3) Histor. natur. Indor. lib. II. c. 17. p. 32. Am-
- stel. 1658. fol.
 (4) Haller dissert. pract. vol. VI. p. 817.
- (5) Osserv. sulle malattie di Barbados trad. dall'Ingl.p. 383. Lips. 1776. 8.
- ... (6) Histoire de l'éléphantiasis, p. 14. Laus, 1767. 8.
 - (7) Opusc. vol. II. p. 386.
- (8) Mém. de la société de médic, à Paris, a 1782.

superiore presso Milano ed anche a Tren:o (*) una malattia del tutto consimíle, detta pellagra dal guasto che ne riceve la pelle. Franc. Frapolli ne diede il primissimo cenno (1), la risguardò per un effetto d'insolazione, nè la considerò come malattia nuova o straordinaria, avendo riscontrato negli statuti capitolari dell'ospitale maggiore di Milano all'anno 1578. il nome di pellarella. Gaet. Stram-, bio, che fu per lungo tempo ispettore dello spedale dei pellagrosi instituito a Lagnano, confutò l'opinione di Frapolli, perchè non esisteva alcuna rassomiglianza tra le due sopraddette malattie (2). Concorse nello stesso sentimento Mich. Gherardini , il quale diversificò in oltre la pellagra dallo scorbuto alpino descritto da Jac. Odoardi (3); differenze piuttosto accidentali che essenziali. Fra i primi osservatori di questa malattia annoverasi pure Franc. Zanetti medico a Canobbio, sul Lago maggiore (4). Gugl. Saverio Jansen derivò la pellagra da un'affezione dei nervi e propose per rimedio l' innesto della scabbia (5); ma Gio. Mich. Albera ne accusò invece l'acrimonia muriatica (6).

^(*) Comini v. Strambio tratt. sulla pellagra, trad. dall Ital. Lips. 1796. 8.

⁽¹⁾ Animadoersiones in morbum oulgo Pellagram. Mediol. 1771. 8.

⁽²⁾ L. c. p. 33.

⁽³⁾ D'una specie particolare di scorbuto. Disser. del sig. Odoardi Belluno 1776. 4. - GHERARDINI storia della pellagra. Milano.

⁽⁴⁾ Nov. act. nat. curios. vol. VI. p. 118.

⁽⁵⁾ De pellagra morbo in mediolanensi Ducatu epidemico. LB, 1787. 8.

⁽⁶⁾ Trattato delle malattic dell'insolato di primavea. Varese 1784.

Franc. Fanzago, che riscontrò la pellagra nel Padovano, e giudicò non esseniali i sintomi cutanei (1), e i medici Veneziani Paolo della Bona (2) e Luigi Soler (3) dichiararono, che la pellagra non è malattia nuova, nè particolare. Strambio o però fece vedere, ch' eglino non conobero la vera pellagra. Cerri (4) e Costantino Tizio (5) ci fornirono i due migliori trattati intorno a questo sogetto; il primo rilevò l' indole ereditaria della pellagra c. l' attribuò ad una diminuzione dell'irritabilità; il secondo la dichiarò una risipola periodica, cronica, nervosa. L. Careno riscontrò questa malattia anche fuoi dell' Italia, cioè a Vienna, in tre individui (6).

Non differisce gran fatto dalla pellagra La rosa esturione, malattia endemica nelle vallate d'Oviedo ricoperte quasi costantemente d'una densa e sofficante nebbia. Ne dobbiamo la prima notizia a Thiery fin dal 1755. (7), e Strambio stesso la giudicò sommamente affine alla pellagra.

(1) Paralleli fra la Pellagra ed alcune malattie che più le rassomigliano. Padova 1790. 8.

(2) Discorso comparativo sopra la pellagra, l'elefantiasi ec. Venezia 1791. 8.

tiast ec. Venezia 1791. 5.

(3) Osservazioni medico-pratiche che formano la storia d'una malattia particolare. Venezia 1791. 8.

(4) Weigel e Kuen, bibl. med. Ital. vol. II. fasc.
1. p. 204.

(5) Pellagrae morbi inter Insubriae agricolas grassantis pathologia. Lips. 1792- 4-

(6) Observationes de epidemica constitutione 1789. p.

113. 114. Vindob. 1794. 8.

(7) Recueil pèriod. d'observ. de mèdec. tom. II. p. 337. - Collez. di osservazioni scelte, vol. II. p. 334.

106. Thiery annuncia il suo mal de la rosa, come una complicazione della lebbra collo scorbuto; complicazione ancor più evidente nella lebbra settentrionale, denominata dagli abitanti della Norvegia spedalskhed, e dagli Islandesi liktraa. Bartolino fu il primo a rammentarla qual malattia endemica nel Faeroerne (1). Ultimamente poi essa! destò una particolare attenzione dei medici e dei viaggiatoti, massime dopo che il governo Danese s'occupò a sollevare la miseria dei poveri littorani della Norvegia e dell' Islanda. Eg. Olaffen , B. Paavelsen (2) , Un. Troil (3) e Petersson (4) ci fornirono la descrizione di tal malattia dell' Islanda. Hans Strom (5), Gisleson (6), Rol. Martin (7) e G. L. Odhelio (8) la descrissero nella Norvegia. Martin la ripetè erroneamente dall' uso dei pesci, i quali contengono dei vermi intestinali; ma C. E. Mangor (9) e Nic. Arbo (10) egregiamente lo confutarono. Anche Fil.

(1) Act. med. et philos. Hafn. ann. 1671. 1672. obs. 49. (2) Viaggio nell Islanda, vol. II. pag. 190. Cope-

nhagen 1775. 4.
(3) Lettere intorno ad un viaggio nell Islanda, p. 87.

287. Lips: 1779. 8.
(4) Om den saa Kaldede Islandske Skjorbjug. Sorae

1769 8. (5) Beskrivelse oswer Sondmor, D. l. p. 384. Sorae 1766. 4.

(6) De elephantiasi Norvegica. Hafn. 1785 8.

(7) Vetensk. acad. Handl. 1760 p. 308.

(8) Ivi 1779. p. 222. 1783. p. 226.

(9) Underretning om Radesygens Kiendelegn etc. p. 47. Kiobenhavn 1793. 8.

(10) Ashandl, on Radesygen eller Saltflod. Kiobenhavn 1792. 8. Gabr. Hensler si rendette benemerito della conoscenza della medesima, avendo inserito nella sua grand'opera classica le notizie che i medici della Norvegia gli somministrarono intorno allo spedatsked (1).

Sam. Amed. Guelin (2) e Sim. Pallas. (3) riscontrarono una varietà particolare della lebbra nelle vicinanze di Cherson, Astracan e del Jaik, e ne fecero menzione sotto il nome di malattia della Crimea.

107. Voigt (4), Vidal (5), ed Hensler (6) osservarono in questi ultimi tempi anclie la lebbra bianca ossia mosaica, che si riscontra più frequentemente sotto i tropici, nei coà detti Albini o negri-bianchi. Il primo a fagmenzione di questa pretesa degenerazione della specie umana è Olao Dapper, il quale appoggiandosi all'opinione del cel. Vossio sostiene, che gli accennati leuchetiopi debbono essere riguardati per lebbrosi, amsichè per una specie diversa (7). Lionello Vafer s' occupò nel descrivere diligentemeta gli Albini che abitano specialmente presso l'istmo di Darien, tra l'America meridionale e la setten-

⁽¹⁾ Della lebbra occidentale nel medio-eso, p. 375. Exc. p. 110. Amb. 1790. 8.

⁽¹⁾ Viaggj nella Russia, P. II. p. 169- Pietroburgo 1774. 8.

⁽³⁾ Viaggj in diverse provincie dell' impero Russo , vol. I. p. 302.

⁽⁴⁾ HALLER, dissert. pract. vol. VI. p. 63.

⁽⁵⁾ Mêm. de la soc. de mèdec. à Paris, a. 1767. p. 167.

⁽⁶⁾ L. c. p. 351.

⁽⁷⁾ Descrizione dell' Egitto, della Guinea, dell' Ettopia. Amst. 1668. fol.

trionale (1). Frane. Valentyn ne vide anche nell'Amboyna (2), e Gio. Fed. Blumenbach (3) nella Savoja. Quest'ultimo ei la fornito il miglior trattato intorno a questa malattia (4).

La lebbra rossa degli Arabi ricomparve anche a'nostri giorni nelle Indie occidentali; e di fatto la descrizione del mal rouge di Cajenna non differisce da quella lasciataci dagli scrittori del medio evo, relativamente alla lebbra rossa (5).

Ultimamente però è stata osservata con maggior frequenza, l' clefantiasi, specialmente sotto i tropici. Andr. Cleyer la trovò nell'isola di Giava (6), Eug. Kampfer sulle, coste del Malahar (7), Gugl. Billiary a Barbados (8), Peyssonel nella Guadaluppa (9). Couzier nell'isola Bornon (10), Tomm. Heberden a Madera (11), Goffr. Gugl. Schilling a Surinam (12) Joannis (13) e Raymond (14)

- o. (1) Descrizione dell'istmo di Darien, p. 332.
- (2) Descrisione d'Amboyna, vol. II. p. 146. Amst.: 1726. fol.
 - (3) Bibliot. med. vol. II. p. 538.
 - (4) De generishumani variet. nativa, pag. 274. ed III.
 (5) Mém. pour servir a l'histoire de Cayenne, vol.
 I. pl. 250. Paris 1777. 8.
 - (6) Ephem. nat. curios. dec. II. a. 2. p. 7.
 - (8) L. c. p. 397.
 - (9) LEGER estr. delle transaz. filosof. vol. IV. p. 347.
 - (10) Journal de médec. vol. VII. p. 401.
 - (11) Mem. di medic. vol. I. p. 20.
 (12) De lepra commentationes, recensuit f. D. Hahn.
- L. B. 1778. 8.
 - . (13) Medical observ. and inquir. v. I. p. 201.
 - (14) L. c.

perfino stella Francia meridionale. Jac. Hendy cercò d'illastrare la teoria di questa malattia; riponendone la sede nel vasi lindistici e dichinarnolo i per un'a flecione del sistema glandulare (1); ipotesi confutata dipoi da G. Rollo' (2) non che da Fil. Gabre: Hensler, la di cui opera intorno alla lebbra supera incomparabilmente quanto ci lasciarono seritto-tutti gli altri-antori sopra lo stesso 'argomento.

108. Poche malattie croniche meritano una esatta ed attenta indagine, quanto la debolezza cronica dei visceri addominali, la quale viene accompagnata da una maggior lentezza nella circolazione, da diverse alterazioni nei visceri del basso-ventre e sovente anco da convulsioni ; oltre di che è sorgente d'innumerevoli affezioni croniche, dell'artritide , de' calcoli , dell' ipocondria , dell' isterismo , di eruzioni cutanee ostinate, d' idropisie; di estenuazioni. Siccom' essa dev' essere risguardata comunemente per una debolezza mista, il trattamento potrà diversificarsi secondo i casi, ed esigere ora gli stimoli volatili, ora i permanenti. In oltre poiche a sì fatta astenia si associano bene spesso dei vizi locali, del rilassamento, delle dilatazioni varicose, degl'indurimenti, e simili, o errori dietetici gradativi; l'arte dee ricorrere anzichè a medicamenti officinali , ad una mutazione nel metodo di vivere, spediente riconosciuto dagli antichi metodici,il di cui zuzlos avalzerizos, per quanto sofistica ne sia l'apparenza, non merita verun disprezzo (3). Paracelso mise in opera ogui sforzo, onde spie-

⁽¹⁾ Treatise on the glandular disease of Barbados. Lond. 1784. 8.

⁽²⁾ Remarks on the disease, lately described by D. HENDY. Lond. 1785. 8.

⁽³⁾ Storia della medic, Tom. II. Sez. V. S. 33. Lez. VI. S. 29.

gare la connessione di questi mali, e l'origine comund dei medesimi, ammettendo per malattie dell'intera sostama l'artitide, l'emorroidi e i calcoli, e derivandole dal tar taro e dal condensamento degli impori (1).

Gugl. Musgrave determină posoia con maggior precisione l'affinità dell'artritide coi calcoli, coll'emorroidi e coll'ipocondria. Il trattato di quest'antore è classico; anche perche vi sitrovano descritte colla più scrupolosa fedeltà e penetrazione le conseguenze dell'artritide stessa; non per anco interamente sviluppata (2). In appresso e Sydenham (3), e Murray (4) e Mich. Alberti illustraroi rono il medesimo argomente (5).

Gugl, Grant ci piorge alcune eccellenti osservazioni intorno alle memorate affezioni tra loro affini (6); e Tomm. Withers dipinse la debolezza cronica senza riflettere alla vera cagione della medesima, cioè al, basso ventre (7).

109. Dopo la metà del passato secolo i Tedeschi s' occuparono a rintracciare la sorgente universale di molte malattie croniche ed inspezialtà delle periodiche; e a

- (1) Ioi tom. IV. Sez. IX. S. 63. 67.
- (2) De arthritide anomala et symptomatica. SYDE-NHAM opp. P. II.
 - (3) SYDENHAM OPP. p. 301. 321. 328.
 - (4) Opuscul, vol. I. p. 189.
- (5) Diss, de hoemorrhoidum consensu cum calculo et podagra. Hal. 1722.
- (6) Osserv. sulle malattie croniche in Londra, trad. dall'Ingl. Lipsia 1784. 8.
- (7) Della spossatezza cronica, trad. dall' Ingl. Altenb. 1779. 8.

fondare un nuovo metodo curativo capace di vincere le più ostinate e le più gravi. Gio. Kaempf fu l'inventore di tale teoria e metodo curativo. Nemico dello scrivere e dello stampare, comunicò le sue dottrine e le sue osservazioni istituite nel corso di trent' anni a' suoi figli e ad altri medici, i quali le pubblicarono nelle loro dissertazioni accademiche. Gio. Kaempf , figlio dell' antecedente, ha dato alla luce il primo opuscolo intorno a questa materia (1). Ma egli non espose che una sola forma della debolezza cronica del bassoventre, quella appunto che si riferisce ai vasi del ventricolo e alla parte superiore della vena porta. Si arguisce quindi, che Kaempf seguì la dottrina di Stahl intorno alla sede delle malattie croniche nella vena porta, per considerare una tale sorgente addominale, e per attribuire alla china que' condensamenti d'umori denominati infarctus, e per aver dedicato maggior attenzione ai vizi degli umori, di quello che all'atonia dei solidi. Accorda bensì, che tutto il sistema venoso è la vera sede di sì fatte congestioni, ma non determina nè distingne esattamente la natura delle ostruzioni. Contro le malattie procedenti dai così detti infarcimenti dei vasi, Raempf propone i suoi clisteri viscerali preparati o colla crusca e con piante ammollienti, ovvero con radice di ginepro e con altri medicamenti corroboranti.

Dan. Em. Koch non s' allontanò punto dalle massime dell' inventore, ed applicolle specialmente alla spiegazione e cura delle affezioni emorroidali, e ad altre consimili del basso-ventre (2). In seguito Gio. Gior. Schmid

⁽¹⁾ BALDINGER sylloge vol. III. p. 246. - HALLER. bibl. pract. vol. III. p. 99.

⁽²⁾ BALDINGER l. c. p. 291. .

adattò la teoria di Kaempf alle malattie dell' utero, al flusso-bianco, all' isterismo, e alla mestruazione sespesa, ripetendole da congestioni ne' vasi-dell' utero (a). Gio. Fed. Elvert vanto grandemente il nuovo metodo di apprestare i rimedi per mezzo dei clistieri, ed opinò che in tal guisa riescano più efficaci (a); asserzione abbracciata anche da Aug. Teod. Brotbeck (3), il quale ridusse in miglior sistema le idee di Kaempf, additò le controludicazioni dei clistieri viscerali, biastmandoli specialmente nella debolezza indiretta. Anche il secondogenito dell' inventore sostenne la teoria ed il metodo del padre, in rieguardo a molte cachessie dipendenti dalla già additata sorgente addominale (4).

110. Finora soltanto alcune disertazioni accademiche aveano data qualche notizia del metodo di Kaempf. Que' medici, che lo sperimentarono, ne fecero grandi encomi, p. e. Tissot (5) e Zimmermann, il quale erasi determinato di tradurre in lingua latina' tutti gli opuscoli già pubblicati intorno al medesimo soggetto. Finalmente il Giglio maggiore dell' inventore, medico alla corte d'Assia-Hanau, diede alla luce un'opera compiuta sulla teoria, e aul metodo curativo di suo padre, rendendosi per tal modo veramente benemerito della medicina (6). Egli suppo-

⁽¹⁾ Diss. de concrementis uteri. Basil. 1753. 4.

⁽²⁾ BALDINGER, sylloge l. c. p. 281.

⁽³⁾ Ivi p. 364.

⁽⁴⁾ W. L. KAEMPF diss. de morbis ex atrophia. Basil. 1756. 4.

⁽⁵⁾ Ocurres complet. vol. VI. p. 79.

⁽⁶⁾ Trattato sopra un nuovo metodo di guarire le malattie più ostinate, che hanno la loro sede nel basso-

ne la sede degl' infarcimenti nella vena-perta, ma non isviluppa col dovuto ordine le cagioni dei medesimi, e ne annovera diverse specie, le quali sembrano piuttosto prodotti de' suoi clistieri , di quello che parti dello stato morboso. Ecco com' egli si esprime : la quarta specie consiste in certi otricelli e stracci, che sortono selamente verso il fine delle malattie croniche, dopo l'applicazione di settecento e più clistieri. Preferisce i clistieri viscerali ad ogni altra forma di rimedi, appunto perchè portano più facilmente le sostanze medicamentose al luogo degl' infarcimenti. Per ingredienti dei clistieri egli ammette, oltre la crusca, que' vegetabili, che abbondano di priucipi estrattivo-gommosi, come sarebbero il cardo benedetto, la camomilla, il millefoglio, la valeriana, il fummosterno, la centaurea, la robbia, la cicuta, il guajaco, e poi l'acqua di calce, il sapone, la bile bovina. Unitamente ai clistieri prescrive l'uso interno dei corroboranti, e raccomanda l'esatto adempimento di diverse eccellenti regole dietetiche.

Per quante grande sia il merito dell' autore pel trattamento di alcune malattie pertinaci, non si può a meno tuttavia di sentire slcuni dubbi contro la di lui teoria. Ove l'autore afferma, cho coll'applicasione quotidiana dei clistieri, anche i soggetti apparentemente sani evacuavano molta copia di pituita viscosa; nasce il sospetto, che in molti casi il di lui metodo abbia occasionata la sortita anche dell'integumento maturale degl'intestini (1). Egli è in oltre troppo evidente, che questi debbono soggiacere

ventre, in ispezialtà l'ipocondria. Lipsia 1784. 8. Seconda edizione. Lipsia 1785. 8.

⁽¹⁾ BLUMENBACH, bibl. med. vol. II. p. 91. 580.

veramente classica (1), la distinse più precisamente dall' asma artritico, mentre la prima non è accompagnata da difficoltà di respiro, ma soltanto da angoscia; ed assicurò che di 100. individui attaccati dalla medesima , pochissimi si trovarono minori di cinquant'anni. Confutò l'opinione di coloro, che la considerano d'indole infiammatoria, mentre il polso non vi si accelera, mentre la malattia è cronica e periodica, mentre il vino e l'oppio ne procurano un notabile alleviamento. Gli è perciò, che la risguarda piuttosto come convulsiva. Anche Adolfo Murray sostenne quest'ultima opinione (2), e riputò, come avea già fatto Morgagni , doversi denominare sì fatta affezione uno spasmo del cuore. All'incontro Gio. Fothergill vi suppose tuttavia uno stato d'infiammazione (3); Haygarth ritenne per cagion prossima la dilatazione del mediastino che riscontrò ne' cadaveri (4), e Gio. Jac. de-Berger dichiarò la malattia per un asma artritico accompagnato da una speciale infiammazione (5). Parimenti Butter (6), Macqueem (7) e Crist. Fed. Elsner nella sua ec-

- (1) Commentarii de morborum historia et curatione, pag. 308. 314. Lond. 1802. 8. Sembra che Erasistrato abbia fatta un'osservazione consimile a quella d'HEBER-DEN. CAEL. AURELIAN. chron. lib. 11. c. 1. p. 348. ed. ANMAN.
 - (2) Diss. de ruptura cordis. Upsal. 1785. 4.
 - (3) Opere, vol. II. p. 234.
- (4) Mem. di medic. vol. III. p. 31. Coment. d'Edimb. vol. II. p. 96.
 - (5) Collez. pei medici pratici, vol. X: p. 708,
- (6) A treatise on the disease commonly called angina pectoris. Lond. 1791. 8.
 - (7) Collez. pei med. pratici, vol. X. p. 145.

cellente dissertazione (1), la ritentero per una modificazione dell'artritide. Per altro, che anche in Inghilterra s'a ppongia talvolta il nome di angian pectoris a qualche affezione totalmente diversa, lo si scorge evidentemente dalla narrazione di Ed. Johnstone, dove si riconosce a chiare note per fondamento un idretorace incipiente (2).

112. Dalla stessa sorgente, cioè dalla debolezza cronica del basso-ventre, nasce il terribile ed atroce dolore della faccia (dolor faciei , tic douloureux) osservato già dagli Arabi, e riconosciuto viemmeglio dai moderni (3). Il primo a farne cenno in questi ultimi tempi fu il chirurgo Andreé di Versailles (4), e dipoi anche Sauvages (5). Fothergill, cui accadde di vedere una sì singolare affezione sedici volte, cercò di conoscerne attentamente la natura, ed argul dalle sue osservazioni, che le femine, e tra queste le più provette, vi soggiacciono più dei maschi; che contemporaneamente esistono delle scirrosità nelle mammelle, che una materia can cerosa potrebbe essere la cagione d' un dolore sì atroce. Dirado assai egli arrivò ad ottenere qualche sollievo, e molto meno ad effettuare la guarigione radicale, avvegnachè la cicuta siasi mostrata costantemente pel rimedio il più efficace (6). Bon-

⁽¹⁾ Trattato dell' angina pectoris. Regiomonte 1778. S.
(2) Mem. della società instituita a Londra nel 1773. sol. I. p. 126.

⁽³⁾ Storia della medicina, Tom. II. Sez. VI. S. 71. 75. 83. 88.

⁽⁴⁾ Observantions sur les maladies de l'urètre et sur plusieurs faits convulsifs, p. 318- Paris 1756. 8.

⁽⁵⁾ Nosolog. method. vol. I. p' 534,

⁽⁶⁾ Tutto le opere, vol. II. p. 164.

nard derivò la malattia dal reumatismo cronico, e la paragonò giustamente colla sciatica (1). Dello stesso avviso fu Longavan, il quale considerò l'artritide per causa eccitante del dolore; ma Menuret e Laugier concorsero nel ripeterla dai nervi (2). Crist. Goffr. Selle s'attenne all'opinione di Fothergill riguardo alla causa e raccomandò l' arsenico (3). Fed. Ben. Lentin vi si oppose (4), e Volger (5), non che Er. Gmelin (6) calcolarono piuttosto i così detti infarcimenti ovvero la debolezza cronica de' visceri addominali. Boehmer confermò una tale supposizione avendo osservato, che il dolore della faccia andava in, un caso alternando coll'artritide (7). Dacche Blunt trovò utile l'elettricità (8), Pujol s' immaginò che il dolore provenisse dalla materia elettrica circolante nei nervi , e suggerì per conseguenza la fontanella , la quale , anche secondo la testimonianza di Lentin, riuscì sovente di qualche giovamento (9).

Domen. Cotugnio con esatte e profonde ricerche illustrò egregiamente la teoria della sciatica, altra forma di

- (1) Iournal de mèdecine, vol. L. p. 60.
- (2) Ivi p. 331.
- (3) Nuovi supplim. alla medicina e alla fisica, vol. I. e. 27,
- (4) BLUMENBACH, bibl. med. v. II. p. 146. Supplem. alla medicina pratica, p. 334. Lipsia 1789. 8.
 - (5) BLUMENBACH l c. p. 506.
 - (6) Esperienze sul magnetismo animale, p. 684.
 - (7) BLUMENBACH I. c. vol. III. p. 312.
 - (8) Collez. pei medici pratici, v. XII. p. 8.
- (9) Del trismo doloroso, trad. dal Franc. Norimb. 1788. 8.

artritide. Egli la stabilì in un tresudamento di linfe nella guaina del nervo ischiadico o crurale, derivandone quindi la successiva paralisi, e proponendovi un metodo curativo il più adattato (1).

b) Diversità delle malattie relativamente ai climi.

113. Ippocrate avea già fortemente inculcato l' investigazione delle diversità nelle malattie relativamente all'influenza dei climi, e e tal fine appuato compose l'aureo suo libro de acre, aquis et locis. L' importanza di tale avvertimento si andò non ha guari tanto più comprendendola, quanto più frequenti divennero le occasioni, pei nnovi viaggi che s' intrapresero, di riconoscere le differenti forme delle malattie, e i mali endemici de diversi paesi. Poichè il clima ed il terreno d'un paese, al pari della maniera di vivere degli abitanti, comunicano un carattere particolare alle malattie; lo stidio delle osservazioni mediche instituite ne' diversi paesi non poteva a meno di facilitare la distinzione dei fenomeni morbosi essenziali dagli accidentali e di arricchire la patologia e la terapia in parecchi rapporti, e specialmente la materia medica.

I primi, che siensi distinti fra medici per osservatori nelle regioni tropiche, furono certamente Jac. Bonzio e Guglielmo Pisone (2), entrambi nativi di Leyden. Il primo escretiò per molti anui la medicina a Batavia, il secondo recossi nel Brasile in qualità di medico del duca

⁽¹⁾De Ischiade nervosa commentarius. Vienn. 1779.8.

⁽²⁾ Ambedue le opere trovansi presso Guill. Pison. De Indiae utriusque re naturali et medica, libri XIV. Amstel. 1658. fol.

Maurizio conte di Nassau. Le osservazioni classiche di Bonzio ci fecero consecere la malattie endemiche dell'Indic occidentali, la dissenteria dell'oregioni tropiche, quel-a specie di chorea s. Vitis dettan nell'Indie Beriberi, il Jawa; l'epatitide tropica, e similii. Secondo le testimoniante di questo e di altri viaggistori posteriori, non regona giammai nel Brasile alcuna spidemia; le malattie banno un corso regolare; qual viene enunciato melle opere degli scrittori piti antichi; e quelle, che in Europa si manifestano pericolose, assumono ivi un carattere ed un aspetto più benigno.

Il celebre Eug. Kaempler ne suoi viaggi per la Persia, per l'Armenia, per l'Indostan e pel Giappone (1), ha taccolte nou poche, osservazioni assai interessanti (2). Non sembrano di eguale importanza le notizie che el fernirono Gugl, ten Rhyne di Deventer (3) e Andr. Cleye (4), ambidue medici a Batavia, interno alla teoria e alla cura delle malattie nell' Indie, nella China e nel Giappone.

114. Nel secolo diciottesimo s' impiego viemmaggiore attenzione per esaminare l' influenza del clima, del terre-

⁽¹⁾ N. a Lemgo del 1651., viaggiò dopo il 1683. nella Persia e nell' Armenia, indi per l' Indostan, poscia alla China e al Giappone; finalmente, dopo dieci anni, ritornò per la via di Batavia in Europa, e m. nel 1116. medico del conte di Lippe.

⁽²⁾ Amoenitates exoticae. Lemgo 1712. 4. Storia e descrizione del Giappone v. I. II. Lemgo 1777, 1779. 8.

⁽³⁾ Dissert. de arthritide. Lond. 1683.

⁽⁴⁾ Specimen medicinae sinicae Fref. 1682. 4.

no e della maniera di vivere degli abitanti sulle malattie dominanti. Gugl. Falconero(s), Aless. Wilson'(2), Leon. L. Finke (3) e Gio. Fed. Cartheuser (4) ci fornirono de trattati generali intorino arquesto ragomento.

Rapporto alle malattie, che s'incontrano ne' lunghi viaggi marittimi ; Gugli Gackburn (5) fu il primo ad occuparane in un' opera particolare ; dove specialmente: il trattato dello scorbuto contiene le ipotesi scolastiche allor a dominanti. Bopo di lui Pietro Chira (6); Grist. Vá. era (7); e Thiesen (8) trattarono lo tesso argomento. Fra gli altri però si distinse Luigi Rouppe; il qualle servito avea lungo tempo: in qualità di medico la flotta Olandese (9). Bigot de diareguesi non solo sviluppò con precisione le malattie de' naviganti; ma raccomando altreà per prevenirle i ventilatori ((c) Salom. de Monchy anno-

- (1) Riflessioni sull'influenza del clima sulla salute; trad. dall'Ingl. Lipsia 1782, 8.
- (2) Osservaz: intorno all'influenza del clima sugli animali e sui vegetabili. Lips. 1781. 8.
- (3) Saggio d'una geografia medico-pratica generale.
 P. I-III. Lips. 1792.
 - (4) De morbis endemicis libellus. Frof. 1771. 8.
- (5) Sea-diseases, or a treatise of their nature, causes and cure. Lond. 1696. 8.
- (6) Observations sur les incommodités auxquelles sont sujets les équipages des vaisseaux. Paris 1724. 8.
- (7) De morbis classiariorum et navigantium. Witteb. 1715, 4.
 - (8) De morbo marino. LB. 1727. 4.
 - (9) De morbis navigantium. L.B. 1764. 8.
- (10) Mémoir. présenté sà l'acad, des scienc, à Paris, vol. I. p. 394.

verò diligentemente le malattie più comuni delle regioni tropiche (i). Più superficialmente versarono intorno a ciò un anonimo (a) e lo atesso. Linneo (3); ma più fondatamente ed estesamente Poissonnier Desperrierès (4), Jac. Lind (5), Gio. Clarck (6), Gio. Blane (7), Gugl. Moseley (8) e Nic. Fontana (9).

Fra le malattie di determinati paesi, le endemiehe delle regioni tropiehe dell'America sono state descritte con maggior frequenza ed esattezza. I medici delle colonie Francesi a s. Domingo e alla Cajenna, gl'Inglesi a Barhados, alla Giammaica, alla Carrolina meridionale, gli Olandesi nel Surinam hanno contributio non poco a spiegare l'indole delle malattie ivi dominanti, e ad articchire di nuove cognizioni la patologia. Per le malati

- (1) Verhandelingen, uitg. door de Maatsch. der Wetensch. te Haarlem, v. VI. p. 1-185.
- (2) Essais sur les maladies qui attaquent le plus communement les gens de mer. Marseille' 1766. 12.
 - . (3) Amoenit. academ. vol. VIII. p. 120.
- (4) Traité des maladies des gens de mer. Paris 1767. 8.
 (5) Delle malattie, cui soggiacciono gli Europei neis paesi caldi, trad. dall'Ingl. Riga 1773. 8.
- paesi caldi, wad. dali Ingi. Inga 1773. 6.

 (6) Osserv. sulle malattie dei paesi caldi, trad. dal.

 I Ingl. Copenhagen 1778. 8.
- (7) Osserv. sulle malattie dei marinoj, trad. dall'Ingla-Marb. 1788. 3.
- (8) Tratt. delle malattie dominanti sotto i tropici, trad. dall' Ingl. Norimb. 1790. 8.
- (9) Riflessioni sopra le malattie che incontrano gli Europei ne' climi caldi e ne' lunghi viaggj marittimi, trad. dall' Ital. Stendal 1790. 4.

tie di s. Domingo ne trattarono con lode Poissonnier Desperrières (1) e Pouppè Desportes (2), in seguito anche Dazille (*) ed un anonimo (3). Bajon diede una pregevole descrizione dei mali endemici della Cajenna ed additò il particolare trattamento dei medesimi (4). Grif. Hughes (5), Hans Sloane (6) e Gugl. Hillary (7) instituirono le loro osservazioni nel Barbados; Gio. Hunter (8) e Roberto jaekson (9) nella Giammaica; e Lion. Chalmers (10) nella Carolina meridionale; e fra gli Olandesi Fil. Fermin (11),

(1) Traité des ficeres de s. Domingue. Paris 1763. 8.
(2) Histoire des maladies de s. Domingue, pol. 1. 3.

Paris 1770. 8.

(*) Observations générales sur les maladies des climats chauds. Paris 1785.

des nègres aux Antilles. S. Domingue 1786. 8.

(4) Mémoir pour servir à l'histoire de Cayenne, v. 1. 2. Paris 1779. 8.

(5) The natural hystory of Barbados. Lond. 1750. fol.
 (6) A voyage to the islands Madera, Barbados ec.

pol. 1. 2. Lond. 1725. fol.

(7) Osserv. sulle malattie di Barbados, trad. dall'Ingl. Lipsia 1776. 8.

(8) Osserv. sulle malattie delle truppe nella Giammaica, trad. dall Ingl. Lipsia 1792. 8.

maica, trad. dall Ingl. Lipsia 1792. 8.

(9) Delle malattie nella Giammaica, trad. dall Ingl.

Lipsia 1796. 8.

(10) Notizie sullo stato dell'atmosfera e sulle malattie della Carolina meridionale, trad. dall'Ingl. vol. 1. 2.
Stendal 1788. 1792. 8.

(11) Traité des maladies les plus fréquentes à Surinam. Maastricht 1764. 8,

Schoeler (1) ed Em. Carlo Rodschied (2) nel Surinam.

115. La malattia più desolante delle colonie occidentali si è la febbre gialla , febbre astenica violenta, accompagnata da itérizia e da vomito; endemiça in tutte le regioni tropiche da tempo immemorabile, anzichè, come asserisce Pouppè Desportes, portata dal regno di Siam. alla Martinica, quantunque solo dopo il 1748. abbiasi cominciato a riscontrarla più frequentemente. Hughes fu il primo a darne una breve descrizione, e dipoi ne trattarono specialmente Gio. Lining (3), Gio. Mackittrick (4), Gio. Moultrie (5), Pouppe Desportes, Hillary, Moseley, e Jackson.

Nell'Indie occidentali vennero instituiti nuovi esami sopra due altre malattie dei negri, il jaws ed il pians, avvegnacche i medici Inglesi, specialmente Hillary, le confondono amendue. La prima, cioè il jaws, domina sotto i tropici, ed è stata già descritta da Bonzio sotto il nome di vajuolo amboino (6). In progresso fu Schilling (7) che ci fornì il miglior trattato intorno a questa malattia,

⁽¹⁾ Dissert. de morbis Surinamensium Gott. 1781. 84

⁽²⁾ Riflessioni sul clima e sulle malattie del Rio Essequebo. Fref. 1796. 8.

⁽³⁾ Nuove esper. ed osservaz. d'una società d' Edimburgo , vol. II. p. 419.

⁽⁴⁾ BALDINGER sylloge opuscul. p. I. p. 87. tree in framer in

⁽⁵⁾ Ivi p. 163.

⁽⁶⁾ L. c. lib. II. c. 19. p. 33.

⁽⁷⁾ Schlegel thesaur. patholog. therap. vol. II. P. p. 217. 263. and the same of the same

la quale probabilmente non differisce dal Safath degli Arabi e dal Dahesah di Ali Abbas (1).

Il pians, ch'e forse il tusius degli Arabi (a), non si riscontra endemico fuorchè sulle coste dell' Affrica, e specialmente, come afferma Ludford (3) tra gli abitanti del regno di Sanguin. A Gio. Hume ne dobbiamo la prima notizia (4), e di poi se ne occuparono Poppe Desportes, Bajon e Ludford. Ma io oso darmi il vanto d'esser stato il primo ad esporre e determinare con esattezza la storia, e principalmente le differenze di queste due malattie (5).

c') Anatomia patologica.

116. In questi ultimi tempi si andò viemmaggiorimente riconoscendo le straordinaria importanza e necessità dell'anatomia patologica, per-la diagnosi delle malattie, Intanto un ramo sì interessante della scienza ed arte medica venne arricchito d'imnumerevoli produzioni, delle quali piacemi di accennare soltanto le più pregevoli. Le prime osservazioni di tal'fatta appartengono a Gugl. Balllou (Ballonius) (Sez. XVI. S., Jr.). a, Gio. Rod. Salzmann professore a Strasburgo (6), a Fil. Sal-

⁽¹⁾ V. i miei supplim. alla storia della medicina , fase. 3. p. 93.

⁽²⁾ Ivi p. 100.

⁽³⁾ Diss. de framboesia. Edimb. 1791. 8.

⁽⁴⁾ Medissac. y and observat. of a soc. at Edimb. vol. VI. p. 211.

⁽⁵⁾ Supplim. l. c.

⁽⁶⁾ Varia observata anatomica. Amst. 1669. 16.

muth (1), a Nie. Fonkeyn d'Amsterdam (2), a Gio. Dan. Horst. (3), a Tomm. Bartolino (4), a Nie. Tulpio (5). a Domenico Panaroli di Roma (6), a Bern. Verzascha di Basilea (7), a Crist. Bennet (8), a Gio: Jac.
Wepfero (9), a Cer. Blasio (10), al sommo anatomico Fed.
Raischio (11), a Gio. Nie. Pecklin (12), a. Er. Hagedorn (13), a Gio. Jac. Harder (14), a Gio. Corr. Peyer (15),

(i) Observationum medicarum cent. III. posthumae. Brunso. 1648. 4.

(2) Responsionum et curationum medicinalium lib. I. Amt. 1637, 12. - Observationum rariorum analecta. Amst. 1641. 4.

(3) Decas observationum et epistolarum anatomicarum. Fref 1656. 4.

(4) Historiarum anatomicarum cent. I-VI. Hafn. 1654-1665. 8

(5) Observationes medicae. Amst. 1685. 12.

(6) Jatrologismorum pentecostae V. Rom. 1652. 4.

(8) Theatrum tabidorum etc. Lips. 1760. 8.

(9) Historiae apoplecticorum observationibus etc. il-Iustraiae. Scaph. 1675. 8.

(10) Observationes medicae rariores, Amst. 1677. 8.

(11) Observation. anatomico-chirurgicarum centuria.

Amst. 1691. 4.

(12) Observation. physico-medicarum l. III .Hamb. 1691. 4.

(13) Observat. et histor. medico-practicarum cent. III. Gorlitz. 1698. 8.

(14) Apiarium observat. medicis Crefertum. Basil-1682. 8.

(15) Paeonis et Pythagoriae exercitationes familiares etc. Basil. 1682. 8. a Gio. Nic. Binninger (1), a Fel. Platero (2), a Gio. Helwig (3), a Corr. Stalpaert van der Wyl (4), a Ricc. Morton (5), a Gio. Battista Fantoni (6) e ad altri.

Alcuni poi posero ogui studio nel raccogliere le osservazioni di alcuni medici ed anatomici; e fra essi si distinsero Giorgio Gir. Welsch (7), Giust. Schrader (8), Stefano Blancard (9), Gio. Mar. Dan. Hoffmann, e specialmente Teofilo Bonnet (10).

117. Gli sforzi di tauti soggetti aptirono il seutiero; ma solo duranțe il secolo diciottesimo s'imparò ad evitare quelle deviazioni, dove aveano errato in gran parte tutti gli antecessori, e a meglio approfitare delle sezioni dei cadaveri, donde si trassero conclusioni più giuste, riquardo allo stato precedente della malattia. Oltrecchè gli

- (1) Observationum et curationum medicinalium cent. V. Montisbelg, 1673. 8.
 - (2) Observationum selectiorum mantissa. Basil. 1680.8.
 (3) Observationes physico-medicae posthumae. Aug.
- Vindel 1680. 4.
 - (4) Observationum rariorum cent. 1. 2. Leid. 1687. 8.
 - (5) Phthisiologia in opp. tom. I.
- (6) Observat. anatomico-medicae selectiones. Aug. Taurin. 1699. 12.
- (7) Sylloge curationum et observat. medicin. Ulm. 1668. 4. -Consiliorum medicinalium cent. IV. Aug. Vindel. 1698. 4.
- (8) Obtervationum anatomico-medicarum llecades IV. Amst. 1674. 12.
 - (9) Anatomia practica rationalis. Amst. 1688. 12.
 - (10) Storia della medicina , 6 Sez. XII. S. 197.

anatonici del secolo diciassettesimo troppo amanti delle maraviglie, credevano facilmente alle favole, non attendevano che alle cose nuove e singolari, trascurando di spicgare alcune malattie ordinarie col mezzo delle aperture dei cadaveri, unicamente perchè non ne rimanevano punto appagati il desiderio o la tendenza loro ai prodigij. In olte non conoscendo interamente le leggi dell'economia animale, ammettevano per cagione delle malattie, qualunque particolarità incontravano, senza riflettere che qualche varietà può dipendere da diverse circostanze accidentali ovvero dall'agonia medesuna.

Ma i medici del passato secolo studiarono l'anatomia patologica con maggior circospezione, casttezza ed imparzialità. Gio. Maria Lancisi fu uno dei primi scrittori a quell'epoca, e le di lui ricerche sulle cagioni delle morti improvvise arricchirono grandemente la patologia (1). I medici di Breslavia, Goffir. Kıkaunig, Sam. Glass, Carlo Ochme, Mass. Preuss ed altri, cercarono di spiegare al natura dell'idrope del pericardio ed altri affezioni; col mezzo delle sezioni dei cadaveri (2); anzi il primo ci formun'opera apposita, dove espose le sue osservazioni anatomico-patologiche (3).

Ma nessun altro scrittore ha saputo raccogliere tantie sì utili risultati dalla propria esperienza, come Gio. Battista Morgagni (4), quasi espressamente formato ed educato per l'anatomia patalogica dall'ilinstre suo maestro

⁽¹⁾ De mortibus subitaneis, lib. II. Rom. 1707. 4.

⁽²⁾ Historia morborum, qui Vratislaviae grassati sunt, ed Haller. Laus. 1746. 4.

⁽³⁾ Nosocomium charitatis. Vratils. 1717. 4.

⁽⁴⁾ N. a Forli 1681. fu professore a Bologna e a. Padova, dove m. 1771.

Ant. Mar. Valsalva (1). Morgagni ha inserito nella sua opera immortale non poche osservazioni del Valsalva (a); ed ebbe pure la singolare modestia di risguardane per una continuazione o dilucidazione della compilazione di Bonnet la stesa sua opera, onore non solo d'Italia, ma del secolo intero. Ma. l'immenso tesoro delle osservazioni originali, la finezza del criterio, la vasitià dell'erulatione, dichiarano l'opera di Morgagni superiore a quelle di tutti i suoi predecessori, nè puossi dire in poche parole quanti schiarimenti ella abbia arrecato alla patologia, non che alla terapia. Mon siosa però negare, che talvolta le storie delle malattie riescano soverchiamente prolisse, e che non tutte sieno dispottenel miglior ordine per filtere devutamente a sin-

Anche Giss. Lientaud (3) intraprese un lavore, conssimile sull'anatomis patologies, La di lui, opera sembra quasi un compendio di Bonast e di Morgagni, avvegnachà contenga molte osservazioni originali (4). Ma la soverchia brevità delle milatsioni e la mancanza delle storie circostanziate delle malattie, la rendono meno profittevole di quella di Morgogni, Benà Matt Baillie, medico-nello spedale di s. Giorgio a Londra, ci fornì intorno, a questo argomento un compendio classico, pieno di nuove riflessio-

N. in Innola 1666. fu professore a Bologna, e m. del 1723.

⁽²⁾ Storia della medicina, Sez. XII. §. 196.

⁽³⁾ N. a Aix nella Provenza 1703. fu primo medico della Corte a Parigi, e mort nel 1780.

⁽⁴⁾ Historia anatomico-medica, ed Ant. Portal. vol. I. II. Paris 1767.

ni e di esattissime descrizioni anatomico-patologiche, che fu viemmaggiormente arricchito dalle aggiunte di Sum. Tomm. Soemmering (1). Crist. Fed. Ludwig professore dell' università di Lipsia, pubblicò alcuni elementi di anatomia patologica correctati di scelta letteratura (2).

Gli atti delle società accademiche contengono innumerevoli articoli riferibili allo stesso soggetto, ciui però si dedicarono in ispezialtà Cornelio Trioen (3), Lor. Heistero (4), Gio. Luig. Leb. Loesche (5), Ant. de Haen (6), Giusipi Baader (7); Sam. Clossy (8), Bern. Sig. Albi no (9), Ricc. Browne Cheston (10), Alb. d'Haller (11),

- (1) Anatomia patologica, trad, dall Ingl. Berd.
- (2) Primae lineae anatomiae patologicae. Lips. 1785.8.
 (3) Observat. medieo chururgicarum fasciculus. LB.
- 1743. 4.
 (4) Osservaz mediche, chirurgiche ed anatomiche.
- vol. 1. 2. Rostok 1753. 4.
- (5) Observat. anatomico-chirurgico-medicae rariores. Borel. 1754. 8.
- (6) Ratio medendi, tom. 1-18. Vindob. 1760. 1776. 8.
 (7) Observat. medicae incisionibus cadaverum illustratae 1762. 8.
- (8) Observations on some of the diseases of the human body. Lond. 1763. 8.
- (9) Annotationes anatomicae, lib. 1-8. L. B. 1754
- (10) Osservazioni e ricerche patologiche, trad. dall'Ingl. Gotha 1780. 8.
 - (11) Opuscula minora, vol. III. p. 277-382.

Crist. Amed. Ludwig (1), Gio. Ern. Greding (2), Massim. Stoll (3), e sopra agli altri Ed. Sandisort (4), Franc. Home (5) e Pietro Camber (6).

Semiotica patologica.

118 Fino a'nostri giorni credevasi generalmente, she soltanto i sintomi guidassero a riconossere e la sede delle malattie ed il carattere disamico delle medesime. Quindi prestossi una serupolosa attenzione ai fenoraeni morbosi, quantinuque a tovente fallaci, e quindi si calcolarono grado grado tanto più alcuni segni, quanto meno costanti e determinati sembravano gli altri. Le alterazioni del polso riasquardato come uno de' segni più importanti delle mutazioni ne'le malattie, richiemarono "a sè le considerazioni di parecchi medici nel secolo decimottavo, com' era aocaduto nella senola: Altessandrina. Forse la dottrina del polso dei Chinesi, pubblicato da Mich. Boym e da Andrettye, dette il primo motivo onde coltivare nuovamento cu nata sottigliezza questa parte della semiotica (7). Te-

⁽¹⁾ Adversaria anatomico-practica, v. 1-3. Lips.

⁽²⁾ Opere mediche. Gratz 1790. 8. v. 1. 2.

⁽³⁾ Ratio medendi, vol. 1-7. Vindöb. 1777. 1789.
(4) Observationes anatomico-pathologicae, vol. 124.

Leid. 1777. 4.
(5) Clinical experiments, histories and dissections.

⁽⁵⁾ Clinical experiments, histories and dissections.

Lond. 1781. 8.

⁽⁶⁾ Opuscoli, vol. I-III. Lipsia 1782.

⁽⁷⁾ Ephemer. nat. curios. dec. II. a IV. app.

nendo dietro alle notizie recate dai Gesuiti, si attribuì a quella nazione un grado sommo di coltura scientifica, e fra gli altri Crist. Wolf esaltò come la più sublime la morale dei Chinesi. Ma io ho già fatto vedere abbastanza nella prima parte di quest'opera, che quella nazione non ha coltivato ne fondatamente, ne scientificamente la teoria medica; e che in ispezialtà la sua dottrina del polso è sofistica, assurda ed inutile. Tuttavia le notizie di Cleyer e di Boym determinarono Gio. Floyer (1) a instituire dei confronti tra la dottrina del polso Europea e la Chinese, e a calcolare mediante un oriuolo a secondi la c elerità del polso secondo la diversità del sesso, deil'età, della maniera di vivere , e del momento, avuto specialmente riguardo alla proporzione della medesima colla velocità della respirazione ; esponendo nello stesso tempo la strana idea di osservare incessantemente: le alterazioni del polso col mezzo di un oriuolo , onde togliere in tal guisa le cagioni di si fatti cangiamenti e prolungare la vita. ...

119. La dotteina del polso acquistò una direzione totalmente diversa, a ilorche Franc. Solano de Luque Spaguuolo s'accinne a considerare il significato di certe modificazioni del polso (2). Nell'anno 1707; , quando Solano studiava ancora la medicina di Cordova sotto Gius. del. Pablo, osservò il polso dicroto. Avendo egl'interrogato il suo maestro intorno alla connessione di un tal polso collo stato interno del corpo umano vivente, ne ricevette in

STATE TO THE

⁽¹⁾ The physicians pulse-watch., 10 explain the art of feeling the pulse and to empire it by the pulse-watch, 901. 1. 2. Lond. 1707. 1710. 8.

⁽²⁾ N. a Montilla presso Cordova nel 1685, esercito la medicina in Antequera e m. del 1738.

risposta , che à fatte mutazioni insignificanti dipendono da un vapore crepitante contenuto nelle atterie (1). Una spicgazione à poco soddisfacente lo stimolò a nuove e più esatte investigazioni, dietro alle quali trovò, che queste specie di polso precede d'ordinario l'emorragia dal naso, Le numeroso esservazioni instituite da Solano sopra questo fenomeno, Gandini le ripete dalla maggior frequenza del médesimo nella Spagna e nel Portogallo (2). Solano pretende altreà, che l'epistassi segna tanto più presto al polso dieroto, quanto più si combinano fra loro le pulsazioni, e che l'emorragia diventi più -oi meno abboudante; secondoche è forte la seconda pulsazione.

Questi esperimenti lo condussero a pronesticare dal polso alcune altre evacuazioni. Il polso intermittente precede le diarrece, e se nello stesso tempo trovasi molle, vi si associa una secrezione copiosa d'orina; ovvero il vomitto, s'è duro. Anclie il sudore viene preceduto costan-temente da una singolare alterazione del polso in forra, prinezza de espansione; talchè di quattro pulsazioni l'ultima riesce la più energica. Questo polso, che chiamasi micidius, si mantiene continuamente molle, eccutio un resso d'interizia in cui mostro in vece una durezza particolare.

Solano limitò le sue osservazioni alle tre indicate specie di polso, e le compilò in un volume in foglio, pieno reppo di sottigliezze e di sofisticherie (3). Quest' opera, oltrecchò stucchevole da, leggerii, era poi divenuta sì rara

⁽¹⁾ GANDINI elementi dell'arte sfigmica, p. 122. Genova 1769. 4.

⁽²⁾ Ioi p. 172.

⁽³⁾ Lapis lydius Apollinis. Madr. 1731. fol.

al momento in cui Gandini trovavasi a Cadice, che se ne rendette indispensabile un compendio (1). Emanuele Cutierrez de los Rios (2) ne intraprese, col consenso di Solanc , il primo estratto. Egli seguì l'autore anche nella teoria, la quale generalmente è un mescuglio de principi d'Ippocrate, e di Elmonzio. Solano apparteneva alla classe dei medici osservatori ed aspettanti, i quali fondano tutte le lor lusinghe sull'ajuto della natura e nessuna su quello dell'arte Egli avea già esposto le sue massime su questo proposito in un' altra operetta, pubblicata alcuni anni addietro (3). Gandini riferisce, che Solano accennava costantemente le leggi della natura, ed inculcava fortemente ai suoi figli ed allievi di non abbandonare giammai il sentiero della medesima (4). Lo stesso autore però afferma, che Solano a forza di attenzione e di pazienza, portò a tal segno la sua abilità e finezza nella conoscenza del polso, che gli altri medici mancanti di tal pratica conon arrivarono mai per tutto il corso della lor vita a riscontrare le medesime mutazioni de l'polso.

120. Anche il compendio del mentovato de Los Rios

toter . A 19 e e site trans it en ni

⁽¹⁾ Gandini (l. c. pag. 133.) assicura di non aver potuto ottenere nemmeno un esemplare della chi hii opera dagli credi del cel. Sonano, e di esser stato perciò cotretto di ricorrere a Guttibanaza da los Riosi, il solo medico di Cadice che potesse dargiteta del impressio.

⁽²⁾ Idioma de la naturaleza, con el qual se ensen na al medico, como ha de curar los morbos agudos. Medr. 1737. 8.

⁽³⁾ Origen morboso comun'y universal, segun'ta doctrina del grande Hippocrate, Malaga 1718, 4.

⁽⁴⁾ L. c. p. 127.

sarebbe rimasto ignoto presso gli stranieri, ed il rimanente dell' Europa non avrebbe potuto approfittare delle scoperte di Solano , se Jac. Nihell , medico della Fattoria Inglese in Cadice, non avesse riputato prezzo dell' opera lo studio e la conoscenza esatta di questa nuova dottrina del polso A tal fine ei recossi ad Antequera ... dove viveva Solano. e colà si trattenne due mesi, onde acquistare dei lumi sul proposito dall'inventore medesimo. Parecchi biasimano Nihell d'aver impiegato uno spazio troppo breve di tempo per comprendere un'arte si difficile, talche non pote a meno di commettere degli errori e di mancare di sufficiente pratica del polso (1). Tuttavolta l'opera di Nihell venne tradotta in varie lingue, e contribui sopra ogn' altra a far: conoscere l'arte di Solano (2). Egli vi aggiunse i risultati delle sue proprie osservazioni, assai opportune per confermare in generale la nuova dottrina (3). Assicurar pero; che in tutti i casi non si verificarono le sue predizioni, e che Solano stesso, e Gio: de Pedraza y Castilla medico Spagnuolo rilevarono in appresso; che dal polso dicrofo annunciasi y piuttosto che l'emorragia di naso, la tendenza ch' evvi alla medesima. In oltre anche Franc.

⁽³⁾ New and entraordinary observations concerning the predictions of enies by the pulse. Lond. 1742. 8. - Observations momelles of extraordinaires sur la prédiction des crises par le pouls, trad. par Lavisotts. Paris 1748-122. Io m'attengo a questa traduzione.

⁽³⁾ La cap. 94 95. Autrente is

Sibbern , medico Danese , provò che il polso dicroto non

sempre precede l'epistassi (1).

In Francia il cel. Pietro Senae (2) e in Inghilterra Mile. Flemyng (3) furono i primi difensori della dottrina di Solano. Il primo però asserisce essere estremamente dificile da riconoscersi il polso ascendente (..inciduus).

121. La dottrina del polso andò prendendo una direzione affatto singolare, allorchè Teof, de Borden, autore 'd' un sistema particolare di medicina già mentovato più sopra (Sez. XV. S. 47.), esaminó più attentamente i pronostici di Solano. Se, come riflette il medico Spagnuolo , fosse vero , che l'eccitamento di certi organi occasionasse speciali mutazioni nel polso, ciò apporterebbe un singolare appoggio al sistema di Bordeu che attribuisce a ciascun organo una distinta forza vitale. In oltre, siccome Borden medesimo, secondo le adottate modificazioni dello Stahlianismo, risguarda ogni malattia per un conato della natura tendente a separare le sostanze originarie, concepì naturalmente l'idea, che ciascun organo possa in un modo affatto particolare produrre qualche cangiamento nel polso; opinione fondata sulle stravagantssime ipotesi dei Chinesi, Quindi la sfigmologia di Bordeu non è che una modificazione raffinata del sistema del polso di quella nazione. Bordeu deviò in molti punti principali dalla dottrina Solano, massime rapporto al polso dicroto, ch' egli s' immaginò d' aver riscontrato anche precedentemente allo sviluppo della mestruazione e del flusso emorroidale (4).

⁽¹⁾ Tode bibliot. medica vol. III. facs. 2. p. 179.

⁽²⁾ Dissertation sur les crises. Paris 1752. 12.

⁽³⁾ Diss. sur les decouvertes de Franç. Solano. Londres 1773. 8.

⁽⁴⁾ Recherches sur le pouls par rapport aux crises, tom: I. p. 256. Paris 1798. 8.

Nego altrei), che i movimenti de gl'intestini nelle diarree sieno costantemente accompagnati da polso intermittente, e rigetto la prognosi di Solano, che presagì il vomito dal polso duro remittente (1).

Le difficoltà di esaminare il polso col metodo dello

Spagnuolo erano di gran lunga inferiori a quelle che s'incontravano col metodo di Bordeu. Qusti supponeva nell'arteria uno spazio pulsante, e servivasi di tutte le quattro dita d'ambe le mani per sentire il polso in tutti e due i carpi. Egli applicava tutte le quattro dita strettamente unite tra loro all' arteria, in maniera che non rimanesse alcun interstizio tra gli apici delle dita medesime. Solamente il polso critico doveva essere toccato con due dita; ma per conoscere le altre specie di polso, d' uopo era impiegare tutte le quattro dita. La necessità di sentire il polso in amendue le braccia dipendeva nel sistema di Borden dalla divisione del corpo in due metà, mediante la linea bianca. Quindi nell' emicrania e nell' emiplegia attenevasi al polso della parte affetta (2). Borden inculca premurosamente la pazienza nell'osservare il polso, e pretende che richiedasi almeno il tempo di 40, pulsazioni per giudicare di alcune alterazioni del polso remittente (3). Ogni qualvolta si tocca l'arteria, conviene alzare alternativamente le dita e ptemerle nuovamente sopra l'arteria. E' indispensabile la più grande e decisa attenzione del medico, per distinguere tutte le mutazioni e modificazioni del polso.

122. Bordeu distinse in ogni malattia il tempo dell' ir-

⁽¹⁾ Iri p. 77. 88.

⁽²⁾ Ivi p. 337.

⁽³⁾ Ivi. - GANDINI. l. c. p. 198.

ritazione da quello della cosione. E l'uno e l'altro stato à contrassegnato da un polso particolare; sicchè il polso può dividersi generalmente in critico, de acritico, ossia anche organico, perchè indica l'affezione d'un organo determinato. Il primo comparisce più sviluppato, più libero, più espanso e più molle; il secondo più ristretto, convulsivo e contratto (1) La complicazione di tali qualità prenuncia la suppurazione (2). Anche nei fanciulli e nei vecchi riscontransi sovente dei polsi; che nemmeno il più attento osservatore può decidere, se sieno critici, acritici, o misti (3).

Bordeu distingue nuovamente due polsi critièi, secondo la situazione degli organi posti o sotto o sopra il diaframma, dando al primo il nome di polso ioferiore, e al secondo di superiore. Ambidue differissono tra loro, perchè il primo è d'ordinario ineguale e somigliante al, remittente, il secondo poi batte due volte (4); la qual regola tuttavia soffre alcune eccezioni. Si danno tre generi di polso superiore, pettorale, guturtale e nasale, i quali non differiscono tra loro che pel diverso grado di mollestan, e di energia. Il più molle e regolare è il pettorale, cui segue il gutturale, mentre all'incontro il nasale supera in forza, durezza e velocità gli altri due (5). Il polso inferiore, se è duro produce il vomito; se dicroto, l'emorroro, se e duro produce il vomito; se dicroto, l'emorroroidi; se remittente, le diarree (9). In oltre è meno molle

⁽¹⁾ Ivi p. 18. 199. 215.

⁽²⁾ Ivi p. 288.

⁽³⁾ Ivi tom. II. p. 128.

⁽⁴⁾ Ivi p. 23. 24. 68.

⁽⁵⁾ Ivi p. 28-40.

⁽⁶⁾ Ivi p. 72. 81. 182.

del supériore, e talvolta si dura fatica a distinguerlo dal polso d'irritazione (1), quantunque l'intestinale non mostri mai alcuna tensione (2); contraddizione, che s'incontra anche nel confronto tra il polso pettorale di Bordeu e il gastrico che precede il vomito; poichè e l' uno el'altro battono due volte, hanno un' eguale durezza e s' avvicinano al polso d'irritazione (3). Bordeu descrive assai oscuramente il polso renale, cioè quello che prenuncia l' evacuazione orinaria, e dice ch' è il contrario del polso sudorifero o sudatorio. Siccome poi questo non s'allontana punto dal polso ascendente (inciduus) di Solano, perciò il polso dell'orina sarà discendente (myurus) (4). 123, Borden descrive minutamente il polso, quale spie-

gasi in diversi stati del corpo e in diverse malattie, non che gli effetti operati sul medesimo dai medicamenti. Per esempio durante la gravidanza il polso nei primi tre mesi è mutabite e sovente febbrile, il più delle volte gastrico. ed in progresso anche nasale, senza significare perciò una reale epistassi. Al momento della mestruazione si raddoppia e'diventa uterino (5), che si distingue dall' intestinale puramente per mancanza d'intermissione, per maggiore sviluppamento e per la doppia sua pulsazione (6). Per altro in innumerevoli casi di stato morboso, il polso trovasi composto o complicato. I polsi superiori si combina-

⁽¹⁾ Ioi p. 74. (2) Ivi p. 100.

⁽³⁾ loi p. 77.

⁽⁴⁾ Ivi p. 135.

⁽⁵⁾ Ivi tom. II. p. 29.

⁽⁶⁾ Ivi tom. I. p. 100.

no cogli inferiori, i critici cogli acritici. Questi ultimi non sono da temersi nel primo stadio delle malattie acute, ma pinttosto nel successivo andamento delle medeisme (1). Borden non ha esaminato attentamente l'azione dei medicamenti sul polso, e per convincersene basta riflettere all'indole del polso supposta dopo l'uso dell'oppio, il quale è, secondo lui, sviluppato, molle, sudatorio, e consimile a quello di chi giace in un sonno profondo (3).

124. Michel fu uno dei primi partigiani del nuovo situana dei polisi, vantò l'infallibilità dei pronostici di Bordeu, accusò la teoria mecenonica qual corrusione della medicina, e rigettò come inutile e ridicola l'ordinaria maniera di toccare il polso (3). Cli tenne dietro l'inglese Cox, il quale spiego l'importanza del polso remitiente nel predire le diarree, e nell'indicare il vero uso degli evacuanti (4). All'incontro Gio. L. Boche (5) e Franc. Gartia Hernandez (6), amendue Spagnuoli, s' attennero alla dottrina di Solano, il primo per impulso del celebre critico Feyjoò, il secondo perche trovo che i giorni critici si manifestino sovente dopo il salasso. Parimenti Menuret, autore dell'articolo Pouls nell'Enciclopedia (*), abbrac-

⁽¹⁾ loi p. 233. 260.

⁽²⁾ Ivi tom. II. p. 107.

⁽³⁾ Nouvelles observations sur le pouls par rapport aux crises. Paris 1757. 8.

⁽⁴⁾ Nouvelles observations sur le pouls intermittent.

Amst. 1760. 8.

⁽⁵⁾ Nuevas y raras observationes para prognosticar las crises por el pulso. Madr. 1763. 4.

⁽⁶⁾ Doctrina de Solano aclarada. Madr. 1765. 4.

^(*) Stampato poi a parte: Nouveau trailé du pouls. Parts 1768. 12.

ciò le idee di Solano e di Bordeu, e cercò di far dipendere qualisia cangiamento nel polso dall'influenza di ciasenu organo i immaginandosi delle corde, le quali partendo dagli organi medesimi, si distribuiscono per le arterie della superficie, e loro comunicano Io stato condizionale dell'organo rispettivo.

125. Eur. Fouquet si rendette sopra ogn' altro benemerito del imovo sistema (1). Egli determino più esattamente le differenze dei polsi , e le rappresentò perfino in disegno. Codeste tavole però sembrano puramente ideali, peroccliè indicano eminenze e incisioni nelle pareti delle arterie, e mostrano la sortita de' globuli sanguigni dall'arteria durante il polso nasale, uterino, ed emorroidale in guisa, che il tatto non può riconoscere giammai con certezza si fatte diversite. Da Fouquet si divide il polso critico in tre diverse modificazioni. Nella prima esso indica il primo grado della cozione, ed è forte, sviluppato, frequente e molle. La seconda poi caratterizza la vera crisi, ha maggior mollezza, e si solleva con molta irregolarità. Consiste la terza modificazione nella vera evacuazione accompagnata, da un polso violento, che desume il suo carattere dall' organo secretorio, per cui si sente il passaggio de'globetti sanguigni dallo spazio pulsante verso l'estremità dell'arteria nel carpo (2) Biasima quindi Bordon di non avere distinto a dovere il polso dicroto (rebodissant) dal raddoppiato (redouble) , ch' è diverso interamente dal cefalico, d'ordinario duro e serpeggiante (3).

⁽¹⁾ Essai sur le pouls par rapport aux affections des principaux organes. Montp. 1767. 8.

⁽²⁾ loi p. 45.

⁽³⁾ Ivi p. 54. 65-

Fouquet considera i polsi inferiori, come più contratti, ristretti e deboli de superiori. Per altro a gran per na puossi distinguere il polso emorroidale dal pettorale, e questi dal cutaneo che indica il sudore, e dal renale che precede l'escrezioni urrinose. Il polso intestinale non differisce punto dall' ascitico, e à assomiglia all'oscillazione d'una corda di ottone (1). Nelle tavole il polso splenico manifesta alcuni caratteri ben diversi da quelli dell'epatico (2), ma chi potrà mai sentire e riconoscere colle dita tutte que de differenze ?, Finalmente Fouquet rammenta altrenì il polso sollevato o sviluppato, il polso ristretto, contratto, acritico (3).

Carlo Gandini nella sua opera voluminosa ha compi lato alcune pregevoli notizie ed opinioni de suoi predecessori, senza inscritvi però alcuna sua riflessione. Più utile riuscità uel proposito l'opera di G. C. Wetsch (4), il quale volle apprendere la sfigmica dallo stesso Bordeu.

126. Fed. N. Marquet rinovando le antiche idee di Erofilo, confrentò il polso coi tuoni musicali (5). Egli risguardò il polso normale come un minuetto, ed ogni pulsazione come un passo o una cadenza. Trovò la maniera di esprimere in note simili a quelle della musica, con linee orizzontali le une sopra le altre, il polso normale,

⁽¹⁾ Ioi p. 76. 88. 92.

⁽²⁾ Ivi p. 81. (3) Ivi p. 40.

⁽³⁾ In p. 40.

⁽⁴⁾ Medicina ex pulsu. Vindob. 1770. 8.

⁽⁵⁾ Nouvelle méthodo facile et curicuse pour connoitre le pouls par les notes de la musique, lec. éd Paris 1769. 12...

il ristretto, l'espanso, il vermicolare, il concentrato, il profondo, l' elevato, il superficiale. Rappresentò la celerità del polso, dividendo per mezzo di linee perpendicolari ciascun ritmo in cinque tempi, ed indicando le differenze d'ogni specie. Ma tali illustrazioni non promossero punto le vere cognizioni d'un ramo sì importante della sémiotica.

Le osservazioni di Des Brest sul pronostico dell' epistassi dal polso dicroto (1), contribuirono a confermare la nuova dottrina del polso di Solano e di Bordeu (2): Mirarono allo stesso scopo quelle di Balme, di Strack e di Dubosc de la Robordiere sopra tutta la sfigmica (3), di Poma sul polso iutestinale (4), di La Brousse sul polso delle gravide (5), e di Delius sul polso dicroto, remitiente ed ascendente (6). Anche Kaempf sostenne qual punto di pratica, che l'espettorazioni critiche si annunziano generalmente dal polso dicroto, i sudori dal polso ascendente, e le diarree dal remittente (7).

127. Tuttavolta ogni osservatore imparziale dovea ben presto avvedersi della fallacia di tutta la sfigmica di Bordeu. Zimmermann combatte la dottrina di Solano, e fcce vedere, quanto incerti fosscro i significati delle specie dei polsi supposte dallo Spagnuolo (8); e de Haen si dichia-

(2) Ivi tom. XXXVI. p. 134.

(4) Journ. de médec. tom, 41. p. 433.

⁽¹⁾ Journal de médicine , tom. XV. p. 312.

⁽³⁾ GANDINI, p. 288. Journal. de méd. tom. 37. p. 23. tom. 39. p. 409.

⁽⁵⁾ Tot tom. 36. p. 121. tom. 41. p. 436. (6) Del polso remettente. Erlangen 1784, 8.

⁽⁷⁾ Trattato di un nuovo metodo ec. p. 54 55.

⁽⁵⁾ Dell' esperienza , p. 202.

rò apertamente contro questa novità, parte adducendo altri pronostici dallo stesso polso, parte derivando l'origine di questi polsi organici dal turbamento delle forze naturali, cagionato dall'erroneo trattamento (1). Soleilhet (2). La Marque e Lepécy de la Clòture (3) accusarono De Hacu di essersi cantraddetto, avendo egli' pronosticata una diarrea dal polso remittente, secondo i principi di Solano (4). Anche Pezold (5) e Gruner (6) apprezzarono poco la sfigmica di Borden, e Renard, medico Parigino, lascio un opera incidit contro il nuovo sistema (7).

128. Mi rimane da far menzione d'un altro segno patologico risguardato dall'inventore Leopoldo Auenbrugger,
come uno de più importanti per la conoscenza dello stato
morboso. Quest'è il suono che si sente, allorquando si
batte il torace. Gertamente quando i polmoni si troyaru liberi, molli e sani, esso sarà ben diverso da quello, che
si udisà quando avrauno delle adercuze, o ridonderaumo
di unori, o sarauno esulcerati. Auenbrugger espose circostanziatamente e possitivamente questa verifi in un' apposita dissertazione (8). Sembra però incredibile, che tutti

⁽¹⁾ Rat. med. P. XII. p. 112.

⁽²⁾ Epistola ad clare Roux, in lat. ling. versa a Jos. Huttenbacher. Vindob. 1770, 8.

⁽³⁾ Istrusione pei medici per osservare le malattie epidemiche, p. 76.

⁽⁴⁾ Rat. med. P. V. p. 219.

⁽⁵⁾ De prognosi in febr. acut. p. 72.

⁽⁶⁾ Semiotice, p. 173.

⁽⁷⁾ GANDINE, p. 284.

⁽⁸⁾ Inventum nonum ex percussione thoracis humans, us signor obstrusos interni pectoris morbos detegendi. Vindob. 1761. 8.

i singoli viri dei polmoni e del torace si possano distinguere mediante l'accennato, suono. Tuttavia meritano desser lette le sue osservazioni state di poi confermate in granparte da Isenfiamva (1).

e) Nosologie.

129. Gli antichi non riputarono necessario di trattare le malattie secondo un determinato ordine : e durante tutto il medio evo non si ebbe riguardo che alla situazione delle parti. Ho già indicato altrove (2), che Felice Platero fu il primo ad immaginare un sistema nosologico, fondandolo sui sintomi predominanti; tentativo assai imperfetto ed unico, fino al principio del passato secolo. Intanto, merce la tendenza generale all' osservazione, erasi talmente aumentato il numero delle malattie e delle differenti forme delle medesime, che si conobbe assai utile all'istruzione l'introdurre un ordine sistematico nella patologia. Tommaso Sydenham, mentre biasimava le nosologie ipotetiche dei chimiatrici, additava per modello l' esempio dei botanici, i quali sogliono distribuire e dividere le piante secondo certe apparenze e qualità esteriori (3).

Nulla ostante l'autorità di Sydenham non valse che dopo il corso di sessant anni a muovere il rinomato Franc. Boissier de Sauvages, per concepire un sistema nosologico

⁽¹⁾ De difficilis in observat. anatom. epicrisi, diss. Erl. 1773. 4.

⁽²⁾ Storia della medicina, tom. V. Ses. VIII.

⁽³⁾ Opp. p. 26.

analogo a que' principi, il quale, siccome frutto piuttosto della diligenza che del genio, o piuttosto dell' immensa erudizione, che del più fine criterio, meritossi una celebrità straordinaria, attesa la sua perfezione ed universalità (1). Sauvages per la nomenclatura e classificazione imita il creatore Svezzese della storia-naturale, e segue generalmente la filosofia di Wolfio ed il piano sistematico dei Jatromatematici. Egli stabilisce la divisione fondamentale delle malattie in vizi locali, e in istati morbosi universali. Classifica poi questi ultimi secon lo i sintomi predominanti in febbri, infiammazioni, spasmi, anelazioni, debolezze, dolori , anelazioni mentali , profluvi e cachessie. Cotesta divisione sarebbe suscettibile d'una rettificazione, se le anelazioni non costituissero una classe cvidentemente inutile , poiche appartengono parte agli spasmi, parte alle debolezze. In oltre Sauvages enunciando le specie delle malattie principali , anzichè ai rapporti dinamici, tien dictro ai fenomeni accidentali o alle condizioni rimote esterne. Ecco quindi un' amphimerina Hungarlea , un' amphimerina paludosa , una tritacophya Vratislaviensis', nna convulsio Indica, e simili ; distinzioni appoggiate alle osservazioni di altri medici, 'i quali sòvente non meritano veruna credenza. Nulladimeno dev' essere encomiata e stimata quest' opera come il primo tentativo e come la prima collezione sistematica di tutte le diverse forme del malessere.

130. Anche lo spirito sistematico di Linneo , seguendo l'esempio di Sauvages, cerco di fornire un piano nosologico (2), che riesce, a dir vero, troppo strano per

⁽¹⁾ Nosologia methodica, vol. 1. 2. Amst. 1768. 8.

⁽²⁾ Genera morbum in Amoenit. acad. vol. VI. p. 452.

le idee originali che propose sull'origine e divisione delle malattie, e che fondò non sull'esperienza, ma sonra il confronto della struttura degli animali con quella dei vegetabili. Linneo distingueva ne' corpi animali e vegetabili una sostanza midollare ed un'altra corticale, la prima destinata a contenere la vera sede della vita, la seconda a preparare gli umori. Il fluido della corteccia animale, da cui si formano i solidi, viene distrutto dalla putrefazione é dagli acidi. Quando il principio della sensazione e del moto resiste a queste cause distruttrici, nasce la febbre, la quale è critica se il contagio apparisce acidulo, flogistica se putrido, ed esantematica se vivente. Linneo opina, che tutte le affezioni cutance contagiose sieno cagionate da insetti e da vermi (1). Divide le malattie apiretiche in nervose e in miste, cioè dipendenti dai vizi dei solidi e dei fluidi insieme. Finalmente vi unisce anche i vizi esterni, fra i quali riseontransi alcune specie assai singolari, Chramasi arctura l'insinuazione delle unghie accompagnata da esulcerazione, e glus quella malattia, în cui si evacua un' orina viscosa, e simili.

La nosologia di Rod. Agost. Vogel sembra più title e e più lontana da ogni sofisticheria (2). Egli ammette noive claisi di malatuie: cioù febbri , profuvi), ritenzioni , dolori , convulsioni , debolezze: prerestesi) che si riducano a dolori (, cachessie e patemi di animo. Dav. Macbride noi vi ha fatto alcun' altra differenza ; fuorobi

⁽¹⁾ Exanthemata viva , ibid. vol. V. p. 92.

⁽²⁾ Diss. definitiones generum morbórum. Gotting. 1764. 4. - Academicae praelectiones de cognoscendis et curandis praecipuis corpóris humani defectibus. Gotting. 1772. 8.

quella di annoverare questi ultimi fra le malattie locali, e di frammischiarvi alcune forme morbose che assolutari mente non appartengono alla stessa, categoria, p. e. la ebbra (t). In oltre egli forma una classe particolare delle malattie asmatiche. Divide le febbri generalmente secondo il tipo, e partitamente secondo il tipo, e partitamente secondo.

Gio. Battista Mich. Sagar cercò di superare il sistema di Sanvages col maggio; numero di sintoni da sò enupciati come altrettante malattie (2). Conservò tintavia quasi la stessa divisione in dodici classi, cioci vizi locali, esantemi, cachessie, dolori, profluvi, ritenzioni, anelazioni, convulsioni, debolezze, infiammazioni, febbri e patemi d'animo; e-sotto queste vengono compresi 340. generi, mentre Sanvages non ne annoverò che 315.

131. Cullen procurò di meritarsi altrimenti gli elogdel pubblico medico in questo argomento. Ridotte le malattie a 149. generi li distribuì sotto quattro classi principali che sono le piressie, le uevrosi, le cachessie e i
vizi locali (3). Divide poscia le piressie in febbri , infiammazioni, esantemi, emorragie ed altri profluyi el nevrosi in apoplessie, debolezze; convusioni e patemi d'auimo; le cachessie in estemazioni , tumori e impetigini; i
vizi locali in difetti di scusazione e di moto, in eyacua
zioni , ritenzioni, intumescenze, ectopie (ernie, prolassi,
lussazioni) e dialisi (soluzioni del continuo). Il maggior
votto si riscontra nella suddivisione delle specie; percioc-

⁽¹⁾ A methodical introduction to the theory and practice of physic. vol. 1: 2. Lond. 1772. 4.

⁽²⁾ Systema morborum symptomaticum. Vienn. 1771.8

⁽³⁾ Synopsis nosologiae methodicae, vol. 1, 2. Edinb.

che fra le soluzioni del continuo Cullen annovera l'erpete, fra le cacchesis generali il pians, fra i vid locali l'iscuria, fra le malstite universali l'idrocele, fra le convulsioni il diabete, ec. Ad onta di tali manenare la nosologia di Cullen venne quasi universalmente adottata con alcune modificazioni, e servì specialmente di fondamento a molti conpendj di patologia e di medicina pratica.

Bensì originale, ed anco lodevole fu il tentativo, con cui cercò di rendersi benemerito della nosologia Crist. Fed. Daniel (1), avendo stabilito per foudamento la distinzione che ammettevano gli antichi tra l a malattia (vocos) e la passione («aJos) (2). Diede il nome di malattia. come Galeno, a quello stato interno del corpo, da cui rimangono lese le funzioni; e di passione al concorso de sintomi, i quali costituiscono la forma del malessere. Non soddisfa però ne l'enumerazione di questi ultimi, ne la determinazione delle malattie principali, d'onde traggono origine tutte le passioni. Ecco la di lui classificazione: Nevrosis , sepsis , saburra , plethora , pyogenia , catarrheuma , cachexia , conjunctio , dystrophia , ectopiae , e malattie anonime: Egli considera come parti essenziali delle malattie principali dei fenomeni accidentali, gli stravasi biliosi', le suppurazioni, il fetore delle materie escrementizie. Stabilisce per carattere della congiunzione il condensamento degli umori, e fa dipendere dalla stessa la costituzione atrabiliare, l'artritide e i calcoli. Distingue la distrofia dalla cachessia, poiche comprende souto la

⁽¹⁾ Systema aegritudinum, vol. 1. 2. Lips. ct Hal. 1781. 1782. 8.

⁽²⁾ Storia della medicina, tom. II. Sez. IV. S. 78.

prima unicamente i sarcomi, le serolole e i tumori scirrosi. Finalmente ammette nella classe delle malalite ancnime le ferite, gli avvelenamenti, i vizi della forma ed altre malattie, in quanto che contengono il fondamento di certe passioni. Di fatto codesta classificazione, oltrechè mancante di logica, offre una serie quasi immaginaria di passioni desunte o capricciosamente o senza critica dagli altri scrittori,

Del sistema di Van. den Heuvel ho già fatto menzione altrove (Sez. XV. S. 120.)

C

Storia dell' inoculazione del vajuolo.

132. Ecco uno degli oggetti più importanti e più talutari delle ricerche, empiriche di questi, ultimi tempi ; ecco un ioggetto,, dove si potrà scorgere apertamente, quanto influsiscano i pregiudizi per arrestare i progressi della verità ; e quante volte abbia pregiudicato il soverchio relo di promuoverla. — La qualità dell' argomento mi obbliga a dividerlo in diverse sezioni.

a) Prime tracce dell'innesto sajueloso in Europa e fuori.

133. In alcuni paesi manteucvasi fino da tempo immemorabile l'uso di suscitare a bella posta ne bambini il vajuolo , ogiti qualvolta sviluppavasene l'epidemia : poiche l'esperienza avera insegnato, che questo vajuolo artificiale riusciva sempre l'indole più benigna di quello che manifestavasi naturalmente e spontanoamente.

Il missionario d'Enttrcolles ci diede la prima notizia del mondo onde viene eseguito nella China, già da molti secoli , l' innesto del vajuolo (1). Si prende della crosta ancor umida di marcia dalle pustole vajuolose, e dopo una preparazione particolare, si cerca d'insinuarla nel naso dei fanciulli dai tre anni fino ai sei, e a questo metodo si dice seminare il vajuolo. Gli stessi Chinesi confessano, che l'esito non sempre vi corrisponde (2); e i medici Inglesi , i quali per ordine del re fecero degl' innesti sopra alcuni malfattori di Newgate nel 1721., trovarono che il metodo de' Greci è accompagnato da minori peticoli (3). Tuttavia i vantaggi dell' inoculazione Chinese erano talmente considerevoli, proporzionatamente al vajuolo naturale, che i Tartari procusaronsi degl' inoculatori chinesi , per prevenire ne'loro figli l'infezion naturale (4).

Anche nell'India l'inoculazione era praticata da tempo immemorabile. I Brammani , i quali risguardano la medicina qual prerogativa del loro ordine, esercitano quest'arte in certe stagioni , andando in giro con della bambagia imbevuta di materia vajuolosa, ed iunestandofa sulle braccia dei fanciulli dopo di averli preparati con qualche attienza dai cibi (5). Altri asseriscono, ph'eglino faccianio passare attraverso la cute dei fili di seta egualmente carichi del medesimo velono (6). ³

⁽¹⁾ Lettres edifiantes et curicuses, tom. XXI., p. 5.
(2) Ivi p. 26.

⁽³⁾ LESKE estr. delle Transaz. filosof. v. IV. p. 311.

⁽⁴⁾ Lettres edifiantes l. c. p. 11.

⁽⁵⁾ HOLWELL presso Woodville hystory of the inoculation of the small pox , p. 56. Lond. 1796. 8.

⁽⁶⁾ CHAIS essai apologetique de inoculation, p. 122. Haye 1754. 8.

Patr. Russell rilevò in Harem che gli Arabi tenevano fin anche commercio di materia vajuolosa. Essi solevano innestare con un ago ordinario, e ricevevano in compenso dell' uva-passa, dei fichi ed altre minuzie (1). Fino da' tempi più rimoti gli abitanti della Giorgia e della Circassia praticavano l'inoculazione; e siccome lo scopo principale era quello di conservare la bellezza delle fanciulle, l'operazione veniva affidata a donne provette, che vi frammischiavano infinite cerimonie superstiziose. Aubry de la Motraye (2) osservò nel 1712. questo metodo a Degliad villaggio della Giorgia. L'inoculatrice faceva delle punture con tre aghi in diverse parti del corpo, all' epigastrio, alla region del cuore, all' ombellico, nel carpo della mano destra e sul dorso del piede sinistro fino a tanto che sortiva del sangue; col quale mescolava della marcia vajuolosa; poscia legava la ferita sovrapponendovi delle foglie di angelica e dei pezzi di pergamena. Il vajuolo compariva in capo a sette giorni.

i 34. Una pratica consimile era adottata anche nella Barbaria, di che ci assicurarono, l'inviato di Tripoli in Londra, Kassen Aga (3), e lo stesso Tomm. Shaw (4). Per altro i crudeli Maomettani la biasimavano, perchè la riputavano contraria ai destini della provvidenza, Secondo

⁽¹⁾ Philosoph. transact. vol. LVI. p. 140.

⁽²⁾ Voyages en Europe, Asie et Afrique, vol. II.

⁽³⁾ SCHEDGIZER'S account of the success of inoculating the small-pox in Great-Britain. Lond. 1729. 8. – MONTUELS requeil de pièces sur l'inoculation, p. 138. Paris 1756. 8.

⁽⁴⁾ Travels , p. 265. 1738 Oxford, fot.

la testimonianza di Cad. Colden, quest usanza è comune da lunghissimo tempo anche nel Senegal (1).

Parimenti alcuni paesi d'Europa conoscevano l'innesto del vainalo, avanti l'introduzione del metodo Greco. Sim. Schulze lo riscontrò fin dal secolo decimosattimo a Thorn (3), Tomm. Bortolino nella Danimarca (3), Tomm. Schwencke a Meurs e Cleves (4). Condamine lo sostiemantichissimo nell'Alvernia e a Perigord (5). Ed Aless. Monro tiferice, che eli abitanti dell'alta Soozia eseguiscono l'inoculazione con filamenti di lana imbevuti di materia vajnolosa ed applicati al carpo della miano (5); metodo comunissimo nella parte meridionale del principato di Gallos, come asseriscono i medici di quel paese, Rice. Wright e Perr. Williams (7). Primieramente si raschiava la pelle con un coltello, e postja si fregava sopra il oriza vajnoloso.

735. Una sì rozza pratica dell'inoculazione era usitata specialmente nella Grecia, dove sembra introdotta originariamente, azichè colà trasportatavi dalla Giorgia. Car-

- (1) Medical observat. and inquir. v. I. p. 227.
- (2) Ephemer. nat. curios. dec. I. a. 8. obs. 15.
- (3) De medie. Danor. domest. p. 305. Hafn. 1665. 8. Diss. de transpaltatione morborum, ib. 1673. 4.
 - (4) Recueil des pieces importantes sur l'inoculation, p. 103-117. Gaye 1755: 8.
 - p. 103-117. Gaye-1755. 8.
 (5) Mêm. de l'academ. des scienc. à Paris, a. 1758.
- p. 722.

 (6) Notizie dell'innesto del vajuolo nella Scozia, trad. dall'Ingl. Alt. 1766. 8.
- (7) Philos. transact. vol. 32. p. 262. Monthelas recueil, p. 69. 72.

buri di Cefalonia, professore a Torino, afferma che quest' operazione viene esercitata nella sua patria fino dal 1537. (1); e Gio. Porter ministro d' Inghilterra a Costantinopoli è d'avviso, che tal pratica sia stata recata a Costantinopoli dalla Morea e non dalla Giorgia (2). Certo è che al principio del secolo passato i Greci di Costantinopoli l'aveano tutti generalmente adottata, e ne fornirono contemporaneamente delle notizie Emman. Timoni medico in Costantinopoli (3), Jac. Pilarini console veneto a Smirne (4), Sain Skraggenstierna medico alla corte di Svezia (5). Eglino convennero nel riferire, che l'esercizio di quest'arte era riservato alle donne provette e specialmente ad nna vecchia della Tessaglia, la quale asseriva esserle stata rivelata da Maria Vergine, eseguiva un' incisione gruciforme sulla fronte, o sulle guancie o sul mento, ed esigeva delle candelle, di cera col pretesto di tributo alla stessa Vergine Maria. Ella vantavasi d'avergià eseguite più di 40,000, inoculazioni, scieglieva diligentemente la marcia del vajuolo benigno, non innestava che i fanciulli i più sani nell'inverno o verso il principio della primavera. Fra tanti innestati, che i lodati soggetti ebbero occasione di osservare , nessuno mori , ammenoche taluno di essi non sia stato colto contemporanca-

⁽¹⁾ CONDAMINE 1. c. p. 721.

⁽²⁾ LESKE estr. dalle transaz. filosof. v. IV. p. 243.

⁽³⁾ Acta crudit. Lips. ann. 1714. p. 282. - LESEE estr. dalle trans. filosof. vol. I. p. 323. - MONTUCLIS recueil, p. 8.

⁽⁴⁾ Ephem. nat. curios, cent. V. VI. app. p. 13.

⁽⁵⁾ Ivi obs. 2. p. 3.

mente dal vajuolo naturale spontanco. Si trovò poi inutile l'usanza dell'inoculatrice Tessala di sovraporre alla ferita dell'innesto mezza noce.

Poco appresso anche Ant. le Duc (1) e Gio. Kennedy (2) descrissero questo stesso metodo d'inoculazione, come praticavasi in Costantinopoli. Il secondo assicuro, che di 2000. innestati ne moritorio appena due, ed il primo derivò questa leggiera mortalità dalla scelta degl' individui, dalla stagione e dalla rarità delle pustole. Nel 1731. De la Condamine trovò in uso tra i Franchi di Costantinopoli il metodo acceimato da Timoni e da Pilazini (3). Fin dal 1717, un certo dott. Boyer, membro della facoltà di Monpellieri, appoggio fasorevolmente in una pubblica disputa l'inoculazione orientale (4); e Jac. a Castro suggerì di fare l'ingisioni dell'innesto non sulla faccia, ma in altre parti del corpo (5). Gnalt, Harris, raccomandò i fill imbevut di materia vajuolosa; ed apprezzò egualmente il descritto metodo dei Greci (6).

⁽¹⁾ Dissert in novam methodum inoculationis variolorum. LB. 1722. 8.

⁽²⁾ Essay on extesnal remedies. Lond. 1715. 8.

⁽³⁾ Mêm de l'academ. des scienc. à Paris, a. 1732. p. 435.

⁽⁴⁾ Mem. de l'acad, des scienc. à Paris a. 1758. p. 725.

⁽⁵⁾ Dissertationes in novam methodum. N. 26.

⁽⁶⁾ De peste, cui accessit descriptio inoculationis variolarum. Lond. 1721: 8.

b) Perfezionamento e vicende dell'inoculazione da Maitlant fino a Gatti, cioè dal 1721. fino al 1760.

136. Una dama rispettabile e spiritosa, la moglie del ministro Inglese presso la sublime Porta, Lady Worthly Montague occupa nella storia della medicina un luogo ragguardevole per aver, prima d'ognaltro, introdotto e perfezionato il metodo greco dell'inoculazione nell' Inghilterra. Mentre trovavasi ancora a Costantinopoli (1717) , fece innestare dalla vecchia della Tessaglia un suo figlio dell' età già di sei anni. L' operazione, siccome eseguita assai rozzamente , cagionò molti dolori al fanciullo ; e fu d' uopo che il chirurgo dell'amabasciata Maitland la rinnovasse co' suoi propri istrumenti. Comparvero nell'innestato circa cento pustole, le quali svanirono poi felicemente (1). Appena ripatristo l'ambasciatore con tutta la sua famiglia, Lady Muntague approfittò di tutta la influenza per introdurre l'inoculazione. Nel mese di aprile del 1721, ella stessa ne diede il primo esempio facendo innestare senz' alcuna preventiva disposizione, dallo stesso Maitland la sua figlia, dipoi contessa Bute (2). Parlò poi estesamente e fondatamente del nuovo ritrovato nelle sue famose lettere (3). Il secondo innesto d' Europa cedde sul figlio del dott. Keith e non di Shadwell , come suppose Condamine (4).

⁽¹⁾ MAITLANT account of inoculatingthe small-pox, p. 7. Lond. 1722. 8.

⁽²⁾ WOODWILLE, l. c. p. 89.

⁽³⁾ Letters, written during her travels in Europe, Asia and Africa, vol. II. lett. 31. Lond. 1763. 12.

⁽⁴⁾ WOODWILLE 1. c.

Sì fatti esempi, che ottennero il più favorevole sucsesso, attrassero l'attenzione della famiglia reale sopra un sì potente preservativo, tanto più che allora appunto regnava per Londra il vajuolo, e la principessa Anna, dipoi duchessa d' Orange, trovavasi allora gravemente ammalata dello stesso esantema, La principessa di Gales, che fu dipoi la regina Carolina, sua madre, volendo provvedere alla salute delle altre sue figlie , ottenne dal re di far istituire dell' esperienze coll' innesto del vajuolo, sopra sei malfattori detenuti a Newgate. Ilans Sloane, medico del re e direttore di tali esperimenti, scrisse primieramente a Terry medico in Endfield , stato per l'addictro in Turchia, per intendere il di lui parcre. Terry lo assicurò, che in Levante il metodo riesce si felicemente, che di Soo. innestati ne muore appena uno. Maitlando dunque intraprese a'20 di Agosto del 1721. l'operazione sugli accennati malfattori , i quali tutti superarono scnz' alcuna molestia o conseguenza il vajuolo, fin anche quella donna, che, come abbiamo riferito più sopra, era stata innestata secondo la pratica Chinese. Onde prevenire il sospetto, che cotesto vajuolo artificiale non fosse il vero, e che non potesse perciò difendere da una seconda infezione., Sloane spedi uno degl'innestati ad Hertford, dove allora regnava il vajuolo; ma ad onta di tutti i tentativi , non rimase in verun modo attacato dal contagio. A maggior convincimento vennero innestati altri sei esposti, e ne seguì il medesimo risultato. Finalmente Maitland inoculò le principesse, e poscia altri dugento individui, e tutti coll' esito il più felice. Solamente il figlio del duca di Bridgewater morì non guari dopo l'innesto, ma probabilmente per qualche altra affezione (1). Matt. Er. Borezio A 2 550 --- 2- 0

⁽¹⁾ LESKE estr. c. vol. IV. p. 311.

testimonio oculare di questi primi esperimenti, trovò necessario di sostenere l'inoculazione contro l'obbiezioni dei moralisti e de'tcologi, secondo i quali sembrava essa derogare ai diritti della provvidenza (1).

In quell'anno medesimo anche un certo Nettleton medico in Halifax esegul quaranta inoculazioni, applicando della bambagia imbevatu di marcia vajuolosa sopra la pelle, dopo di avervi fatto delle fregagioni. Tutti gl'innestati camparono felicemente (a), quantunque l'inyidia e la calunnia abbiano cercato di far oredere, che uno di lorò abbia dipoi sofierto il vajuolo naturale (3).

~ 137. Nello stesso anno 1721. il nuovo metodo della inoculazione fu trasportato in America. Essendosi sviluppata un'epidemia di vajuolo confluente nella nuova Inghilterra, un'erto ecclesiastico chiamato Mather vi pubblice è le memoric di Timoni e di Pilarini. Dietro queste notizie Zab. Boylston medico a Boston innestò primieramente i suoi propri figli e dipoi altri 242: fanciulli, ma non. coll'esti oi il più felice, pogiche ne morjeno esi, tatti soggetti a dir verò di costituzione gracile ed infermiccia ; e curati con un metodo inopportuno (4). L'esperienze di Boylston pregiudicarono non poco ai progressi dell'ino-

⁽¹⁾ HALLER diss. pract. vol. V. p. 673.

⁽²⁾ LESKE estr. c. vol. II. p. 239.

⁽³⁾ Racc. di Breslavia, a. 1723. ott. p. 458.-KIR-KPATRICK's analysis of inoculation, p. 123. Lond. 1754. 8.- De la Condamine, mêm. a. 1754. p. 979.

⁽⁴⁾ Boylston's historical account of the small-pox, inoculated in New England. Lond. 1726. B. COLEMANN notisi dell'inoculazione nella nuova Inghilterra, trad. dall'Ingl. da 48. Fares. Wilteb. 1723. 4.

culazione, perchè intanto un certo Dalhonde approfittò dell'occasione per diffondere le più svantaggiose testimoinanze sulla pratica allora introdotta (1).

Anche a Londra si verificarono nell' anno seguente alcuni avvenimenti del tutto sfavorevoli all'inoculazione. Un figlio di tre anni del conte Sunderland, in cui l'innesto era stato eseguito da Maitland, morì nel decimo nono giorno in mezzo alle più forti convulsioni. Un servo di lord Bathurst ancora convalescente da un'altra malattia allorchè fu incautamente innestato da Amyand, morì nel settimo giorno dopo l'eruzione (2). La stessa Miss Rigby divenne vittima d'una febbre etica sopravvenutale per una grand' ulcera saniosa nel luogo dell'incisione (3). Secondo i calcoli esatti di Jurin, ccco i tre casi mortali in 182. innestati (4) Fra gl'innestati in Londra e fuorinon ne perirono che 9. di 445. nel 1723. (5), uno solo di 40. nell'anno seguente (6), e tre di 143. nel 1725. (7) Jurin che continuò regolarmente a teuere questo registro fino all' anno 1726. , avea tutta la ragione di esaltare i vantaggi dell'inoculazione, mentre il vajuolo naturale fra 14 infetti suole involarne costantemente uno (8).

138. Tuttavia non solo l'esito talvolta infelice delle prime esperienze, ma ben anco alcune osservazioni erro-

- (2) Ivi p. 107. 108.
- (3) Ivi p. 110.
- (4) Philos. transact. vol. 31. p. 213.
- (5) Racc. di Bresl. a. 1723. Dec. p. 683.
- (6) Ivi 1725. Marzo p. 315.
 - (7) Ivi 1726. Maggio p. 640.
 - (8) Montuclas nel Récueil , p. 50.

⁽¹⁾ Woodwitte I. c. p. 140

mee de primi sostenitori delle inoculazioni, e più aucora i pregiudizi ed il fanatismo destarono ben presto in Inghilterra non pochi avversari, i quali combatterono il movo metodo con argomenti fisici e morali. Infra gli altri Maitland osato avea di asserire, che il vajuolo innestato non era atto a produrre una nuova infezione e a sviluppare sintomi rilevanti. Fin dall' anno 1722 comparve alla luce un insulso libello contro l'inoculazione, dove si trovavano riportati tutti gli avvenimenti sfortunati di questa operazione, dichiarandola effetto di soggestione infernale. (1)

Più interessanti e ragionevoli sembrarono le obbiezioni di Gugl. Wagstaffe , medico in Londra , contenute in una sua lettera diretta a Freind (2). Egli riporta gli e. sempi sfortunati di Baston, ed il preteso ritorno del vasuolo dopo l'inoculazione in una miss Degrane ; racconto però mancante d'ogni fondamento. Sostiene, che anche coloro, i quali hanno già sofferto il vajuolo naturale, sono ancora suscettibili dell' artificiale mediante l'iunesto; che la marcia di vajuolo benigno può originare del vajuolo confluente; che l'inoculazione sarà forse adattata al clima del Levante, e alla maniera di vivere degli orientali, ed all'incontro estremamente nocevole nel clima dell' Inghilterra e pel modo di vivere degl' inglesi (3). Perfino un ecclesiastico chiamato Edmondo Massey predicò pubblicamente contro l'inoculazione a S. Andrea nel 1722., e fece stampare l'insulsa ed assurda sua predica. Il testo era desunto dal libro di Giobbe , c. 2. §. 7.

⁽¹⁾ Woodfills l. c. p. 124.

⁽²⁾ Journ. des. Sav. 1723. Fevr. p. 133.

⁽³⁾ WOODWILLE, l. c. p. 136.

a Egressus igitur satan a facie Domini, percussit Job a ulcere pessimo, a planta pedis usque ad verticem ejus; a Rappresentò l'inoculazione come un'arte diabolies, che il demonio volle dapprima esercitare sopra Giobbe 5:e portò tan' oltre il suo fanatismo, ch'ebbe l'ardire di ripetere maggior straggi dall'inoculazione medesima; che dal vajuolo naturale (1).

Un certo, Clinch sostenne, che l'inoculazione non sempre riesce (a); e Gio. Franc. Howgrave opinò, che e l'inoculazione realmente giovasse, non importerebbe di sottomettervi esclusivamente le costituzioni più sane (3).

Quantunque Jurin e Mailand sieno arrivati a confutare la maggior parte di sì fatte obbiezioni (4), vi volle però longo tempo, priacchò l' inoculazione abbia potutorinettersi alquanto in credito. Allorquando Jurin cessò di pubblicare le liste degl' inoculati, Gio. Gasp. Scheuchner le continuò pel corso di altri due anni (5). Anche Gugl. Douglas diede alla luce una dissertazione contro l'inocuilazione (6); ma l'apologia di Gio. Kirkpatrick (7) non-

⁽¹⁾ Sermon against inoculating the small-pox, Lond, 1722. 8.

⁽²⁾ Historical essay on the rise and progress of the small-pox, presso Woodwille, p. 138.

 ⁽³⁾ Reasons against the inoculation of the small-pow,
 Lond. 1724. 8.
 (4) Account of inoculating the small-pow, vindica-

ted. Lond, 1722, 8.

(5) Account of the success of inoculating the small-

⁽⁵⁾ Account of the success of inoculating the smallpox in Great-Britain. Lond. 2729. 8.

⁽⁶⁾ Diss. concerning inoculation, subjoined to an essey on the small-pox. Lond. 2730 8.

⁽⁷⁾ Essay on inoculation, occasioned by the smallpow in South-Corolina. Lond. 1743. 8.

basto per sostenere la nuova operazione. Quest'ultimo riferì, che di 1000, Innestati nella Carolina meridionale. otto n' crano morti. In seguito protesse nuovamente l' inoculazione di maniera, che la sua analisi merita di essere, risguardata come un modello in tale argomento (1). Kirkpatrick prova fondatamente, che talvolta il vero vajuolo si manifesta anche dopo l'inoculazione; che il miasma del vajuolo artificiale può assolutamente servite a nuovi innesti; che il periodo della dentizione non pregiudica punto all' operazione; che soprattutto giovano le încisioni sul braccio per introdurre il contagio, e che questo non dev'essere mescolato col sangue. Accenna il caso di un inoculato, che tento più volte, ma indarno, d'innestarsi di nuovo il vajuolo (2). Secondo i calcoli comunicatogli da Browne Langrish tra il 1726 e 1738 non vennero iunestati iu Inghilterra che 2000, individui, fra i quali morirono due gravide.

139. Il metodo dell' inoculazione fu conosciuto in Francia nel 1723 per niezzo d'un certo. De la Coste, il quale dopo di suo ritorno dall' Inghilterra , vi portò le prime notizie (3). Il duca d'Orleaus reggente s'interessò vivamente per promuovere una sì salutare scoperta. Tutavia si credette opportuno di consultare per riguardi teologici la Sorbonà. I dotteri di-quella facoltà si divisero in due patitit, uno sosteneva l'inoculazione, l'altro vi si opponeva. Tuttavolta il nuovo metodo sarebbe stato introduto anche alla cotte, se la morte del duca d'Orleans

⁽¹⁾ The analysis of inoculation. Lond. 1754. 8.

⁽²⁾ Ivi p. 120.

⁽³⁾ Montuclas recueil, p. 140

avvenuta li 3 dicembre 1723 non avesse fatto largo ai nemici dell'inoculazione (1). Nello stesso mese però fu sostenuta in Parigi sotto la direzione di De la Vigne una tesi, in cui gli inoculatori erano dichiarati altrettanti ingannatori e carnefici, e l'inoculazione un misfatto (2). A dir vero parecchi medici ragguardevoli , Astruc , Dodart , Chirac ed Elvezio (3) patrocinarono il nuovo metodo; ma il famoso controvertista Fil. Hecqueto, le di cui opere secondo la testimonianza del censore Burctte (4) contengono principi del tutto conformi alla medicina antica, menò tanto rumore, che non si osò più per lungo tempo tentare il vajuolo artificiale (5), Perchè l'inoculazione sembra un attentato alle providenze del creatore e alle leggi della natura ; perchè si accorda piuttosto colla magia di quello che co' principi della medicina ; perchè la materia vajuolosa non può quindi essere interamente evacuata; perchè il vajuolo artificiale non previone il ritorno del naturale ; perchè in origine l'operazione era esercitata da vecchie e da idioti ; e perchè finalmente gli autichi non la conoscevano, Hecqueto s'immagino di doverla rigettare.

Impertanto Mailland trasportò l'inoculazione nella Germania. Egli recossi per ordine del re nel 1724 in Annover a fine d'inoculare il principe Federico. Contempo-

⁽¹⁾ CONDAMINE mem. 1754 p. 956.

⁽²⁾ GANDOGER DE FOIGNY traité prat. de l'inoculat. p. 44. Nancy 1768. 8.

⁽³⁾ CONDAMINE 1. c. p. 954.

⁽⁴⁾ Raisons de doute contre l'inoculation. Paris 1723.
12.- Observations sur la saignée du pied. Paris 1724.12.

⁽⁵⁾ CONDAMINE & c. p. 958.

raneamente esegul lo stesso innesto col più prosperoso successo sopra diversi bambini delle prime famiglie di quella città (1). Gio. Ern. Wrede apprese da Maitland questa pratica, sosteme l'inoculazione con un'apposita operetta (2), ed il di lui figlio innesto felicemente un'orfana di Pyrmont. Intanto Gio. Fil. Seip confermò ed illustrò i vaniaggi del nuovo metodo, e fissò specialmente l'actenzione all'applicazione esterna del miasma (3).

Ma quasi nesumo a avviso d'imitare esempi à luminosi. Golil dichiarò apertamente, che le combinazioni stortunate, accadute nell' Infighiltera e a Boston non potevano a meno di rendere guardingo chiechessia, e che l'inoculazione dava origine eziandio al vajuolo anomalo e falso. (4). Trew pubblicò una lettera anonima d'Annover, dove viene riputata assai violenta la malattia successiva all'innesto, e si asserisce, che questa operazione manea sovente di felice riuscita (5). Gio. Fed. Bauer professore in Lipsia, si diede a credere, che il vajuolo prodotto artificialmente, debba essere più pericoloso di quello che si propaga naturalmente e accidentalmente (6). Nemmeno poò egli accordare che si susciti una malattia per prevenirque un'altra (7).

140. Una sì fatta indolenza dei medici e del pubbli-

⁽¹⁾ Collez. di Breslvia, a. 1724. maggio. p. 564.

⁽²⁾ Pensieri intorno all'inoculazione del vajuolo. Annov. 1724. 8.

⁽³⁾ Collez. di Breslav. a. 1725. ag. p. 235.

Act. med. Berol. dec. II. v. II. p. 32. 40.
 Commerc. Literar. Noric. a. 1737. p. 328.

⁽⁶⁾ Act. med. curios. vol. IV. p. 571.

^{(6) 2}ct. mete, curios. vot. 17 . p. 371

⁽⁷⁾ Commerc. literar. Noric. a. 1737. p. 301.

co verso l'inoculazione durò pel corso di vent'anni, cioù dal 1726. fino al 1746., nè alcuno osò, se s'eccettui Kirkpatrick nella Carolina meridionale, instituire nuovi esperimenti. Nel 1746. il benemerito vescovo di Worcester , Isacco Maddox , ridestò lo zelo universale per l'i. noculazione, e creò sotto la protezione del duca di Malborough, una società destinata ad occuparsi in ispezialtà nella propagazione d' una sì interessante scoperta. Tre stabilimenti vennero aperti immediatamente per l'oggetto proposto : ma dappoi se ne destinò nno per la preparazione degl' individui da inocularsi , un altro per coloro subito dopo l'innesto, ed un terzo finalmente per gl'infetti da vajuolo naturale (1). Dapprincipio la soprantendenza a questi spedali fu affidata a Rob. Paole, e dopo lui ad Archer. In 1800 innestati fra i quali trecento adulti sei soltanto morirono, ossia una trecentesina parte (2). Frattanto il rispettabile direttore di sì importante istituzione non solo aprì un nuovo ricetto, ma s'accinse altresì ad. istruirne il volgo, inculcando con argomenti persuadenti e con maschia eloquenza l'inoculazione da quello stesso pergamo, d'onde trent'anni avanti il fanatismo di Massey l'avea condannata (3). Quantunque Teod., de la Faye, di Canterbury abbia cercato di combattere le massime del nostro oratore, la ragione riportò finalmente la vittoria (4), talchè nemmeno le quistioni teologiche di Davidde Soame allora per la prima volta pubblicate, non

⁽¹⁾ Woodwille p. 229.

⁽²⁾ COMDANINE 1. c. p. 963.

⁽³⁾ Notizie letterarie di Gott. ann. 1753. p. 495.-Woodwills p. 238.

⁽⁴⁾ WOODWILLE p. 258.

recarono veran pregiudizio al nuovo metodo, poiche l'editore Mesio Doddridge lo sostenne con vera energia e ra-

gionevole parzialità (1).

141 Un' anno dopo la fondazione dell'istituto d'inoculazione, il chirurgo Ranby eseguì un gran numero d'innesti, i quali tutti ebbero un fine fortunato, mentre in 827. non avvenne alcuna disastrosa conseguenza (2). Nel 1748. Tronchin, allora presidente del colleggio dei medici di Amsterdam innestò il vajuolo al proprio suo figlio, e fu il primo a dare un esempio di tal fatta in Olanda (3). Tomm. Frewen, il quale nelle sue inoculazioni perdeva appena un individuo per ogni trecento, stabili pure prima d' ognaltro colle sue esperienze, che la scelta del miasma nulla influisce sull' indole del vajuolo, avendo egli osservato il vajnolo più benigno dopo un innesto di miasma tratto da pustole della più rea qualità (4) Egli trattava i suoi innestati generalmente col metodo antiflogistico; riputava molto efficace l'acqua fredda, e vantaya per la preparazione l'etiope minerale.

Nell'anno 1750. l'inoculazione fu introdotta anche a-Ginevra ed in Italia. Guiot ponderò i vantaggi dell'incisione rispettivamente ai véscicanti, ma si appigliò alla prima, percochè innestando coi secondi rimangono trop-

⁽¹⁾ The case of receiving the small-pox by inoculaon, impartially considered, especially in a religious view. Lond. 1751. 8.

⁽²⁾ Recueil de pieces sur l'inoculation, p. 80, Haye 1755. 8.- Condamine l. c. p. 963.

⁽³⁾ CONDAMINE 1. c. p. 965.

⁽⁴⁾ Practice and theory of inoculation. Lond. 1749.8.

po facilmente delle ulceri ostinate e maligne (1). L'Italia è debitrice dell'inoculazione a Peverini, medico a Citerna nello stato Pontificio. Come s' egli avesse in idea di discreditarla, instituì le prime esperienze sopra soggetti gracili e venerei, e tuttavia con esito felice. Non andò guari, ch' eseguì l'innesto sopra altri 200. fanciulli, servendosi d'un ago, metodo praticato dipoi dall' Evangelisti di Monterchi , il quale usava dapprima i fili di bambagia imbevuti di miasma. Anche fra gl' Italiani si distinse una dama, la marchesa Bussalini, nel procurare la maggior diffusione d'una si interessante operazione (2).

Nel 1752. Ricc. Brooke propose nuovamente l'antico metodo della frizione per l'innesto, perchè in tal guisa i dolori e la malattia risultano di gran lunga più benigui e leggieri (3). Butini , che avea già sperimentato venti innesti felici, divenne egli pure in quell'anno il difensore di tal metodo (4).

142. L'anno 1754. è uno dei più importanti nella storia dell'inoculazione. L'apologia che l'egregio fisico e letterato De la Condamine pubblicò in quest' anno. le procurò molti partigiani di qualsisia classe. Colla sua felice ed efficace eloquenza distrusse tutte le obbiezioni fisiche e morali degli avversari, e mise nella miglior luce. i vantaggi del nuovo metodo, conchiudendo la sua memoria veramente classica col calcolo, che l'inoculazione, se

⁽¹⁾ Mêm de l'academ. de chirurg. vol. II. p. 552. LESKE estr. vol. IV. p. 137.

^{(2).} CONDAMINE mem. 1758. p. 769-772.

⁽³⁾ LESKE estr. , vol. 1V. p. 133.

⁽⁴⁾ Traité de la potite vérole, communiquée par l' inoculation. Paris 1752. 8.

fosse stata introdotta universalmente nella Francia fin dal 1723, avrebbe conservato allo stato più di 760,000 individui, involati dal vajuolo durante quest' intervallo di trenta anni (1).

L'apologia di Condamine ha prodotto il miglior effetto sulla facoltà medica, e nello stesso anno fu sostenuta una tesi , in cui era comprovata l'utilità dell' innesto e. ripetuto ogni argomento del soprallegato scrittore (2). Contemporaneamente il collegio dei medici di Londra dichiarossi apertamente favorevole all' inoculazione (3); e Ricc. Eurges cercò di dimostrare, che tal' operazione non trae seco verun' altra malattia; ch' essa non abbisogna di alcuna predisposizione o preparazione, fuorchè di guardarsi dal contagio naturale (4), è che nel principio del vajuolo artificiale giovano grandemente i sudori . perchè prevengono qualsisia altra eruzione solita associarsi a questa specie di vajuolo, Nello stesso tempo Brown diede alla luce le sue osservazioni relative al presente soggetto (5) e Tronchin ritornato da Amsterdam a Ginevra contribuì a viemmaggiormente universalizzare l'inoculazione in quest' ultima città (6). Jac. d'Apples la introdusse a Losanna, dove però riscontrò talvolta l'esantema miliare, che

⁽¹⁾ Mêm. de l'accad. des scienc. à Paris, a. 1754. p. 945-1032.

⁽²⁾ Racc. di osservazioni scelte di medicina, trad. dal Franc. vol. II. p2g. 73. Eranof. e Lipsia 1758. 8.

⁽³⁾ WOODVILLE l. c. p. 267.

⁽⁴⁾ An account of the preparation to inoculation. Lond. 1754. 8.

⁽⁵⁾ Philosoph. transact. vol. XLVII. p. 570.

⁽⁶⁾ Ivi vol. XLVIII.p. 818,- CONDAMINE. cl. p.965.

dividui ora resi vittime dell'innesto, ora attaccati per la seconda volta dal vajuolo, ora deformati straordinariamente del vajuolo artificiale, sono desumi o dalle notirie di Boylsion o dalle relazioni vaghe di qualche anonimo. La Virotte (1), e Condamine (2) fecero anche vedere, che perfino i nomi degli innestai, erano fittiaj. Con tutto ciò Cantwell, anzichè mettersi in quiete, volle esporre in due altri libercoli dei nuovi fatti, dei quali si scorge a prima giunta la falsità (3). Siccome poi egli esagerò i pericoli dell'infezione e della propagazione, cpidemica mediante l'inoculazione, Morisot-Deslandes cercò di confutarlo e di sostenere in ogni rapporto i vantaggi del vajuolo artificiale (4).

È importante la relazione del medico inglese Hosty sullo stato dell'inoculazione esiguita in Inghilterra nell'ano 1755. (5). S' innestava allora colì insinuando dei fili imbevuti di miasma vajuoloso in incisioni piane fatte sulle braccia. Di 851: innestati nell'istituto di Londra, quattro soli erano morti. Non avvi escepio, che il miasma abbia portato, seco alcun'altra malattia, o che il vajuolo siasi manifestato per la seconda volta.

144. Nell' anno seguente comparve alla luce l'apologia di Tissot, la quale comprende quasi tutto ciò, che dir si può in lode del nuovo metodo ed in ribattimento delle

⁽¹⁾ Iournal des Savans 1755; Oct. p. 352.

⁽²⁾ Mim. de l'acad.des scienc. à Paris, a. 1758 p. 741.

⁽³⁾ Lettre a Mr. de.....avocat au Parlement. Paris 1656. 12.- Le tableau de la petite vérole 1758. Paris 12.

⁽⁴⁾ Raccolta di osservaz oni scelte, vol. VI. p. 180.

⁽⁵⁾ Ivi vol. III. p. 321. 382.

obbiezioni mosse contro il medesimo (1). Contemporaneamente Tronchin venne invitato a Parigi per innestare i figli del duca d' Orleans; cui tennero dietro dipoi parecchi grandi , e quindi sì Tronchin che Hosty ebbero grani faccende. Tronchin servivasi non della lancetta, ma dei vescicanti (2). Non cessarono pertanto i pregiudizi ed il fanatismo. Una nuova querela teologica venne alla luce contro l'inoculazione (3). Nessuno si diede la pena di confutare un libello cotanto insulso. Ma Eb. Gilerist di Dumfriess combatte l'obbiezione, che il vajuolo artificiale non . permetta la sortita di tutte quelle impurità che si sviluppono nel naturale (4).

Nella Svezia l'inoculazione propagossi rapidamente ; dacche Davide Schulz ripatriato da Londra, diede alla luce le sue osservazioni (5). Egli disapprovò la soverchia astinenza da' cibi , biasimò altamente l' innesto durante il corso d'un' epidemia, e negò che sì fatta operazione porti seco alcun' altra malattia. Altrove poi riferisce la fondazione d'un istituto d'inoculazione a Gottemburgo e a Cristianopoli, dove di 8000. innestati non perì alcun individuo (*).

Potente avversario dell' inoculazione mostrossi dipoi

(1) L'inoculation justifiée. Oeurres compl. tom. IV. Laus. 1784. 8.

(2) CONDAMINE l. c. p. 748.

(3) L' inoculation de la petite vèrole, deferée à l'eglise et aux magistrats. Paris 1756. 12.

(4) Nuove esperienze ed osserv. della soc. med. d'Edimb. vol. II. p. 448.

(5) Berrattelse om Koppors ympande. Stockh. 1756. 8.

(*) Intrades-tal om barms skotsel i gemen Stockh. 1760.8.

Ant. de Haen, il qual col suo ascendente e colla sua influenza, impedi realmente per molti anni la propagazione della medesima negli stati Austriaci (1). Fatalista a guisa de' Turchi e troppo pussillanime per tema di contrariare i giudizi di Dio, ebbe altresì il pregindizio di asserire che il vajuolo non fa tante stragi come si crede; che molti individui rimangono immuni dal vajuolo naturale, e che questo può attaccare due volte il medesimo soggetto. Tissot s'accinse a consutarlo (2); ma de Haen continuò a sostenere, che di 40. innestati ne muore uno; che il vajuolo naturale riesce più benigno e che l'inoculazione contribuisce a rendere più frequenti l'epidemie del vajuolo. (3). Anche Arr. Fed. Delius segui l'opinione popolare, supponendo che resti eguale la mortalità pel vaiuolo naturale e per l'artificiale, ogni qualvolta sia quella la meta della vita (4). All'incontro Gio. Giorg. Röderer spiegò con precisione i vantaggi dall'affezione locale nell'inoculazione, per oui si prevengono i sintomi nervosi. Notò eziandio, che le ulcere nel tuogo dell'innesto riescono assai salutari, e che i fancialli predisposti agli esantemi superano facilmente il vajnolo (5). Sam. Cox ripetè gli argomenti di Condamine (6), ed alcum medici Olan-

⁽¹⁾ Quaestiones sacpius motae super methodo inoculandi variolas. Vindob. 1757. S.

⁽²⁾ Lettre à Mr. DE HAEN en réponse à ses questions 1759. S.

⁽³⁾ Refutation de l'inocui stion. Vienne 1759. 8.

⁽⁴⁾ Race. di Franc. fasc. XIII. p. 17.

⁽⁵⁾ Diss. utrum naturalibus praestent variolae artifliciales? Gott. 1757. 4.

⁽⁶⁾ Letter to a friend on the subject of inoculation. Lond. 1757. 8.

desi pubblicarono un trattato esteso intorno ai vantaggi dell'inoculazione(1).

145. Merce gli sforzi di Peverini; di Girol. Pannilini, di Targioni Tozzetti (2), di Castellucci e di Franc. Caluri (3) l'inoculazione sece in Italia progressi tanto più inaspettati, quanto meno essa poteva aspettarsi colà una sì decisa condiscendenza degli ecclesiastici. Allorchè Condamine recossi a Roma, si credette generalmente, ch'egli volesse ottenere dal papa un breve a favore dell' inoculazione; e quindi il card. Valenti le assicurò precedentemente, che ciò non sarebbe punto malagevole (4). Caluri osò eseguire degl'innesti in mezzo ad una terribile epidemia, e trovò che talvolta il vajuolo ritorna per la seconda volta dopo la comparsa dell'artificiale. Franc. Berzi s'immagino di facilitare e di accelerare l'innesto, proponendo una seconda frizione del miasma sulle pelle (5). Tomm. Cooper additò intanto nuove avvertenze per l'inoculazione (6). Nel 1759. Parigi offir in due casi dubbi ai nemici dell'inoculazione l'occasione di riprendere le loro armi

(1) Inenting der Kinderpokjes in haare groote Voordeelen. Rotterd. 1757. 8.

(2) Relazioni d'innesti del vojuolo fatti in Firenze 1757. 8.- Atti dell'accademia di Stena, vol. I. p. 1.-163. Siena 1761/4.

(3) Dell' innesto del vajuolo. Siena 1760. 4.

(4) L. c. p. 772.

(5) Nuova scoperta a felicemente suscitare il vajuolo per artificioso contatto. Padova 1758. 4.

(6) Remarks on an serious address to the public, concerning the means of avoiding the dangers of inoculation. Lond. 1758. 8. contro la medesima. Un figlio dell' appaltator generale La. Caze dell' età di cinque anni, merì sedici giorni dopo la comparsa del vaipolo innestato; ed un certo do la Tour poco dopo l' innesto fu assalito dal vajuolo naturale. Si seppe dipoi, dietro fondamenti irrefregabili, che il primo cra mancato per una forte confusione nel capo (1), è che il secondo aveva sofferto in vece il vajuolo falso ossia l'i morviglioni (2). Tuttavia Gaulard anuumiò diversi altri casi di verp, vajuolo, e Franc. Roncallo Parolini risguardò una cfreostanza à rara per una delle più forti obbiezioni contro l'incufazione (3). Carlo Gandini e Pictro Eranc. Pizzonto combatterono questa e simili altre opposizioni, ed introdussero felicemente il nuovo metodo in Genova ed in Lucae (4).

Nello stesso anno 1759. Ben. Franklin per diffondere con miglior successo l'inoculazione nell'America, ecciò l' egregio medico Gugl. Heberden a scrivere un'istruzione popolare sul regime da ossservarsi in questa operazione. Dalle, relazioni del fisico americano rilevasi, che nella unova Inghilterra era stato praticato l'innesto in un periodo di sei anni sopra 2113. individui, tra i quali tuttavia manearono trenta (5). Ma Comm. Bond ci assicura, che fino al 1783. l'inoculazione non ha fatto alcun comidereyole progresso nella Pensilvania (6).

(1) Nuova raccolta di osservazioni scelte, vol.I.p.181.

⁽²⁾ Ioi p. 154.

⁽³⁾ Dissert. epistolaris in sartolarum inoculationem. Briw. 1759. 4.

⁽⁴⁾ Orazione eccitatoria all'introduzione dell'innesto del vajuolo. Lucca 1759. 8.

⁽⁵⁾ Woodville p. 318. p. 342.

⁽⁶⁾ Défense de l'inoculation et relation des progrès qu' elle a faits à Philadelphia en 1758. Strasbourg 1784. 8.

.30

c) Vicende dell'inoculazione dal 1760. al 1790.

146. Le inquititud ni cagionate in Parigi dall'inoceulazione, e i cangiamenti introdottivi da Gatti, Sutton e Dimsdale formano gli oggetti precipui della storia dell'inoculazione durante questo periodo di tempo.

Gatti, professore nell'università di Pisa, volendo recarsi in Inglillterra passò l'anno 1760. a Parigi , dove si trattenne per qualche tempo ed eseguì parecobi innesti, i quali tutti riuscirono felicemente. Egli aveva già appresa. l'inoculazione in Levante, ed anche esercitata a Costantinopoli. Il di lui metodo era in ogni parte semplicissimo. Siccome cercava di non sottomettere all'inoculazione che i fanciulli sanissimi, non aveva perciò bisogno di predisporli : dove però riputava ciò confaccute, evitava sempre gli evacuanti e i debilitanti. Prendeva il miasma delle pustole non per anco interamente mature, poichè essendo più fluido, più facilmente viene assorbito. Gatti fu pure il primo a servirsi degl' innesti di miasma tratto da vajuolo innestato, persuaso che in tal-guisa si rendesse più benigno. Eseguiva l'operazione con un ago leggiermente intinto di materia vajolosa e caciato colla punta sotto l'epi dermide del braccio. Egli però credeva, che non si dovesse permettere l'insinuazione di soverchia quantità di miasma, perchè a questa corrispondeva il numero delle pustole. Additò pure per sostituto del miasma la crosta polverizzata dalle pustole medesime, e quanto al trattamento dell'incisione l'abbandonava alla natura colla sola avvertenza di non applicarvi giammai alcuna specie di empiastri (1).

⁽¹⁾ Lattre de Mr. Gatti à Mr. Roux. Paris 1762.

Siccome in Parigi pechissimi, se si eccettui un Condamine, un Hosty, conoscevano l'inoculazione; Gatti che campo di tanto piu distinguersi co stoi innesti, quanto più fedicemente riuscivano le di lui operazioni, quanto più benigoo mostravasi il vajuolo ne suoi inoculati, e quanto più semplicemente gelj li trattava. La calnunia fece credere, ch' egli indebblisse il miasma, che producesse il rajuolo falso e contribuisse a disseminar la contagione: Avendosi fatto viedere durante il cotso della malattia un ragguardevole personaggio innestato da Gatti, ne' luogh più frequentati, al teatro ed alle Tuillerie, questo tratto d'imprudeinza diede origine ad un processo; che duro per ott anni, sorgente di passioni e di animosità, e decino finalinente con una sentera assolutoria del re (1).

149. Il pericolo, che gl'unesti di Gatti favorir potessero la propagazione epidemica del vajuolo, formò soggetto di accusa contro di lai al Parlamento, che emanò
li 8 giugno 1763 un decreto, col quale era probita l'inoculazione nelle città e sobborghi da ressort de la cour,
e veniva incaricata la facoltà medica di stender un rapporto sull'inoculazione, indicandone i vantaggi e i discapiti 4 dimostrando se debba essere permessa, probitta, o

lollerata; e additando nel primo e nel terzo caso le cautele da osservarsi nell'operazione. Il rapporto della facoltà medica dovea in seguito essere comunicato alla teolo-

^{12.-} Reflexions sur les préjugés, qui s'opposent aux progrès et à la perféction de l'inoculation. Bruxelles 1964. 8.- Nouvelles reflexions sur la pratique de l'inoculation. Paris 1967. 8. Amburgo 1772. 8.

⁽¹⁾ Gaudoger de Foigny traité pratique de l'inoculation, p. 62.

gica, e quindi al procurator generale, per le definitive conclusioni. La facoltà medica nominò a questó fine dal suo corpo dedici commissari cioò de l'Epine, Astrue, Cochu, Bouvart, Verdelan, Petit, Geoffry, Lorry, Thieri, Malouin e Macquart (i). Siccome poi parecchi di questi non conoscevano abastanza l'inoculazione, si petiso d'interpellare il sentimento delle accademie stratifere di altri medici rinomati. Condamine, onde mettere la coltà medica a portata di meglio esprimere il pròprio parece, diresse una lettera a Maty editore del Journal Britannique, in cui spiegava estesamente il vanlaggi dell'inoculusione (a). Parimenti Sauvages dichiarossi a favore del nuovo metodo (3), e de Chastellar cercò di diminuire la tema, che l'innesto promovesse vienmaggiormente le diffusione del vajuolo naturale (4).

Ma i nemici dell'inoculazione non cessarono d'inforbidare nuovamente gli animi. Prima appunto, ohe la facoltà medica prendesse una determinazione, misero in opera ogni sforzo per guadagnarsi la pluralità dei voti. Rast professore a Lione volle dimostrare coll'appoggio delle liste di mortalità della città di Loddrà, che dopo il 1724 cioè dopo l'introducimento dell'inoculazione, l'epidemie di

⁽¹⁾ lei p. 63. - Journ. des Sav. 1763. Sept. p.

⁽²⁾ Lettre de Mr. DE LA CONDANINE à Mr. MATY sur l'état présente de l'inoculation en France. Paris. 1764. 8.

⁽³⁾ Nosologia method. vol. I. p. 424.

⁽⁴⁾ Réponse à une des principales objections, qu'on oppose maintenant aux partisans de l'inoculation. Paris 1763. 13.

vajuolo risultarono più fatali, poichè precedentemente la proporzione degli ammalati ai morti di vajuolo stava come 1000 : 64, e dopo la sovraccennata epoca come 1000 : 81 ; sostenne inoltre, che l'innesto trae seco delle altre morbose conseguenze, e che non si dovrebbe pensare a mitigare la malattia, ma ad estirparla con istituti di vajuolo e con contumacie speciali (1). I calcoli di Rast menarono un grandissimo romore, c i nemici dell'inoculazione ne approfittarono con tanta avvedutezza, quanto fu lo zelo, onde i difensori della medesima si adoperarono per dimostrarne la falsità, e l'incongruenza. Castellux dimostrò essere irragionevole anche nel caso presente il sillogismo , post hoc , ergo propter hoc , costando , che simili epidemie divengono di per sè sempre più maligue (2). David collega di Rast provò, che le vittime del vajuolo naturale erano di gran lunga più frequenti avanti l'introduzione dello innesto, che dopo (3). Rellian ripetè questi argomenti, e dimostro in oltre che prima del 1721 le liste di mortalità erano state compilate con molta negligenza (4).

Un altro avversario per nome Pietro Abr. Pajan des Moncets ripetè gli argomenti di De Haen (5); ed asserì,

⁽¹⁾ Réflexions sur l'inoculation de la petite vérole Lyon 1762. 12.

⁽²⁾ Nouveaux éclaircissemens sur l'inoculation de la petite vérole, 1763. 12.

⁽³⁾ Observations sur la nature, les causes et les effets des épidémies varioliques. Genève 1764-12.

⁽⁴⁾ Refutation of the reflexions against inoculation, published by Rest. Lond. 1764. 4.

⁽⁵⁾ Dissertation sur la petite vénole et l'inoculation. Long. 1763. 12.

che il vajuolo naturale non è per se stesso pericoloso; che la pustole nou contengono alcun veleno particolare; che ogni altro pus notrebbe cagionner la stessa malatta, e che l'inoculazione non può impedire il ritorno del vajuolo. Razoux coufuto quest' ultima opinione; e trovò; che quan'lo il hogo dell' imesto soggiace ad una suppurazione abbondante, non è più da temersi una seconda infentione, malgrado il minor numero delle pustole (1). Luigi Pietro le Moc portò in campo diversi esemp di seconda infentione (2) dipendenti forse, come dimostrò Razoux, dall'aver impiegato precedentemente del miasma vajuoloso non recente e qu'ndi inefficace; da cui provengouo sovente i vajuola falsi, sossia i morviglioni (3).

D'Origny membro della facoltà di Parigi e nemico egli pare dell'inoculazione, rappresentò assi accortamenta le condizioni, sotto le quali si poteva permettere un tal motodo (d). Esse consistone in prevenire tutti i pericoli d'un'infezione ulteriore; in allontanare ogni occasione di diffondere l'epidemia vajuolosa, cel in rimaovere qualsisia causa di siutomi pericolosi. Ora siocome l'inoculazione non soddisfa a veruna di queste tre condizioni, ne segue ch'essa non debba essete in verun modo ammis-

⁽¹⁾ Lettre à Mr. Belletête sur les inoculations faites à Nismes 1764. 4.

⁽²⁾ L'inoculation de la petite vérole, renvoyée a Londres. Paris 1764, 12. Alcuni a torto attribuiscono quest'opera a MATY.

⁽³⁾ Tables nosologiques et météorologiques, dressées a l'hotel des Nimes. Bâle 1767. 4.

⁽⁴⁾ Examen de l'inoculation par un médeeine de la faculté de Paris, Londr. 1763. 12.

sibile. Mich. L. Vernage spiegò occellentemente i vantaggi del nuovo metodo; ma attesa la difficoltà di evitare la propagazione del vajuolo naturale, propose degl'istituti d'isoculazione simili a quelli di Londra (1).

148 Tutte queste differenze non erano che i forieri del grau dibattimento che dovea tenersi sopra tal materia, fra i membri più ragguardevoli della facoltà medica. Nella prima sessione del 1764 de l'Epine ha letto una memoria intorno all' inoculazione ; dove ripete gli argomenti di De Haen : di Wagstaffe e di Cantevill sul leggiero pericolo del vajuolo naturale , sull' immunità di parecchi individui dal vajuolo, e sulla propagazione; ed espone molti casi dubb je sospetti di vajuolo naturale comparso dopo l'innesto (2). Joannis come testimonio oculare illustrò uno di questi esempj avvenuti in Avignone, dimostro , come a bello studio era stato alterato (3). La citata memoria fu sottoscritta da sei commissari che furono l'autore, Astruc, Beron , Bouvart , Vesdelan e Macquart , e attirò al loro partito altri diciannove membri della facoltà. I sei mentovati commissari, sotto la direzione di Ant. Petit e sostenuti da altri 46 membri, s'accinsero ad esaminare la memoria di l' Epine, e ad inculcare la tolleranza temporaria dell'inoculazione (4). Petit pubblicò un rapporto as-

⁽¹⁾ Observations sur la petite vérole, naturelle et artificielle, à l'Haye 1763. 12.

⁽²⁾ Rapport sur le fait de l'inoculatiion de la petite verole, lù en présence de la faculté de medecine a Paris, 1765. 4.

⁽³⁾ Journal des Savans , 1765. Ecoût , p. 193.

⁽⁴⁾ GANDOGER DE FOIGNY, pag. 71. — Comm. Lips. vol. p. XII 171.

sai mediocre, in cui analizzò quello di de l' Epine e difese l'inoculazione medesima (1). Piacque però molto più l'apologia di Barbey Dubourg ; il quale occupossi specialmente nell'impugnare le obbiezioui morali e teologiche (2). Roux serisse contro de l' Epine, e raccomandò singolarmente la fondazione degli situiti d'inoculazione, ond'evitare il sospetto di maggior propagazione del vajuolo naturale (3). Condamine indicò l'incongruenza del primo rapporto della facoltà con una nuova sua relazione (4), e De Baux medico di Marsiglia, che avea già fatto conoscere altra volta il pregio del nuovo metodo (5), riportò 85 sue esperienze tutte felici, e confutò fondatamente tutte le opposizioni della facoltà di Parigi (6).

Intanto si combinarono alcune circostanze men che favorevoli per l'inoculazione, ed atte appunto a lusingare i nemici della medesima, che nelle susseguenti sessioni della facoltà la discussione potesse prendere una direzione alquanto diversà. La marchesa di Boufilers, che avea già sofferto il vajuolo artificiale, fu assalita di hel uuovo

(2) Opere di Franklin, vol. II. p. 180. Dresda 1780. 8.

⁽¹⁾ Premier rapport en faveur de l'inoculation. Paris 1766. 8.

⁽³⁾ Mêm. sur l'inoculation de la petite vérole. Paris

⁽⁴⁾ Histoire de l'inoculation de la petite vèrole, vol. 1. 2. Lyon 1772. 8.

⁽⁵⁾ Paralléle de la petite verole naturelle avec l' artificielle. Avignon 1761. 8.

⁽⁶⁾ Journ. de medec. , tom. XV. p. 272.

dal naturale; ma si rilevò dipoi, che l' imnesto non vi avea cagionato che il vajuolo spurio (1). Jac. d' Apples riscontrò un caso simile a Losanna, ed attribul tal fenomeno allo stato non recente del miasma (2). La morte d' un fanciolio innestato a Besanzone, Pozoteux la giustificò col riferire, che gli era stata levata la cute con una forbice, e poscia applicatavi sopra una vecchia crostat (3).

La facoltà medica si radunò per la seconda volta, e de l'Epine le presentò un altro rapporto ancor più cenregico del primo (d). La quistione era ancora indecisa nel 1768, allorquando Gandoger de Foiguy diede alla luce il suo trattato dell'inoculazione, che conteneva quantio era stato detto in lode e per insegnamento del nuovo metodo. Contemporaneamente Gio. Jac. Paulet si oppose nuovamente all'inoculazione per tema di vieppiù diffondere il contagio del vajuolo, ed insistette per l'estirpazione di questa malattia (5). Frattanto Gatti, stanco di tanti ritardi e contrasti inutili della facoltà, propose un premio di 1200 lire a chi dimostrase al evidenza il ritorno del vajuolo naturale dopo l'inoculazione (6). Finalmente il re

Comm. Lips. vol. XII. p. 367. — Mêm. et observations sur la methode d'inoculer la petite s'èrole. Lyon 1766. 8.

⁽²⁾ Act. helvet. vol. VII. p. 9.

⁽³⁾ GANDOGER DE FOIGNY, p. 73.

⁽⁴⁾ Ivi p. 72.

⁽⁵⁾ Histoire de la petite vèrole, avec les moyens d' en preserver les enfans, v. 1, 2. Paris 1768. 8.

⁽⁶⁾ Comment. Lips. vol. XII. p. 366.

stesso accordò a Gatti nel 1768 il permesso di eseguire gl'innesti nella scuola militare (1).

149. Mentre l'inoculazione provava tante vicende in-Francia, l'Inghilterra s'avea occupato a propagarla e a perfezionarla. Nella Scozia Aless. Monro e Sutherland inoculavano col più felice successo (2). Attorno la medesima epoca il metodo d'inoculazione ideato da Sutton comine? ad attirare l'attenzione universale de' medici Inglesi, Rob. Sutton, il padre, innestato avea felicemente tra il 1757 ed il 1767 a Eubenham presso Suffolk 2514 individui, Daniele suo figlio cercò di viemmeglio perfezionarne il metodo. Siccome però il padre non volle riconoscere od approvare sì fatto perfezionamento, il figlio divisò di separarsi da lui , e andò a stabilire un istituto d'inoculazione a Ingatestone nella contea d' Essex , dove menò romore di sì grande riuscita, che fu risguardato pel più ragguardevole e pel più fortunato degl' inoculatori. Non riportarono però un egual successo i di lui esperimenti, allorchè, recossi a Londra nel 1797. (3). Ma l'importanza del suo metodo, per cui non si manifestavano che pochissime pustole, eccitò la curiosità universale; e siccome egli non avea per anco spiegato il suo parere intorno a ciò, s'immaginarono innumerevoli congetture sul vero fondamento d'un esito sì felice.

Un certo Rob. Houlton, che chiamavasi il cappellano del conte d'Ilchester, esaltò grandemente il metodo di Sutton, senza determinare però i vantaggi e la

⁽¹⁾ Ivi vol. XV. p. 178.

⁽²⁾ Notizia dell'inoculazione del vajuolo nella Scozia, trad. dall'Ingl. de Wichnam 1766. 8.

⁽³⁾ WOODWILLE . p. 348.

pratiea del medesimo (1). Glass sostenue senas fondemento, che il segreto consisteva nel promuovere il sudore durante l'erusione. Ma noi ne dobbiamo la conoscenza soltanto a Gio. Baker (2), a B. Chandler (3) e a Gio. Jac-Gardone (4). Dan. Sutton non istituiva ne' suoi innestati alcuna straordinaria preparazione; faceva loro prendere soltanto poche dosì di mercurio dolce; e eseguiva l'innesto con una lancetta intini ad in issam ercentissimo di pustole non affatto mature, ed insimuata immediatamente sotto l'epidermide del braccio. Non applicava alcuna legatura o fascia all'incisione, e permetteva che gl'innestati potessero passeggiare nell'aria libera e muoversi a loro talento. Ecco lo spediente, diceva egli, per ottenere poolie se benique, pustole nel vajuolo.

150. Il nacedo di Sutton incontrò ben presto l'approvazion generale, specialmiente dopoche Tommaso Dimidale lo adottò e lo cenfermò non solo col famoso suo innesto dell'imperistrice delle Russie e degli altri principi di quella casa, ma altreà colle sue opere (5). Appenaro partiata della Russia ebbe la soprantendenza dell'istituto d'inoculazione a Londra dove gli accadde di combattere le opposizioni di Lottsome et il Rob. Dossie (6).

All' incontro biasimevole fu giudicato il metodo proposto da Gio. Mudge, il quale umetteva il luogo dell'in-

⁽¹⁾ Ioi p. 352.

⁽²⁾ Medical transact. vol. II. p. 275.

⁽³⁾ Wooewille l. c. p. 373.

⁽⁴⁾ Le secret de Sutton dévoilé. à l'Haye 1774, 12.

⁽⁵⁾ The present method of inoculating for the smallpox. Lond. 1767. 8.

⁽⁶⁾ Memoirs of agriculture, vol. II. p. 402.

cisione con una spugna imberuta di miasma, e sostenne dipoi la strata idea della preesistenza di questo negli umori (1). Gio. Haygart esaminò attentamente la suscettibilità di contraçio dell'atmosfera che circonda i vajuolosi, ed additò diversi utili suggerimenti e progetti, onde e colle inoculazioni generali in epoche determinate e con nuove contumacie, estirpare ed eliminare intieramente una sa funesta e terribile malattia (2).

eularione ha fatto considerevoli progressi, a vegnache non maneassero tratto tratto movi ostasoli e nuove opposizioni. Dan. Bernoulli trovò fin dal 1760. nell'esame delle liste di mortalità y che l'inoculazione era tanto meno da temersi per le sue conseguenze, quando più tenera era-l'età dell'individuo, in cui volevasi eseguire l'operazione (3). Maty addusse molte esperienze in conferma di alfatta assersione (4) ; e concorse, nello stesso sentimento Razzoux (5). Quindi Ant. Stocek zelante difensore del meto-

⁽¹⁾ Per qual ragione il sajuolo artificiale è più benigno e sicuro del naturale, trad. dall' Ingl. Danzica 1778. 8.

⁽²⁾ In qual modo si debba prevenire il vajuolo, trad. dall' Ingl. di G. Fed. Cappel. Berlino e Stettino 1786. 8.

Mém. de l'acad. des scienc. à Paris, a 1790.
 p. 34.

⁽⁴⁾ Verhandel. der Maatsch. der Wetenshe. te Haarlem, D. VI. p. 327. 489. — Medic. observ. and inquir. vol. III. p. 287.

⁽⁵⁾ Tubles nosologiques, p. 329.

do di Sutton e di Dimsdale (1) fece, che Massim. Lochec instituisse degl'innesti sopra dei neonati; e tale ne fu il successo, che di 34. bəmbini tra il quarto e il diciotte-simo giorno di vita, due soli morirono (2). Il tentativo non andò per altro esente da obbiezioni; e Pietro Campes quantuaque, seguace del nuovo metodo ingless (3). e celebre di già pel suo trattato classico, con cui riproti il premio dall'accademia di Toloss (4), necennò diversi motivi, pei quali sembra, che non si debba praticare l'innesto avanti il secondo anno d'eta. Più di tutti Tomm. Percivall Brismò l'inoculazione sopra i necuati, perchè questi hanno già sofferto troppo nei travagli del nascimento, e perchè d'ordinario corrono maggior pericolo, e sviluppano un maggior numero di pustole (5).

Fra i medici tedeschi si distinse singolarmente Balder Luigi Tralles nel sosteuere l'inoculazione (6). La risposta di Ant. de Ilaen si riferisce specialmente alle obbicziczioni da lui stesso fatte precedentemente (7); e a dir

(1) WASSERBERG operum minorum. fasc. I. p. 1.

(2) Observationes practicae circa inoculationem variolarum in neonatis institutam. Vindob. 1768. 8.

(3) Aanmerkingen over de Inentinge der Kinderziekte. Leeuwarden 1770. 8.
 (4) Dissert. de emolumentis et optima methodo insi-

(4) Dissert. de emolumentis et optima methodo insitionis variolarum. Groning. 1774. 7. (5) Essays, medical and experiment. p. 339.

(6) De methodo medendi variolis hactenus cognita, saepe insufficiente, magno pro inoculatione argumento. V. ratisl. 1761. 8.

(7) Ad TRALLES epistolam apologeticam responsio.

Vien. Austr. 1764. 8.

vero Tralles mostrossi troppo condiscendente, allorche approvò il ritorno del vajuolo naturale dopo l'innesto e i pericoli più frequenti tra gl'innestati (t). Dan. Gugl. Triller macchiò se stesso non poco, dando alla luce contro l'inoculazione un pocua assai grossolano e privo di ognidea originale e ragionevole (2). Un altro laglese per nome Gio. Andrew attaccando de ll'aen, dimostrò quando a torto si calcoli minore il pericolo e il danno del vajuolo naturale: in confronto dell'artificiale, e narrò d'aver egli abbracotata la pratica dell'inoculazione fin dal 1741 (3).

152. Se a Vienna De Haen mise in opera ognisforzo per impedire l'inoculazione, anche in Berlino ne farono ritardati gli ayanzamenti da alcuni casi sfortunati, che aveano preoccupato sfavorevolmente l'opinione dei medici e del pubblico. Nel imese di Giugno del 1765. Gio, Fed. Meckel esegni l'innesto sopra i figli del ministro de Hors.. O che il vajuolo naturale fosse già pressimo allo sviluppo, o che vi abbia contribuito la stagione troppo calda, voltrechè venne stabilito un regime dietetico interamente opposto alle regole di Sutton; amendue gl'innestati morirono. Non ottenne miglior successo il cel. F. G. L. Muzell, a c'uli 'tra s'i innestati me morirono tre, e di un altro fa pericofosamente annualato (4). Un tale avvenimento non

⁽¹⁾ Vexatissimum nostra actate de insitione variolarum vel admittendu vel repudianda argumentum. Fratisl. 1765. 8.

⁽²⁾ L'inoculazione asaminata. Francf. 1766. 4.

⁽³⁾ Practical of inoculation, impartially considered, Exeter 1765. 7.

⁽⁴⁾ Voodwille p. 290. Anche il nostro cel. Eber al ne su testimonio oculare.

petè a meno di convalidare i pregiudisi contro l'inocularione. Ora G. G. G. Mohsen, come organo dei medici di Berlino, cecitò nuovi sopetti intorno al muovo metodo e cercò di rendersi benemerito colla traduzione di Rast (t). Intanto Gugl. Baylies, medico Inglese dimorante Dresda, era stato invitato nel 1774 a Berlino per inoculare alcani individui delle famiglie più ragguardevoli. Non riscoutrò la menoma conseguenza perioclosa in diciassette di questi innesti, e dimostrò quindi esattamente la diversità del vajuolo vero dallo spario (2). Eransi git veduti anche per l' addictro molti esempi di vajuolo falso comparso accidentalmente depo l'innesto; e fra gli altri ne aveano riportati Ant. Timoni (3) e Aug. Arr. Wrisherg. (4).

La facoltà medica di Lipsia, erasi dichiarata già fino dal 1761 a favore dell'inoculazione (5). E quando Carlo Crist. Krause trovò in questa il pericolo d'infesion generale ebbe la mira di raccomandare ch' essa venisse generalmente operata, ond'effettuare una simultanea ettirpa-

⁽¹⁾ Esperienze per determinare più esattamente i pregj e vantaggj dell'inoculasione del vajuolo. Lubecca e Acrl. 1774-1775. 8.

⁽²⁾ Notizie dell'inoculazione del vajuolo eseguita in Berlino, trad. dall'Ingl. da KRUNTE. Dresd. 1776. 8.

⁽³⁾ Dissertation sur l'inoculation de la petite vérole. Vienn. 1762. 4.

⁽⁴⁾ De insitione variolarum nonnulla momenta. Gott. 1765. 4.

⁽⁵⁾ Ludwig adversaria med. pract. vol. I. p. 119.

sion del vajuolo (1). Fed. Casim. Medicus cercò di arrivare a questo scopo proponendo nel momento dell' erusiome, del vajuolo naturale o artificiale i rinfrescanti e la china, onde impedire la suppurazione, durànte la quale si
sviluppa il miasma (2). Ma il progetto di Maret sembrò
assai più commendevole e più facile. Egli dimostrò , quanque ra malagevole l'estinzione finiversale di tal malatita,

che l'unica spediante di scentare in à fatte circostanze il pericolo e le stragi derivanti dalla medesima
consisteva nel renderla più benigna mediante l'inoculazione (3).

Amo-o e compinto trattato dell'incontazione (4) Serisse a famo-o e compinto trattato dell'incontazione (4) Serisse a faralle rimproverendogli la isoverchia sua condiscendenza verso de Haen, contro la cui opinione risulta evidentemente che nell'epidenie vajuolose ne muojono da diesi fine a aquaranta per cento, mentre all'ingontro tra gl'inoculati ne muore appena uno in quattrocento. Confutò poi il riterno del vajuolo naturale prendendo in considerazione la comparsa del vajuolo spurio.

L'egregio medico Seh, Fed. Ben. Lentin limitò alcune asserzioni di Dimsdale; p. e. che gl'innestati non possono venir sorpresi dal vajuolo naturale tra l'operazione e

⁽¹⁾ Diss de variolarum extirpatione insitioni substiuenda. Lips. 1762. 4.

⁽²⁾ Lettera interno all'estirpazione del vajuolo. Fref. e Lipsia 1763. 8.

⁽³⁾ Memoire sur les moyens à employre pour s'opposer aux ravages de la variole. Paris 1780. 8.

⁽⁴⁾ Lettere intorno all'inoculazione dedicate al Parlamento di Parigi, vol. I. II. Altona 1765. 1766. 8.

lo sviloppo; e che il regime rinfrescante e l'aria libera anziche nuocere , possa giovare in qualsisia stagione (1): Anche C. G. Wagler partigiano di Gatti lodò cotanto que st'ultimo metodo , che ordinava i bagni freddi perfino ai neonati dal primo giorno dell' operazione fino al quattordieesimo, ed eseguiva l'incisione in un luogo non confacente cioè tra l'indice ed il pollice (2). Parimenti G. F. Ackermann raccomandò colla stessa inavvedutezza l'aria fredda, qual rimedio sicurissimo per prevenire la sopravvenienza di sintomi gravi nel vajuolo artificiale (3); e L. F. Schroeter abbracciò interamente il metodo di Gatti e di Wagler (4). Ando più circospetto Gio. Andr. Murray . il quale additò alcune eccellenti regole sal proposito e riconobbe imparzialmente i difetti dell' innesto di Sutton (5)2 Ne di rado accadde che per aver fatto l'innesto con miasma d'indole incerta sviluppossi un erazione di vajuolo spurao , mentre il vero non si manifestò che naturalmente dopo un lungo intervallo di tempo. C. F: Elsner (6); C. L. Hoffmann (7), C. Gugl. Hufeland (8), e Ant. Gio.

(1) Supplimenti per la medicina pratica, p. 35-65.
(2) Nuove osservazioni di Gatti ec. pubblicate da C.

G. Wigles. Amb. 1772. 8.

(3) De insitione variolarum commentatio epistolaris.

Gott. 1771: 8.

(4) Breve istruzione sul metodo attuale d'innestare il

vajuolo. Brema 1773. 8.

(5) Opusc. vol. I. p. 345.

(6) Del vajuolo e dell'inoculazione. Regiomonte 1787.3.

(7) Trattato del vajuolo, P. II. Magonza e Munster 1789. 8.

(8) Riflessioni sul vajuolo naturale e artificiale a Weimar. Lipsia 1789: 7: Rechberger (1) hanno confermato una si interessante osser vazione, e contribuito a far viemmeglio conoscere i diversi metodi e l'importanza dell'inoculazione.

154. Nalla Svizzera, dove un Haller ed un Tissot promuovevano con tutta la loro attività e dottrina l' inoculazione, essa trovò minor resistenza che nella Germania el nella Francia, Mieg , Rahn , Sulzer , Schinz e Scherb deserissero nel 1766 la serie de loro felici innesti (2), e Jac. d'Apples provò con nuovi esperimenti che l'operazione riesce meglio coll'incisione che coi vescicanti (3). Salom. Schinz esaltò i pregi del metodo di Sutton e di Dimsdale (4), e Gio. Crist. Scherb preferà a torto l'applicazione del mezereo (5): Vincenzo An l. Levizzari medico di Chiavenna ebbe il merito d'introdurre l'inoculazione nella Rezia di quà dell'alpi (6). Nell' Olanda, dove fra gl'inoculatori si distinse specialmente Pietro Camper . Dryfhout avea già rilevato, che se dopo l'innesto non compariscono generalmente le pustole, ma si sviluppa soltanto la febbre vajuolosa, questa basti per prevenire una scconda infezione (7). De Monchy, cui la morte involato

⁽¹⁾ Storia compiuta dell'inoculazione in Vienna, ini 1788. 8.

⁽²⁾ Atti della società fisica di Zurigo, vol. III. p. 23-266.

⁽³⁾ Acta helvet VI. p. 194.

⁽⁴⁾ Lett. al sig. de Stoerk interno all'inoculazione del vajuolo. Zurigo 1773. 8.

 ⁽⁵⁾ Dell' inoculazione del vajuolo. Zurigo 1779. 8.
 (6) I primi felici successi dell' inoculazione nella Re-

sia ec. Lugano 1764. 8.

(7) Atti della società delle scienze di Haarlem, sol.

VI. p. 445.

avea un figlio innestato , di che fa cenno con indegna cultanza de Haen , asserisce e dimostra che la cagione si fu un impsoviso raffreddamento (1). Huck (2) e Mart. Gugl. Schwencke biasimarono ogni preparazione, e quest' ultimo ripetè il ritorto del vajuolo naturale da difetti dell'innesto (3), confutando per tal modo Van Doeveren, il quale risguardava le notizie di sì fasta sopravvenienza, come argomenti contrari all'inoculazione (4). P. van Voensel lodò altamente durante l'eruzione del vajuolo artificiale l'aso del mercurio dolce (5).

155. I romori suscitatisi a Parigi intorna all'inoculazione mossero tre coclesiastici florentini, Adami, Berti e Veraci a pubblicare sopra quest' argomento il loro parret teologico. Tutti e tre si dichiararono unanimemente l'avorevoli al nuovo metodo (6). Saverio Manetti uno de' principali difensori dell'inoculazione cercò di dimostrare la perfetta innocenza del vajuolo artificiale, ed attribui le conseguenze funeste del medesimo alle circostanze accidentali, che sovente vi sopravvengono (7). Gio. Stefano chirurgo introdusse l'inoculazione nella Corsica l'anno 1765 (8),

(1) Ivi vol. VIII. fasc. 2. p. 267.

(2) Journal de médecine, to. XXVIII. p. 160.

(3) Lettera al sig. Eduardo Sandifort 1770. 8.

(4) Aut della società delle scienze di Haarlem, vol. XII. p. 189.

(5) Nuove esperienze sull uso del mercurio dolce nel rejuolo. Lipcia 1783. 8.

(6) Tre consulti fatti in difesa dell'innesto del vajuolo da tre dottissimi teologi toscani. Milano 1763. 4.

(7) Dell'inocular ione del vajuolo. Firenze 1761. 4.

(8) Comment. Lips. vol. XIII. p. 541.

é Mic. Sarcone espose nuovamente il piano proposto da altri di estirpare interamente il vajuolo col mezzo di speciali stabilimenti di contunacie (1).

Nella Svezia l'inoculazione fu universalizzata, specialmente da Dav. Sculze, o protetta singolarmente da. Rosen di Rosenstein, il quale combatte le obbiezioni e difficoltà insortevi contro la medesima, e raccomando come medicamento preparatorio alcune pillole di canfora come medicamento preparatorio alcune pillole di canfora comercurio dolce (3). E impero Russo è debitore di a importante scopetta all'esempio della corte. Fin dal 1772 estieva glà un istituto speciale in Irkutzk nella Siberia (3); é contemporaneamente G. G. Eisen rispettabile ecclesiastico della Livonia pubblicò un'istruzione popolare intorna al metodo di Sutton (4), mentre G. G. Grot altro ecclesiastico della Curlandia trattava sovente dello stesso sogetto nelle sue prediche (5).

Tenet diede alla luce nel 1764 i suoi calcoli sullo stato dell'inoculazione dell'America, e provò che di 438, innestali era morto uno solo (6). Gio. Quier introdusse nella Giammaica il metodo di Sutton, ma senza premettervi alcuna preparazione, e trovò che anche i negri am-

⁽¹⁾ Del vajuolo e della necessità di estirparlo, tradidall' Ital. Gott. 1782. 8.

⁽²⁾ Underratelse om barns sjukd, p. 186.
(3) Comment. Lips. vol. XVIII. p. 723.

⁽⁴⁾ L'inoculazione del vajuolo facilitata ed affidata alle madri. Riga 1774. 8. Continuazione, ivi.

⁽⁵⁾ Feb. Olesko saggj intorno all'inoculazione. Halla 1791. 8. p. 130-138.

⁽⁶⁾ Woodwille. I. c. p. 279.

malaticei superano facilmente il vajuolo artificiale (1). Tombi-Bond riferì gl' innesti eseguiti a Filadelfia., e biasimò ilmetodo di Gatti, perchè rendendosi necessario del miasma recente, l'individuo da inocularsi, si ccome dee trovarsi vicino al vajuoloso, corre pericolo d'incontrare l'infezion naturale (2).

La Spagna fu quasi l' ultima a godere di un tal benesizio. Ant. Cap. de Villa medico a Tovarra presso Valenza ne istitui con felice successo il primo esperimento sopra un bambino, e volca quindi dare alla luce un opuscolo per far pienamente conoscere gl' immensi vantaggi di questa pratica. Ma la censura negò il permesso della stampa , perchè l'autore avea fatto menzione d'un certo professore eretico medicorum princeps (3). Quantunque non possa essere stata ignota al volgo ne dintorni di Sadrigue la rozza inoculazione tuttavia gli Spagnuoli non la conobhero esattamente fino al 1771, allorquendo Mich. Gorman, ripatrio da Londra, dove l' avea appresa (4).

156. Pongo fine al presente articolo con un breve cenno dell'inoculazione dei morbilli tentata per la prima volta nel 1757. da Franc. Home medico di Edimburgo sopra dodici fanciulli, applicando della bambaja intinta nel sangue dei morbillosi ad una piccola incisione sul braccio, dalla quale vi avea lasciato sortire alcune gocco di sangue. Egli assicura che fuori della lagrimazione e del frequente sternuto non è sopravvenuto alcun sintoma di

⁽¹⁾ Medic. transact. vol. II. p. 366.

⁽²⁾ Difense de l'inoculation; Strasb, 1784 8.

⁽³⁾ Notisie letterarie di Gottinga, a 1766. p. 838. 839. (4) WOODWILLE P. 295.

conseguenza, nemmeno la tosse (s). Tissot non impugnò i vantaggi di sì fatto metodo, ma suggerì di sperimenarlo movamente in uno spedale (a). Intanto contemporaneamente ad Home, Aless. Monro propose di eseguire sì imesto cogli umori sierosi, colla saliva o colle lagrime dei morbillosi (3). Parecchi Inglesi opposero delle obbiezioni e dei dubbi all'esperienze d' Home, ned è per anco dimostrato incontrastabilmente il passaggio del miasma morbilloso nel sangue, quando anche seguendo l'opinione di Dubosq de la Robordière non si volesse calcolare il ritorno dei morbilli nel medesimo soggetto (4).

IV.

Taumaturgia medica e Ciarlataneria.

157. Ho indicato dovanque nel corso di quest'operay, che i tentativi dello spirito unano per la ricerca della venità sono stati costantemente accompagnati da effetti di superstizione e d'impostura, e specialmente ho spiegato l'arte impiegata in certi tempi dagli amiei delle tenebre e dell-l'ignoranza nel dare un aspetto scientifico al fanatismo y d'onde nel quarto e quinto secolo ebbe origine quel tristo sistema di teosofia o taumaturgia, che dopo aver do-

⁽¹⁾ Medical facts and expesiments, p. 268. Lond. 1758. 8.

⁽²⁾ Avis au peuple sur sa santé, ocueres compl. vol. II p. 254.

⁽³⁾ De senis lymphaticis valvulosis, p. 58. Berol. 7157. 8.

⁽⁴⁾ Journ. de mèdec. 10m. XVIII. p. 254.

minato nel medio evo, venne coltivato da Paracelso, diffuso dai Roseo-crociati, e conservato fino alla metà del secolo diciassettesimo. Tuttavia i due ultimi secoli non andarono esenti da sì funesta tendenza all'entusiasmo ed alla superstizione d'ogni genere. Non mancarono, è vero, ed epoche e contrade, dove il governo e le scuole godevano e spargevano lumi, e dove per conseguenza il fanatismo non potea in verun modo sollevare il capo. Ma approfittò esso accortamente d'ogni debolezza dei reggenti e d'ogn'idea ecentrica delle scuole per riacquistare il suo antico dominio e per assoggettare di bel nuovo al suo scettro di piombo lo spirito umano. Tropp' oltre mi dilungherei , e soverchia noja arrecherei al lettore , se minus tamente riportar volessi tutti i progressi e le vicende del fanalismo non solo presso i cattolici, ma eziandio presso gli eterodossi, e gli avanzi dell'incauta adesione alle antiche superstiziose consuctidini ed opinioni durante quest'ultimo intervallo. Non ne toccherò adunque che alcuni punti principali , e mi limiterò alla storia delle malattie demoniache, delle guarigioni miracolose e di altre ciarlatanerie mediche, in ispezialtà di quelle, oh'ebbero luogo nel secolo decimottavo.

158 Malgrado gli sforzi dell' egregio filantropo Crist, Tommasio (1), la oredenza delle malattie demoniache e delle guarigioni miracolose, si mantenni en Italia, nella Francia e nella Germania anche nel principio del secolo decimottavo. L' opera di Gr. Fed. Garmann de miraculis mortuorum fu per coà dire il codice di queste pazzio (2). Qui trovasi la relazione più circostanziata dei vampiri,

⁽¹⁾ Storia della medicina , Sez. XII. S. 1.

⁽z) De mir, mort. Lipsiae 1670. 4; Dresd, 1709. 4.

c'oè di que' cadaveri, che rimasti intatti girano attorno, e succhiano il sangue a coloro che dormono o li uccidano, e di altri cadaveri che mangiano sin anche se stessi. detti perciò nella Polonia e nella Prussia upiera (1). Gli Ungheri ed i Serviani, conservarono più a lungo la credenza di tali vampiri (2), la quale su combattuta e confutata per la prima volta da Franc. Ant. Ferd. Stebler protomedico a Monaco (3). Gli annali di Blegny contengono un trattato di autore anonimo intorno agli spiriti folletti, ossia fantasmi vaganti risguardati come cagione immediata delle malattie epidemiche (4). Anche Gio. Westhal membro dell' accademia dei curiosi della natura descrisse la malattia convulsiva d' una fanciulla tenuta per ammaliata, repetendo la corruzione degli spiriti vitali dall'influenza della strega (5) ; è nella-stessa guisa viene considerata una simile affezione cui soggiacquero parecchi fanciulli de Annaberg nel 1713. (6).

159. I difensori della patologia superstiziosa aveano l'appeggio di seggetti, autorevoli eve valer poteva la testimonianza di Gio Wolf. Wedel e di Fed. Hoffmann. Il primo sopponeva senza riserva. l'esistensa di malattie demoniache, ogni qualvolta le forze dell'ammalato sern-

⁽¹⁾ Collez. di Bresl. a. 1722. Genn. p. 83.

⁽²⁾ WAGNER, supplime all antropologia filosofica, vol. II. p. 40.

⁽³⁾ Acta nature curios. v. IV. app. p. 89.

⁽⁵⁾ Pathologia daemoniaca. Lsp. 1707. 4.

⁽⁶⁾ Ragguaglio istorico dei fenomeni portentosi che si manifestarono in alcuni fanciulli di Annaberg. Chemnitz 1713. 8.

bravano oltre modo esaltate, o si sentivano dal medesimo espressioni in qualche lingua straniera, e simili (a). Hoffz, mann non esitò a credere, che il diavolo possa eagionare, negl' individui torniti di sangue denso, alcune malattie degli spiriti vitali, te quali si appalesano colle constulicomi (a). Secondo lui i contrassegni d'una malattia demoniaca consistono nell'improvviso sviluppo di violente spassionole negl' individui d'altronde sani, nell' apparena di forze sovraunare, i diicori in lingua straniera, le visioni e le profezie, le bestominie; l'evacuazione di sostanza mostruose od eteogenee, il vomito di chiodi, capelli, cera, vetto, e.c.

Parimenti Elia Camerario segui gli stessi principi nel giudicare le malattie d'incantenimo. Egli asseriza di avere me riscontrate uno poehe (3). Lange, mellico francese, serisse la storia d'una donzella y ch'egli riputò ammalista, perchè avea vomitato del cuojo ed estratto degli aghi dal-sa va pelle (4). Franc. Roncallo-Parolini derivò dell'ammaliamento, e dall'influenza degli astri la facoltà incantarice del corpo, l'invulnerabilità ossia fatagione (5). Del 17/8 un certo Gio. Gr. Rinder, predicatore in Apolda, fece stampare contro una pretesa strega un suo sermone;

⁽¹⁾ Diss. de morbo a fascino. Jens 1682. 4.

⁽²⁾ De polentia diabeli in corpora, opp. vol. V. p. 94. 103.

⁽³⁾ Dissertationes Taurinenses epistolicae XX. Tubingae 1712. 8.

⁽⁴⁾ Histoire de la fille malestere de Courson. Lisieux 1717. 12.

⁽⁵⁾ Dissertationes quatuer. Brix. 1740. 4.

dove la condannava al fuoco (1); e nel 1751. Gio. Storch (2) e Nic. Bocruer (3) sostenevano ancora l'esistenza dei fantasmi, la realtà delle comparse diaboliche; è simili altre fantonecrie.

160. In nessun tempo però, ed in nessun altro luogo menarono tanto romore a' nostri giorni le cure miracolose , ne più universalmente si diffuse mai la credenza delle medesime, quando allorche gli appellanti o Giansenisti della Francia pretendevano di provare con questo mezzo la verità della loro dottrina. Fino alla metà del secolo diciassettesimo (1656) celebravansi già le guarigioni operate nell'abbazia di Porto reale presso Parigi, da una spina della corona di Cristo. I personaggi più ragguardevoli (4) appoggiati ad una testimonianza dei chirurghi , non esitavano allora di credere, che una certa mad. Perrier fosse stata guarita interamente da una fistola lagrimale, mercè il contatto di questa reliquia. Tutto ciò però non fu che un preludio dei portenti avvenuti dal 1727 fino al 1732, ed anche dipoi, alla tomba del cel. Giansenista Francesco de Pâris. Quest'eroe della storia dei miracoli seppe a forza di digiuni, di mortificazioni spontanee e di opere misericordiose, procacciarsi tal fama di santità e mantenersi presso i Giansenisti colla sua costante resisten-

⁽¹⁾ Storia e gudizio di una strena. Jena 1743. 4. HALLER Diario vol I. p. 781.

⁽²⁾ Delle malattie delle donne, vol. VI. VII.

Gota 1751. 8.

⁽³⁾ Il medico de' bambini. Fref. e Lipsia 1752. 8.

⁽⁴⁾ Ocurres de Racine, vol. III.

za alla bolla Unigenitus una sì alta e canonica riputazione, che poco dopo la sua morte si spacciarono innumerevoli miracoli avvenuti sul luogo della sua sepoltura nel cimitero di s. Medardo nel sobbergo di s. Marcello (1), Pel corso di quattr'anni gli ammalati d'ogni genere, tostochè compiuto aveano la loro divozione nel cimitero, ovvero toccato le membra inferme coi pannelini del santo o con della terra del suo sepolero, riacquistavano la loro primiera salute, Nel 1731, cangiossi la scena. I divoti, che si recavano a visitare le ceneri del nuovo santo, venivano assaliti da convulsioni, le quali giovavano non solo a loro medesimi, ma li rendevano anche capaci di guarire gli altri. Codesti convulsionari profetizzavano la venuta di Elia e la conversione degli obrei; taluni si annunziavano come precursori di s. Gio, Battista, tolleravano le più lunghe astinenze, camminavano in mezzo alle fiamme senza punto pregiudicarsi, e talvolta sembravano morti per qualche tratto di tempo. Un sì fatto disordine propagavasi a guisa di malattia epidemica, di maniera che non solo il volgo frequentava a sciami l'accennato cimitero, ma altresì soggetti cospicui, e spiriti liberi, i quali per l'addietro deridevano i vantati miracoli, trovandosi presso il sepolero del santo, mutavano sentimento e diventavano altrettanti panegiristi del medesimo. Il che accadde a Carrè di Montgeron, consigliere del parlamento, il quale presentò al re stesso la sua opc-

⁽¹⁾ Vie de Mr. de Paris. Utrecht 1732. 8. Act. erudit. Lips. a. 1734, p. 532. — Goven. Less. della religione, della storia, scelta e pruova della medesima, v. II. p. 239, 767. 862. 601. 1785. 8.

ta interno a questi miracoli. (1), e venne dipoi privato della sua carica, perchè aveva attaccato con troppa forza i Genititi e la corte di Roma. Tuttavia molti risguata vano intto ciò per effetto d'una fantasia la più sfrenata o d'una frode la più indegna (2); e Pelluita trovandosi egli allora a Parigi ne assicura, che gli ammalati abbandonavano sovente il sepolero del santo nello stesso stato, nel quale vi crano andati (3).

Malgrado le opposizioni ed i contrasti dei Gesuiti, le mire politiche han fatto soppasiedere a tanti abusi, specialmente precibe il padamento era quasi tutto del aprici Giancenistico. Ma finalmente il, ce incaricò il cel, chirurgo. Salvate. Morand ed alcuni, altri membri della facoltà medica, di essuitazio sopra luogo attentamente questi pretesi miracoli e a darne immediatamente rapporto. Ora avendo risultato, che tutto era inganto, e che le convulsioni dipendevano da uno storzo della fantafa e della volomit (4) il re emanò li 27. Gennajo del 1732. l'ordine di chiadere il cimitero di s. Medardo, e di non permettere a chiechessia l'ingresso o l'avvicinamento al sepoleto.

⁽¹⁾ La verité des miracles openes par l'intercession de Mr. Paris et d'autre Appelluns, vols 1.3. Cologne 1746-1747. 4. V. Lass l. c.

⁽²⁾ Le naturalisme des conventions dans les maladies de l'épidemie consultionaire. P. 1-3 Soleure 1733. 4.—
Des Voux critique générale du livre de Mr. de Montgeron, vol. 1. 2. Amst. 1740: 8.

⁽³⁾ Memoires , vol. III. p. 39.

⁽⁴⁾ Procés verbaux de plusieurs médecins et chirurgiens, dressès par ordre de S. M. Paris 1732. 8.

di s. Francesco de Paris. Non cessò per questo il vaneggiamento de creduli e de' fanatici. Costoro , anche lungi
dal sepolero del santo, rivolgevano a lui i loro atti
divozione, e manifestavano le più orribili convulsioni; e
per agire con vienumaggior forza sugli animi del volgo ,
cominciarono a prestarsi vicendevolmente ed apparentemente i, con detti seccurs violent, crocifiggendosi, casciandosi nel petto le spade nude, facendo rotolare sopra se medesimi pesi immensi di pietre, e simili. Tai giucchi di mano però non d'ascinarono per lungo tempo gli acchi del
pubblico; perocche l'epidemia convulsionaria svanì nel
4735, e cadde ben presto in una perfetta e generale dimenticanta.

16; Rammentiamo ancora le recenti diavolerie del padre Gassner e del fam. Schroepfer di Lippia. Le cure miracolose, che il primo ha operato nella Svevia e nella Baviera, eccitarono dapprima l'attenzione de più scelu Tedeschi; ma dipot e nazionali e stranieri le considerato no per fatti reali; e certi teologi della riforma, fraquali il huon-Laveter, trovarono in tali avvenimenti una prova evidente della forra preponderante d'una fede la più sincera, e d'un vero spirito-di orazione.

Gio. Gins. Gassere-n. nel 1797; a Braz presso Bludenz nella dis la dalle Alpi, assicuta, che la sonoscenza della sua indisposizione e del continuo dolor di capo, da cui era tormentato, gli fece supporre un'o, rigine non naturale ma distolica delle see inferniti, c che quindi tentò sopra se medesimo di cacciare sì fatte tentazioni in nome di Gestì. Essendo viusciti i primi esperimenti, egli studio zelantemente le opere cattoliche intorno all'esorcismo, e lo praticò con felicie successo ne' suoi parrocchiani a Klosterle nella diocesi di Chaur. Nel 1715 dicela lalla fuce un trattato particolare, in cui sviluppò il

suo sistema demoniaco (1), distinguendo esattamente lo stato de' veri indemoniati (possessiones) da quello degli ossessi (obsessiones), e da quello dei circonsessi (circumsessiones) cioè aggrediti dallo spirito maligno, nei quali le malattie, quantunque eccitate dal demonio, conservano tuttavia l'apparenza naturale o si appalesano per lo più coi tremiti e colle convulsioni. Dapprima egl' impiegava i così detti praecepta probatoria, onde riconoscere se una malattia era naturale o demoniaca. Teneva dayanti agli occhi una croce e pronunziava una formola d'esorcismo, eccitando per tal guisa il demonio a cagionare il parossismo dell' affezione. Se in capo a tre esperimenti non si scorgeva alcun effetto, Gassner disimpegnavasi col dire, che la malattia era naturale, e che il demonio non vi esercitava la menoma influenza. Tormentava poi gl' individui soggetti a mali nervosi, procurando di occasionare i loro parossismi, e vantavasi d'averli guariti, allorchè terminando il parossismo medesimo, succedeva un totale esaurimento di forze.

Verso il fine del 1774. il nostro taumaturgo andò a. Moessburg, di dove fu espulso dal vescoro, perchè non esorcizzava secondo il rituale della Chiesa Romana (2). Pu indi richiamato nella sua diocisi; ma desiderato dal vescoro di Ratisbona, recossi ad Ellwangen, dove fu fat-

⁽¹⁾ Del modo di vivere saggiamente, divotamente e salutarmente. Kem. 1774. 8.

⁽²⁾ SEMMER colles. di lettere e memorie sugli esorcismi di Gassara e di Semonerera, vol. I. pag. 134 Halla 1775. 8. — Biblioteca Germanica universale, vol. XXVII. p. 918.

o cappellano di corte e referendario ecclesiastico, rando nello stesso tempo non poche delle sue guarigioni colle solite imposture, ed asserendo, che il demonio s'avea impadronito perfino dell' intelletto, ogni qualvolta ile risultato non corrispondeva alle sucintenzioni (1). Talvolta attribuiva l'infelice riuscita de suoi esorcismi e delle sue cure alla mancanza di fede negli ammalati (2), e sovente distribuiva anco le sue formole a stampa (3), facendo credere d'aver egli preservato i suoi compatrioti da una febbre maligna, che regnava nelle vicenanze della sua parrocchia (4). Siccome il nome di Gesù, e la ferma credenza bastavano per la salute degl' indemoniati, Gassner non esitò di esorcizzare anche gli eterodossi, senza chiedere dai medesimi una confessione di fede (5). Semler dimostrò insussistente contro Lavater la pretensione che avea Gassner di guarire le malattie colla sua fede, mentre i fatti già esposti non richiedevano che spiegazioni naturali (6). Bensì è rimarchevole che nei supposti ossessi i Gesuiti fossero contemplati come nemici capitali (7). Alcuni attribuirono al magnetismo le operazioni di Gassner; imperocchè costui durante il corso delle medesime, toc-

⁽¹⁾ Bibl. Germ. univers. 1. c. p. 601. - Semler 1. c. c. 215.

⁽²⁾ FRANK sistema di polizia medica, ool IV. p. 609. — SEMLER l. c. p. 227. — L'antimagnètisme, p. 217. Londres 1784, 8.

⁽³⁾ Bibl. Germ. univ. t. c. p. 618.

⁽⁴⁾ Isi p. 609. SEMLER p. 160.

⁽⁵⁾ Bibt. German. univers. l. c. p. 611.

⁽⁶⁾ SEMLER , L. c. p. 33. 230. 136.

⁽⁷⁾ Bibl. German. univers. l. c. p. 602, 616, 623

cava sovente colle mani il suo cingolo (1). Il p. Ferdinando Sterainger, teatino a Monaco, lo diehiaro un aperto ingannatore (2); ed altri raccontarono di lui, che si permettesse bene spesso dei toccamenti illeciti e libidinosi verso le donne, e che avesse accordato cento fiorini ad uno. il quale fingesse di esser morto per comparir da lui risuscitato, ma invece rimase soffocato nella bara (3). Finalmente il vescovo di Ratisbona ebbe ordine dalla corte imperiale di bandire dalla sua diocesi il p. Gassner, locchè avvenne appunto nell' autunno del 1775 (4). Anche l'elettore Palatino lo esiliò da suoi stati dove s'era rifuggito; e non andò guari, che l'arcivescovo di Praga, con una pastorale discoprì a'vescovi ed a'parrechi della sua giurisdizione i disordini e le frodi di Gassner, inculcando loro di tenersi guardinghi da simili abusi (5). Allora svanì la riputazione del taumaturgo, restando solo nella bibliografia medica i titoli di tanti oposcoli cui aveano dato origine gli avanzamenti di tanta diabolica ciarlataneria.

(5). Dall' altra parte la filosofia mistica di Crist. Ang. Crusius, professore nell'università di Lipsia favoriva tauto più una specie di fanatismo, quanto più strettumente essa attenevasi alle proposizioni del luteratismo primitivo e pretendeva di rilevane il vero senso delle visioni dell'apocalisse. Codesto genere di filosofia dominiavatteni anni addietro in quasi tutte le uni-

⁽¹⁾ Ivi p. 624. - SEMLER p. 207.

⁽²⁾ Ivi p. 618.

⁽³⁾ Ivi tom. XXVIII. pag. 298.— Semes vol. II. p. 327.

⁽⁴⁾ SEMLER 1. c. pag. 318. — Bibl. Germ. univ.

⁽⁵⁾ Bibl. German. wrivers. v. XXVIII. p. 302.

versità della Sasionia. Dopochò Gio. Schroepfer co'uvoi artifici ottici emagici avea fatto perdere il cervello a molte per
sone anno ragguardevoli; Crusius non seppe ripetere la
nuova taumaturgia, senonchò dall' influenza immediata
d'un cacodemone (1). All' incontro Ernesti condamò al
meritato disprezzo questi supposti prodigi (2); laddove Mosè Mendelsohn (3) e Pietro Eberhard (4) gli spiegarono
per le vie naturali. Quest'ultimo conflutò nel modo il più eletato l' opera ellora comparsa di Ant. de Haen intorno alla magia (5); dove l' autore ripete e sostiene, riguardo
agl' indemoniati, quelle stesse supersitiose idee, che spacciavansi centocinquan' ami addietro, e riportar le favole
più assurde, finch' egli stesso esclama:

» Obstupui, steteruntque comae et vox faucibus haesit 4.

a into solo

163. La storia del magnetismo animale appartiene aucora, per quanto mi sembra, al titolo della ciarlataneria e taumaturgia medica, avvegnachè alcune dell' ultime espetienze sul-galvanismo, e i teoremi dei filosofi naturalisti tendeno a favorire di diversi punti di questo sistema.

Ho già accennato più sopra (§. 64.), che fino dal 1773. Ant. Messuer sperimento la calamita artificiale come rimedio contro parecchie malattie nervose. Fin d'allora egli estese l'influenza della forzà magnetica sopra tutta

⁽¹⁾ Semler, vol. II. p. 4-14. — Schroeffer carico di debiti s' ammazzò da sè stesso li 8, Ottobre 1774 a Rosenthal presso Lipsia.

⁽²⁾ SEMLER vol. I. p. 372-290.

⁽³⁾ Ivi vol. II. p. 67. 80.

⁽⁴⁾ Ivi p. 101-203.

⁽⁵⁾ De magia liber. Vindob. 1775. 8.

la natura, e la risguardò qual cagiona primitiva della connessione universale di tutti i corpi della natura, non che della gravitazione reciproca dei corpi celesti, e qual legame, che unisce tutti gli esseri terrestri, in ispezialtà l' uomo, colle masse infinite moventisi negl' infiniti spazi del cielo. Secondo lui, il fluido costituente il veicolo di questa forza non differisce punto dall' elettrico, s'accumula egualmente nel corpo umano, e quindi Messmer asserì di poter magnetizzare tutto ciò ch' ci poteva toccare in una certa maniera. Anzi si credette anco capace di produrre colla sola sua volontà, senza il menomo toccamen, to, negli ammalati, degli effetti perfettamente simili a quelli cagionati dalla calamita artificiale. Voleva poi che la sensazione del magnetismo avesse origine e fine colla malattia, e quindi cercava di suscitare nel microcosmo ine ermo un flusso e riflusso simile a quello del mare, ondoccasionare per tal modo degli effetti salutari (1).

Scorgesi a prima giunta, che una tale teoria è in atto quella esposta dai teosofi dei primi secoli, e in seguito nel secolo diciassettesimo da Rob. Fludd. da Seb. Wirdig, da Val. Greatrake, da C. Dighy e da Gugl. Maxwell (2).

Quantunque Messmer lo negasse, si sa tuttavia, che egli nelle sue operazioni si servi costantemente della calamita artificiale fino al 1776. La guarigione da lui operata nel 1774 di una giovane chiamata Oesterlin, soggetta

⁽¹⁾ Messmen, breve storia del magnetismo animale, pag. 38. Carlsruhe 1783. - Memoire sur la découverte du magnetisme animal, p. 16. nel Recueil des pièces plus interessantes sur le magnet. anim. 1784, 8.

⁽²⁾ Storia della medicina , Sez. XIII. §. 6.

frequentemente alle convulsioni, menò gran romore, ed eccitò l'attenzione d'Ingenhous e di Stoerk. Il primo benchè dapprincipio persuaso del passaggio della forza magnetica negli ammalati, divenne tuttavia in progresso il
più forte per avversario di Messmer (1). Questi poi lagnasi del secondo per non aver pottuo tutene dal medeino,
che fosse eletta una commissione, e per aver egli considerato cou troppa indifferenza e freddezza l'esperienze instituite in uno spedale di Vienna sotto gli occhi di Reinlein (2).

164. Nall' anno 1775 mandò alle accademie più rinomate una lettera, in cui sviluppò i suoi principi e diede ragguaglio delle sue cure magnetiche. La sola accademia di Berlino l' onorò di una risposta, la quale certamente nol soddisfece. Si sostenne, che i fenomeni, quai riscontransi negl' individui attaccati da afficioni nervose, danno prove troppo incerte della forza magnetica; che la suscettibilità del magnetismo animale non dovrebbe cessare colta malattia, e che la comunicazione di questa forza magnetica e tutti i corpi è contraddetta da tutte le leggi della natura a noi note (3). G. T. Klinkosch opinò, clièsendo veri i fatti, non si porrebbe a meno di arguire la comunicazione, d'una forza elettrica, anzichè magnetica;

⁽¹⁾ Recucil des pieces les plus interess. p. 23.

⁽²⁾ Ivi pag. 27. - Breve storia del magnet. anim.p.29.

 ⁽³⁾ Histoire de l'acad. royale des scienc. à Berlin,
 a. 1775, pag. 33. - Bibl. German. univer. tom. XVI.
 p. 160.

e si adoprò di provare la sua asserzione con esperimenti eseguiti coll'elettroforo di Volta (1).

In quell'anno medesimo Messner fece un viaggio per la Bayiera e l'Austria superiore magnetizzando dappertutto col semplice contatto, o senza questo colla direzione delle sue dita. Instituì varie esperienze alla presenza del-Feltetor di Bayiera, e dichiarò effetti del magnetismo le guarigioni di Gassner, delle quali parlavasi ancora cominuamente e per ogni dove in que paesi (2). Attorno a quest'epoca guari il prof. Bauter di Vienna da nn'ostinata ottalmia, e nell'auno seguente il direttore dell'accademia delle scienze di Baviera, Osterwald di Monaco, da una paralisi. Contemporancamente cominciò la cura della gio-vane Paradis già perfettamente amaurotica fin dall' età di tre anni in ambedue gli occhi, e affetta sovente da convulsioni ne muscoli degli occhi medesimi (3).

Messmer riferisce diversamente da'suoi avversaj la totria di questa cura , l' ultima e la più famosa , ch' egli abbia intrapreta in Vienna. L' ammalata, secondò la te-simonianza dei di lei genitori unita alla relazione dell' attore, fu consegnata come interamente cieca al magnetista nel giorno zo di Gennalo, e scorgeva già chiaramente gli eggetti si nove di Febbrajo. Messmer-afferan, che Stoerke il vice-Presidente della facoltà medica di quella capitate sono stati presenti ad un' esperienza conì fortunata, e che essendosi suscitata dell' invidia contro di lui , Ingenhousa, l'ocnlista Barth e Stoerk hanno fatto intendere ai genitori della paziente, ch' essa nè vedeva nè avrebbe potuto

⁽¹⁾ Alli d'una società privata della Boemia, vol. II.

⁽²⁾ Recueil eit. p. 32.

⁽³⁾ Ioi p. 34.

mai vedere, e che correva rischio di perdere la pensione ottenuta dall' imperatrice, tostocchè si spargesse o si verificasse la notizia della guarigione. Laonde colla maggior inciviltà e indiscretezza i genitori vollero riavere presso di sè la loro figlia, la quale pegli affanni e spaventi sofferti , non che pel cattivo trattamento della ritornò cieca come per l'addietro. Tuttavolta Messmer in capo a molte manipolazioni arrivò a farle riacquistare la vista, quantunque Stoerk abbia osato scrivergli li 2 di Maggio del 1777, che dovrebbe por fine una volta a tanto inganno. Esacerbato dal procedere indegno della facoltà , dall' ingratitudine dei genitori della Paradis, prese finalmente la risoluzione di abbandonar Vienna e di recarsi in Francia. Nè certamente il Governo Austriaco lo bandi dai suoi stati, mentre anzi il ministro degli affari esteri lo muni di una commendatizia per l'ambasciatore imperiale di Parigi. Tale è il racconto di Messmer, di cui convieu dire che se non è vero, sembra tuttora fornito della maggior verisimiglianza (1).

All'incontro gli avversari di Messmer riferiscono, che avendo menato gran romore in Vienna la sua pretensione d'aver ridonata la vista all'infelice Paradis, l'imperateice nominò una commissione speciale, per l'esame di tale emergente. La cieca presentatasi a questa commissione rica appalesò alcun moto nella pupilla, ma riconobbe i colori fino a tanto che ebbe vicimo Messuer. Avendo però questi dovuto partire, ella non distinse più verun colore, ed ingananta dai segni precedenti s'immaginò che la vista consistesse nella comunicazione e cognizione dei medesini. Frassesses nella comunicazione e cognizione dei medesini. Fras-

⁽¹⁾ Ivi p. 38, 48, v Breve storia del magnet, anim. p. 36- 39.

tanto la commissione rassegnò all'imperatrice il suo rapporto, dopo il quide Messmer fu costretto di partir da Vienna entro lo spazio di 24, ore (1). Sia wara o no la relazione degli avversari, certo è ch'essa racchinde certe circostanze inverosimili, che qui non importa di dilucidars.

165. Messmer recossi a Parigi nel mese di Febbrajonel 1778. Da principio egli non volle ivi assumere alcuna cura, specialmente perchè i letterati non sembravano molto disposti ad immischiarsi nelle sue teorie; e perchè le Roy fra gli altri attribuiva all' immaginazione tutti gli effetti magnetici, che si riscontravano o si manifestavano negli ammalati. Pare inoltre, che gli mancassero soggetti, i quali si sottomettessero di buon grado al di lui trattamento. La facoltà e la società medica aveano proposto di nominare una commissione per prendere in esame il di lui metodo e sistema. Ma egli ricusò di assoggettarsi ad un tale sperimento, perchè questo lo comprometterebbe verso il pubblico qual cerretano o venditor di segreti, e perchè i dotti assai difficilmente giudicar potrebbero di un sistema, che dà di cozzo a tutte le opinioni dominanti (2). Nel mese di settembre dello stesso anno imparò a conoscere d'Eslon, medico del conte d'Artois, e membro della facoltà medica, col quale strinse amicizia istruendolo della sua teoria e del suo metodo (3). La conoscenza di questo

⁽¹⁾ G. L. HOFFMANN, magnetiste, p. 17. 18. Francf, e Magonza 1787. 5. Dopper, del magnetismo animale. p. 15. Breslavia 1785. 8.

⁽²⁾ Lettre de Mr. Messer a Ms. Vicq-d'Azyr et a MM. les auteurs du Journal de Parss, pag. 16. Bruxell, 1784. 8. - Breve storia del magnet, anim. p. 66. 120.

⁽³⁾ Ivi p. 130. 332.

individuo della facoltà medica, ch' si poteva risguardare come un suo scolaro, lo mimò a pubblicare una memoria, in cui, oltre l'apologià della sua condotta in Vienna, espose 26 proposizioni, le quali comprendono i punti più essenziali del suo sistema (1).

Tali sono i seguenti: 1. Avvi un'influenza reciproca tra i corpi celesti, la terra e i corpi viventi. 2. Il veicolo o mezzo di tale influenza è il fluido universale che penetra e circonda tutto (l'etere di Newton). 3. Essa agisce secondo leggi meccaniche, ma finora ignote. 4. Cagiona degli effetti reciprochi rassomiglianti al flusso e riflusso, 5. Le proprictà della materia e dei corpi organizzati dipendono da questa influenza reciproca. 6. Codesto agente opera immediatamente sui nervi, e produce nel corpo umano dei fenomeni analoghi a quelli occasionati dalla calamita. Anche nel corpo dannosi poli diversi ed opposti, 7. La proprietà del corpo animale, per la quale esso diventa suscettibile di questo agente universale, chiamasi magnetismo animale passa con incomprensibile velocità da un corpo in un altro, vivente o non vivente. q. Agisce ad una considerevole, distanza senza aver bisogno d'alcun corpo intermedio. 10. Viene riflettuto da uno specchio, come la luce. 11. Il suono lo fortifica, lo diffonde e lo comunica. 12. Alenni corpi viventi posseggono una proprietà affatto opposta al magnetismo, talchè la loro presenza distrugge tutti gli effetti del medesimo.

⁽¹⁾ Memoire de Messmer sur la decouverte du magnet. anim. 1779. 9. Breve storia ec. p. 150. Herrier lettres sur la découverte du magnet. anim. p. 29. Pekin 1784. Recueil des pièces les plus interess. sur le magn. anim. p. 56.

13. Anche questa forra contraria è suscettibile di accumulamento e di propagazione, penetra egualmente tutti i corpi, e cossituisce per conseguenza una forra positiva: 14. Parimenti la calamita è capace del magnetismo animale, differisce essenzialmente dal minerale. 15. Col mezzo di questo principio si possono guarire direttamente le malattie nervose, e indirettamente tutte le altre; esso spiega gli effetti de' medicamenti (1), e cagiona le crisi. 16. Mercè questo principio il medico riconasce le malattie anche le più complicate; e per tal modo la medicina può essere portata al più alto grado di perfesione:

Un sistema di tal fatta non poteva certamente trovare nè a Parigi, nè altrove l'approvazione. Quantunque Ant. Beugman abbia dimostrato nello stesse tempo l'azione del magnetismo minerale sopra innumerevoli corpi della natura (a), nei quali cransi seoperte fin allora delle particelle ferruginee; ciò non giovò punto alla teoria di Messmer, perchè questi enunciò il magnetismo minerale como interamente ed essenzialmente diverso dall'animale.

Frattanto parecelii ammalati accorrevano da Messner; e d'Eslon volle far conoscere vienmaggiormente un tale sistema. Invitò quindi dodici medici di Parigi per

(1) A questo proposito ecco come si esprime l'antimaguelsime, p. 95. a Si on demande aux partisans de Messmer: Quare opium facit domine il si ne repondent pas comme Molière: Quia iu eo est virtus dormitiva, mais un adept magnetisant nous répondra: Quia in eo est virtus magnetica a doctorissimo Messmero nuper deconverta ».

(2) A. BRUGMANS, il magnetismo. Leiden 1778. 4.

comunicar loro la teoria di Messmer, e persaverli testimoni delle sue guarigioni. Ma tre soli comparvero, cioò Malloet, Bertrand e Sollier de la Romillais, i quali tuttavia rimasero poco contenti, 'mè prestarono 'alcuna credenza a queste cure miracolose (1). Nell' anno seguente d' Eslon pubblicò le seo esservazioni, e i rinsultati delle istrutioni vocali avute 'da Messmer (2):

« Come non avvi che una sola natura, una sola vi-« ta, una sola salute, così non si da che una sola ma-« lattia; un solo rimedio, una sola guarigione. La sani-« tà dell' uomo sussiste finchè si conserva regolare l'azio-« ne della natura ; ma insorgendo degli ostacoli contro di « esse, la natura si sforza di saperarli, d' onde succedoa no le crisi, le quali risultano o salutari o nocevoli, « secondo l'esito felice od infelice per la natura. I medi-« ci hanno apposto un nome particolare a ciascuno di « questi fenomeni o accidenti morbosi, e gli hanno di-« chiarati altrettante malattie. Gli effetti sono innumere» « voli , ma la cagione è sempre la stessa ; e i medicaa menti, per quanto sieno differenti, producono sempre « lo stesso effetto. Tutte le guarigioni dipendono dalle cri-« si ; e negli epilettici fa di mestieri occasionare i paros-« sismi per guarirli. Il massimo vantaggio del magnetis-« mo animale consiste nell'acceleramento delle orisi, sen-« za che per ciò si corra aleun pericolo, »

166. Nella comparsa di quest'opera, la facoltà medica si sentì gravemente offesa da uno de'suoi niembri. Roussel de Vauzesmes recitò ai 18 di settembre del 1780;

⁽¹⁾ Breve storia del magnetis. anim. p. 162.

⁽²⁾ Observations sur le magnetisme anuntal. Paris 1786. 8.

in una púbblica sessione della facoltà , un atto di accusa contro d'Eslon; il quale si giustificò , e propose alla facoltà di sciegliere un dato numero di ammalati , riservando a se stesso di curarne la metà, ed affidando l'altra metà a Messmer, onde col confronto dell'esito, si potesse giudicare del nuovo metodo. Tuttavolta la facoltà rigettò il progetto, proibi a d'Eslon di parlare nelle di lel sessioni per un anno intero, e gli minacciò di cancellarlo dalla lista de suoi membri, se frattanto non ritrattasse i suoi principi intorno al magnetismo animale (1).

Allora Messmer e d'Eslon procurarono di farsi co-

noscere alla corte , coll' appoggio di de Lasone , primo medico del re. Messmer chiedette di nuovo testimoni delle sue cure, ma non gli piacquero punto i soggetti nominati da Lasone, sicche ai 15. aprile del 1781. sembro quasi in procinto di abbandonare la Francia. La regina , che lo conosceva per mezzo della moglie dell' intendente reale La Porte, lo fece persuadere di trattenersi, assicurandogli una pensione di 4, oco lire coll' obbligo d'insegnare costantemente il suo sistema a tre medici nominati dal Governo. Ma nemmeno questa condizione su accettata (2). A ciò s'aggiunse, che d' Eslon, cui Messmer era debitore di un' amicizia non interrotta di tre anni, si allontanò dal suo maestro, tostochè si credette in istato di continuare da sè, e indipendentemente da lui le cure magnetiche. Codesta separazione diede origine alla più fiera inimicizia tra amendue, dimodochè Messmer pieno di rancore e di noja, ritirossi a Spa, dove visse per qualche

⁽¹⁾ Breve storia del magnet. anim. p. 351.

⁽²⁾ Ivi p. 389.

tempo (1). Ma i di lui amici di Parigi aprirono una sottoscrizione perchè potesse ritornare, e instituire una suotoscrizione Ben presto si unirono 48. persone, fra le quali anche quattro medici; e ciascuna promise cento ungi d'oro per ayer l'istruzione, e giurò di osservare il più fedele silenzio. Non andò guari, che vi si associatolo, altri 55. individui sotto le stesse condizioni. La società prese il none dell'Ordine dell'armonia (2).

Messmer piantò una tinozza magnetica piena fino alla metà di acqua sollorica, e fernita di copertojo. Da alcumi fori di questo sortivano alcuni bastoni curvi di ferro, come conduttori del magnetismo, dai quali era pendente un cerchio, che si attaccava agli ammalati in qualche parte del lore corpo. Eglino sedevano in circolo attorno questa tinozza e poggiavano i piedi sopra una stoja di paglia, o formavano una catena toccandosi reciprocamente coll'indice e pollice d'ambe le mani. Nella camera destinata alla cura eravi altresà uno pianoforte, che veniva talavolta suonato durante la magnetizzazione (3). D' Eslon avea disposto un regolamento similissimo a quello di Mesmer. Sì l'uno, che l'altro godevano un gran conocroso; talmentechè, per quanto dicevasi, il secondo guadagnato

⁽¹⁾ Histoire du magnetisme en France, p. 16. Vienne 1784. 8.

⁽²⁾ Ivi 18. 19.

⁽³⁾ Rapport des commissaires, chargès par le Roi de l'examen du magn. anim. p. 4, 5. Paris 1784. 8. - Lettre DE FIGANO au comte ALMATYA sur la crise du magnet. cim. p. 10. Madr. 1784. 8.

aveva in pochissimo tempo 400, 000. franchi (1). Alcuni combatterono la nuova teoria, e fra gli altri un anonimo giudicà incongruente e ridicola la pretensione di voler deminare sul fluido universale esistente nella natura; e derivare tutte le malattie da una sola cagione (2). In generale però andò tanto più crescendo il concorso alle tinozze magnetiche di Messmer, e di d' Eslon, quanto più universale si rendette l'influenza delle società segrete, attesa la reciproca affinità delle medesime, e quanto più potentemente il nuovo sistema sembrava agire sull'immaginazio ne. 167. La fama del magnetismo animale s'accrebbe vieppiù nel 1783., allorquando Cour de Gebelin, censore reale e presidente perpetuo del museo di Parigi, che pretendevasi guarito col nuovo metodo, pubblicò nua lettera , dove non solo espone questa cura nel suo miglior lume . ma esalta altresì Messmer come un vero taumatuis go (3). Il dotto autore di questa celebre apologia morì tnttavia durante la cura, ma Messmer seppe disendersi sì accortamente, che quest'accidente non fece alcuna pregiudiziale impressione sopra i suoi partigiani (4). 7. Links to good of the addition of the factor

I TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

⁽¹⁾ Lettre de Figaro, p. 9. MESSMER peut donc continuer d'être un pauvre homme, mais il ne sera jemais un homme pauvre.

⁽²⁾ Lettre d'un mèdecin de la faculté de Paris à un mèdecin du collège de Londres à l'Haje 1781. 8.

⁽³⁾ Lettre de l'auteur du mond primitif à MM. les souscripteurs sur le magnetisme animal ed. II. Paris 1784. 4. Recueil des pièces p. 65.

⁽⁴⁾ Ivi p. 169-174. La sezione del cadavere ha dimostrato, che la morte di Court de Gebelin era avvenuta per disorganizzazione dei reni.

Nell'anno 1784. furono nominate par ordine del re due commissioni , la prima dalla società medica y la seconda parte dall' accademia delle scienze, parte dalla facoltà medica, onde prendere in più attento esame il magnetismo e le cure magnetiche. L' accademia delle scienze nominò membri della commissione Franklin. le Roi. Bailly, de Bory e Lavoisier; la facoltà medica Bovie, e dopo la di lui morte Majault , Sallin , d'Arcet e Guillotin ; e la società medica Poissonnier Desperrières ; Caille, Mauduyt , Andry e Jussien. Sembra , che queste commissioni avrebbero dovuto recarsi presso Messmer ed instituire le loro ricerche sulla di lui tinozza. Ma egli rifintò costantemente e. l' una e. l'altra commissione , non volendo giudici, ma testimoni delle sue cure. In oltre aveva fin allora riconosciuto per suo allievo d' Eslon , il quale asseriva d'essere stato iniziato ne'misteri del suo maestro e anzieliè aver difficoltà di ricevere una commissione : la desiderava. Le commissione adunque si rivolsero a d' Eslon e praticarono i loro esami sulla tinozza del medesimo; del che giustamente tutti i Messmeriani formano soggetto di accusa e di rimprovero contro i commissari.

I travagli e le iudagini intorno a questo argomento cominciarono nel mese di aprile del 1784, e continuarono per alcuni mesi. Frankliu, siccome indisposto, mon
no volle prendece la menoma parte, Jussieu mostrossi non
solo il più attento, ma altreà il più favorevole al nnovo
nuetodo. Il rapporto della commissione accademica non si
allontanava che psolissimo da quello della società medica, ma nondimento piacemi di qui accennatti unendue:

163. I commissari de l'accademia e della facoltà indicano fin dapprincipio, che le loro ricerche non si rife-

a water

riscono agli effetti accaduti in tutti gli ammalati nella stanza delle crisi (1). Eglino riputarono inutile l'osservazione degli effetti palesi; e per conseguenza si limitarono a fare alcuni separati esperimenti. Negano l'esistenza d'un fluido magnetico generalmente diffuso, perchè non si può convincersene immediatamente col mezzo dei sensi. Dapprima volevano sperimentare sopra se medesimi gli effetti del magnetismo sul corpo animale; ma si prefissero di non essere troppo attenti a se stessi , perchè ogni individuo anche il più sano, quando rifletta continuamente al suo stato interno, s'accorgerebbe di certe modificazioni nelle sue sensazioni. Furono dunque preparate nella casa di d' Eslon una stanza ed una tinozza a parte, dove una volta per settimana erano magnetizzati e durante lo spazio di due ore e mezza, dal medesimo d' Eslon o d' alcuno de' suoi scolari. Tuttay ia assicurano di non aver sentito giammai alcuna impressione, e che uno dei commissari affetto da emicrania non provò quindi il menomo alleviamento, non volendosi calcolare alcune leggerissime sensazioni. I fanciulli nou risentono, nè percepiscono veruna scossa o movimento. I commissari arguiscono, che questi effetti , qualunque sieno , debhansi attribuire all'immaginazione, perchè bendando gli occhi agli ammalati, e facenda loro credere d'essere intanto magnetizzati, essi pretendevano di provare le stesse sensazioni , come se si trovassero sotto una vera manipolazione. Siccome poi d'Eslon assetiva, che gli alberi magnetizzati agiscono sugli ammalati al pari della tinozza, i commissari fecero avvicinare un giovane bendato a degli alberi non magnetizzati, da lui

⁽¹⁾ Rapport des commissaires, charges par le roi, de l'examen du magnet, anim. Paris 1784. 8.

supposti g'à magnetiatati ; e di fatti si manifestarone nelmedesimo le crisi magnetiche. L'immaginazione e l'istinto d'imitazione sembrano formare la cagion principale dei fenomeni magnetici , oltre di che può influirvi la namiera del toccamento , della fregagione e della pressione di certe parti le più delicate e semibili. Laonde fu conchiuto, che il magnetismo animale è una chimera , e che le oure magnetiche, come effetti dell'immaginazione, possono riuseire sospette e talvolta ano pericolose.

Non differisce punto dal precedente il rapporto dei commissari della società medica (1), ma hensì quello che Jussien; uno di questi ultimi, ha voluto dare da sè a parte (2). Jussieu, cui gli stessi magnetisti encomiano come il più attento e paziente osservatore, divide i fatti in quate tro classi: 11 generali , dei quali non si può enunciare con precisione la vera cansa; 2. negativi, cioè contrari al magnetismo; 3. fantastici, cioè dipendenti soltanto, dall'immaginazione; 4. positivi, che presuppongono l'esistenza e l'azione d'un altro agente. Io non considererò che gli ultimi. Jussieu ad una persona cieca, seduta presla tinozza , avvicinò nu bastone di ferro all'epigastrio , ed eccitò per tal modo un' evidente inquietitudine , la quale svanì , tostochè fu allontanato il bastone di ferro e si rinnovò avvicinandolo nuovamente. Molte altre esperienze gli fecero inferire, che il corpo umano tramandi realmente un fluido che agisce sopra gli altri individui, e che

⁽¹⁾ Rapport des commissaires de la soc. royale de mèdicine, nommés par le Roi pour faire l'examen du magnètisme animal. Paris 1784. 8:

⁽²⁾ Rapport de l'un des commissaires, chargés par le Roi de l'examen du magnetis- anim. Paris 1784, 4.

rendesi sensibile, specialmente a quelli affetti di malattie nervose. Egli crede perciò di poter paragonare questo fluido coll'elettrico, e di ritenerlo pel principio vitale,

160. Di leggieri si può scorgere , qual romore mepar dovessero i rapporti sfavorevoli delle due communissiani fra i partegiani del magnetismo, tanto più che la società medica fece stampare da li a poco un estratto della di lui corrispondenza epistolare, relativamente al soggetto in quistione (t), dove le più importanti opposizioni alla teoria e al metodo di Messmer sono quelle di Steiglehner d'Ingolstadt , e di Van Swinden (2). Il primo a combattere la validità e la ragionevolezze dei due rapporti delle commissioni fu lo stesso d' Eslon, Eeli biasima primieramente d'aver rintracciato prove fisiche per l'esistenza del fluido magnetico, mentre nessua principio semplice della natura può venit rappresentata chiaramente a' sensi (3). Accusa dipoi i commissari di non aver continuato esattamente le loro osservazioni sugli ammaluti a lui affidati , poiche ne avrebbero veduto da se stessi molti guariti col suo metodo , quantunque osino dire, che auche la natura guarisce da sè sola sovente delle malate tie ; satterfugio, con oui si potrebbero riputare iautili tutfi i metodi alla stessa facoltà mediea, L'importanza d'o-

⁽¹⁾ Extrait de la correspondence de la soc. roy, de médecine, relativement au magnet, anim., par. THOURET. Raris 1985. 4.

⁽²⁾ Recueil de mémoires sur l'analogie de l'electricité et du magnétisme, vol. 1-3. à la Haye 1784. 8.

⁽³⁾ Observations sur les deux rapports de MM. lescommussaires, nommés par S. M. pour l'examen du magn. Paris 2784 4.

gai metodo di medicina non si puo riconoscere che dagli effetti. In oltre a torto affermano i commissari di non . aver percepita alcuna impressione; alcuni, segue a dire d'Eslon erano sani, ma il magnetismo non appalesa tutta la sua attività che sugli ammalati ; ed altri finalmente dovevano confessare, che quattro di loro hanno provata qualche sensazione. Se i commissari attribuiscono futto all immaginazione, converra sapere d'oude questa ripeter possa il primo eccitamento, ed ecco la necessità di ammettere l'afflusso di uno fluido magnetico. Finalmente accusa i membri della società medica d'un aperta contraddizione, mentre un anno prima Andry e Thonret hanno pronunciato in nome della società medesima l'esisten za d'un fluido magnetico universale (Sez. XVI. 5. 64.) Un altro critico anonimo sostiene, che i commissari pon happo istituito con esattezza le loro osservazioni, è che sono caduti in diverse contraddizioni (1). Le stesse mancanze furono riscontrate da un altro scrittore (2). Bongeloy forni una dotta e ragionata analisi d'ambedue i rapporti, indicando gli errori e le contraddizioni de commissari (3). Certamente quest' è la miglior produzione, che sia comparsa in difesa delle cure Messmeriane. Imperocche la raccolta delle attestazioni di cento e undici ammalati

⁽¹⁾ Observations adressées à MM, les commissaires de la 200, voy, de mèdec, només par le roi pour faire l'examen du magn, an Londres 1984, 8.

(2) Observations un le rapport des commissaires par G. C. col motto; E put si muorel Vienne en Austri-

⁽³⁾ Analyse raisonnée des rapports des commissaires

esposta nelle stanze d'Eslon, non imbarazzava tanto gli avversari, quanto la scoperta di evidenti contraddizioni e incongruenze nei rapporti medesimi (1).

E quale si fu intanto la condotta di Messmer? Egli protestò soleunemente contro tutte le conclusioni, che talano poteva dedurre dal giudizio dei commissari, sul metodo di d' Eslon, relativamente al suo sistema (2), E non pochi partegiani esaltavano pubblicamente i pregi delle pratica di Messmer in confronto di quella di d' Eslon. Infra gli altri un certo Hervier, dottore della Sorbona, scrisse una declamazione a savore di Messmer, e volle provare d'essere stato guarito da una malattia pericolosa, col mezzo del magnetismo animale (3). Ma un anonimo appoggiato a molte informazioni assicurò, che il dott. Hervier non è stato mai propriamente infermo, e che ha riportate molte altre falsità (4). La facoltà medica sollevossi contro la scuola di d'Eslon, e citò davanti a sè ventuno de' suoi membri, che avevano preso lezioni dal medesimo, obbligandoli sotto la minaccia di perdere la loro regence ad astenersi dalle magnetizzazioni; in che ubbidirono in fatti diciassette di loro per evitare ogni animosità. Uno però di questi lagnossi fortemente d'un procedere sì dispotico e crudele (5).

⁽¹⁾ Supplément aux deux rapports de MM. les commissaires. Amsterd. 1784. 4.

⁽²⁾ Lettre de M. Messmer & M. Vicq-d'Asyr et à MM. les auteurs du Journal de Paris 1786. 8.

⁽³⁾ Lettre à Mr. Court de Geneux sur la découperte du magn. anim. Peckin 1784. 8.

⁽⁴⁾ Massura blesse, ou reponse à la lettre du R.P. Merrier. Londres 1784. 8.

⁽⁵⁾ D' Eszon observ. sur les deux rapports pag. 26

170. Il Mesemerismo andò intanto diffondendosi ance per le provincie. Il marchese di Puisègur e suo fratello lo fecero conescere a Soissons, a Bajonna e a Bordeaux, stabilirono qua e là delle tinozze magnetiche e raccoglievano degli ammalati sotto le più fronzute ed annose piante. Le crisi, che ne risultavano, si appalesavano con un esaltamento delle facoltà intellettuali , e con una conoscenza straordinaria dello stato fisico di sè medesimi e degli altri. I magnetizzati venivano sorpresi , durante la manipolazione , dal sonno , continuando però ad udire e sentire tutto ciò che accadeva intorno ad essi, ed accorgendosi quasi quasi con un senso affatto nuovo, del loro stato interno. Per l'addietro non si conosceva punto una sì fatta situasione dei clairvo, ans , e soltanto dopo l'ingresso di Fuisegur, fu introdotta e risguardata qual parte essenziale delle cure magnetiche. Il march, di Puisègur pubblich fino dal 1784, una collezione di 62, storie di malattie (1), il di cui pregio puossi inferire dal seguente esempio. « Luia gi Crepin dell' età di 18, anni fu assalito ai 30. maggio « da febbre accompagnata da violenta cefalea. Egli moa strossi suscettibile delle crisi magnetiche fine dai primi « giorni della sua malattia, ma non si trovò perfettamena te ristabilito che in capo a sei settimane ». Il conte di Puisègur, fratello del primo diede pure notizia in quest'anno medesimo delle oure da sè operate a Bajonna ; e sostenne, come seppe, il magnetismo contro le obbiezioni

Rapport au public de quelques abus, auxquels le magn. an a donné lieu, par Thomas d'Onglée, doct. de la fuculté. Paris 1785. 8.

⁽¹⁾ Requeil des pièces les plus intéressantes sur le magnet anim. p. 316-365.

degli avversarj (r). Osciut particolarizzo le guarigioni magenetiche instituite, a Lione (2)44 Bergasse (3) y. ppi Galari de Montjoye (4), patrocinarono con nuovi argomenti la feoria Messmeriana a facendo vedere il primo , che i dotti amano di rimanersene nell'antica, periferia delle loro coguizioni, e di pesseguitare costantemente gli uomini di genio ; e scopendo l' altro le contraddizioni de' commissari. Pareculti, seguendo l' esempio di Jussicu, pretesero

di entrare in isceun come giudici impaziali del magnetismo. Un anonimo ausch e che potevanti ottenere gli stessi effetti con dei globi di zolfo e dei bastoncelli compesti di zolfo e di limatura di ferro (5). Regnard d' Amiens confermo una tole proposizione; e quindi Sausseller de la Tour immagino una teoria, edietro cui ripateva tutti gli effetti dall'elettricith (6). Un altro anonimo raccomando la maggior circospezione nell'applicazione del magnetiano, il quale, avvegnicche simedio per se stesso eccellente, su vantato troppo universalmente da Messuer, o da d'Eslon (7)». Ne mancò chi suppose doversi combinare la

(1) Rappor des cures opéries à Bayonne par le magn. anim. Bayonne 1784. 8.

(2) Détail des oures opèrées à Lyon 1784. 8. - Reétieil c. p. 469.

(3) Considerations sur le magn. anime à l'Haye

1784: 8. Anter sur le magn. anim. Philadelphie 1784: 8.

(5) Lettre de M. L. B. D. B. sur l'existence du magnetisme animal. Geneve 1754. 8.

(6) L'atni de la nature, ou manière de traiter les

maladies par le pretendu magnet. anim. Dijion 1784. 8.

(7) Examen serieux et importial du magn. anim.

Londres 1784. 8.

teoria di Borden col magnetismo, per procurare un fondamento a quest' ultimo (1). Anche Doppet , dottore della facoltà medica di Torino, appartiene alla classe dei giùdici imparziali del magnetismo (2). Egli , senza esaltare soverchiamente il pregio delle cure magnetiche o preferire il nuovo metodo alla solita medicina , confessa tuttavia . she ne risultano degli effetti sorprendenti. Segue poi a dire : il segreto venduto da Messmer per cente luigi d'oro à di tal natura , ce fa si che più dubita della sua attività chi lo conosce, che chi nol conosce. Nell' nomo la direzione principale del fluido magnetico dev' essere stabilita dalla terra allo zenit, considerando lo atomaco per comtore, e la midolla spinale per asse, Ciasoun organo offre una calamita particolare ; nel capo , nelle braccia , nelle gambe dapertuno evvi il suo equatore di il suo asse dil suo polo. La tinezza nen tramanda punto la forza magnetica ; essa non è ripiena che di vetro rotto e d'acqua ne il solfo la rende punto più attiva. Gl' individui seduti attorno magnetizzano piuttosto col loro influsso la tinozza medesima. Non si è per anco stabilito , se il magnetista al momento dell'operazione, debba rivolgersi verso i poli della terra. Le percezioni degli dinmalati ; quando trovansi nella crist i non costituiscono un fenomeno singolare ; perocche e ben naturale, che persone attacente da malattie nervose come odono continuamente a parlare di somiglianti indisposizioni, ne discorrano anche durante i loro parossismi. who among a con the T

171. Joerdens sembro dello stesso avviso; riguarde alle cure magnetiche da lui osservate attorno alla medes-

⁽¹⁾ Eclaireissemens sur le magn. an. Londres 17543.

⁽²⁾ Trattato del magnet anim. 1785. 8.

ma epoca nella città di Strasburgo , dov' erano due società magnetiche ; la prima fondata dal conte di Pnisègur ; la seconda dal dott. Ostertag (1). Quest' ultimo servivasi di globi di vetro, ai quali erano assicurate delle catene e dei fili di ferro ; e camminava sempre su e giù nella stanza della cura; ma gl'individui magnetizzati non appalesavano che una strana immobilità, la quale cessava immediatamente all' accostarsi del magnetista. Del rimanente Joerdens assicura , essere innegabile l'influenza d'un agente fluido, e forse d'una speciale modificazione dell'elettricità; mentre alle volte degl' individui sani e robusti , dopo lunghe manipolazioni , non risentono che un leggiero dolor di capo , un calor passeggiero ed una pressione allo scrobicolo del cuore. Una tale testimonianza di oggetto quanto perspicace altrettanto imparziale, non può a meno di riuscire sommamente importante, e sembra anzi contemplare il magnetismo nel suo vero punto

Ma con quanta impostura e fanalismo sonse alloza insegnato ed eservisto il magnetismo, apsecialmente nella senuola di Ralon, rilevaria apertamente chaglia sforimii di Messmer pubblicati da Coullet de Veaumorel, e dettati dallo stessond Rolos (3). I principi della fisica generale, e che vengono premessi, sono confinai e stravaganti al pari delle proposizioni fisiologiche. Ecco una spiegazione delle osganizioni d'uno che fu magnetiratto durante la crisi, V'ha nell'umo un sense interno, che si riferisce a tupso l' universo, e che si appalesa specialmente nel sona-

⁽¹⁾ HUPELAND, Giornale di medicina pratica, vol. IV. fasc. 2. p. 85-95.

⁽²⁾ Aphorismes de M. Messnier ed. III, Paris 1785.8.

magnetico. Quest è l'istinto dell'uomo e degli animali, la conseguenza dell'armonia e dell' ordine universale della natura; e le congnizioni nate da si fatto istinto debbono essere preserite alle intellettuali e studiate. I sonniloqui magnetici veggono e sentono tutto mediante questo certo senso, quando anche tutti gli altri rimangono inattivi. Nell'appendice viene assai esaltata la forza della volontà e della credenza, e si paragona con molta schiettezza il maguetista, durante la sua operazione, ad un montone che dorme. Fu altresì proposto uno stranissimo spediente, per ricuperare gl'individui colpiti di morte apparente, e consiste nell'interrarli sovrapponendovi delle pietre ben pesanti, onde il fluido universale, mediante la gravitazione, possa meglio effettuare il ravvivamento. Basterà soltanto lasciarvi un piecolo pertugio, acciocchè seguito il ravvivamento medesimo, la respirazione non incontri il menomo ostacolo.

172. L'esaltamento prodigioso delle facoltă intellettuali del magnetizată; per cui esi penetravano nel più
satimo stato di loro medestimi e degli-sătri, e presagivaso
le cose future, fu sempre più risguardato nelle ceuole secoinduite del Messmerismo, come uno dei priegi principali
i riddispunsabili del magnetismo. Il marchese di Putsigur,
fondatore di molte scuole magnetismo per le giovani,
pubblirò nel 1786. alcune osservazioni sulle cure portentese da lui eseguite (1), ed ansunciò il presentimento
degli ammalati qual punto essenzialissimo delle crisi maguetiche. Messmer non s' avvide di quasto fenomeno, perchè le sue distrazioni e le sue facende non gli permette

⁽¹⁾ Mêmoire pour servir à l'histoire et à l'établissement du magnet, anim. Londr. 1786. 8.

vano di osservare con tutta l'esattezza. Le convulsion. non appartengono alla classe degli effetti magnetici ce sono preternaturali, e nocive. Tostochè cessava ne' suoi ammalati il dono profetico o intuitivo, il taumaturgo, rimaneva convinto della guarigione. Egli però continuò a magnetizzare sotto, gli alberi, e a biasimare, le stanze delle crisi e le tinozze magnetiche. Il cav. Barbarin , che si annunciava come scolare di Messmer, non riconesceva alcun agente del magnetismo, fuorche la volentà e la fede (1). Egli stabili anche in Ostenda una società armonica, dove soltanto cella ferma disposizione, colla volontà decisa e coila preghiera si cerco di comunicare all'acqua un gusto gradevole, e di produrre nelle maggiori distanze tutti gli effetti del magnetismo. Si osò perfino spiegare i miracoli di Cristo col magnetismo di Barbarin, la di cui setta adottato aveva la seguente formola di benedizione o d'iniziazione: Feuilles le bien, alles et guerises!

Delle stesso calibre sono le esservazioni coptenute ne giornale della sesicità armonica fondata a Steaburgo, da Paisègur (a). I membri più regguardevili della medasima erano, un certo conte di Laucelburgo, cun certo bacone di Klinglin, il prof. Ehrmann e il dott. Richter. I dettagli del sonniloquio, dei magnetizzati e delle prescrizioni ollessi del sonniloquio, dei magnetizzati e delle prescrizioni ollessi

⁽¹⁾ Systeme raisonne du magnetisme, universel, d'après les principes de M. Messuen, Par la son de l'harmoniq d'Ostende. Paris 1786. 8.

⁽²⁾ Expose de différentes cures opèries depuis le a5 d'août 1782, jusqu'au 15, juin 1786, par les membres de fa soon harm. Strusturg. 1786, 8. - Suite, des eures faites par differens magnétiseurs, Lecais. 1797, 8.

debboco seguire ; obtreche estrenamente stucchevali per se stessi, non differiscoso punto da quelli ripetute più velte da Puisègur. Il conte Luttelburg (sece dipoi stampare una longhissima e telicinisma marratura delle produzioni, dei discorsi mirara vosì, e delle proposizioni sublimi di una sonuamboto megnetico (1).

Tardy de Montravel, capitano francese; immagino via mutova teòria del solunioquio maguettico (a). Egli ammette per cagione di à fatto fenomeno lo sviluppo del testo-senso interno, cioc dell'animia materiale dell'uonio; stabilisce la sede di questo senso nel ventricolo, ed affanticlla un infinità di spotesi sul modo; onde i sonumano sestella un infinità di potesi sul modo; onde i sonumano estella un infinità di potesi sul modo; onde i sonumano de via consultativa de consocere lo stato fisico degli altri individui. Lo stesso serittore pisticolarizzò pure one ha severchia prolissità de finatchicherio di dee chiaroreggenti; uno dei quali pretendeva di scorgere stella tenia esistente stelle intestina d'un ammalato le ossà , gli occhi, la bocca e i denti; ed il secondo cercava d'introdurre nella partologia innumereroli è duove specie d'ostrusioni (3).

173. Nel 1687. Il magnatismo di Paisègue andò propagandosi anche per la Germania. Il cel. Gio. Gasp. Lavater fece conoscere il nuovo metodo a Bicker, Olbers, e Wienholt medici di Brema; riquali, in ispezialità Wies-

⁽¹⁾ Extrait des journaux d'un magnètiseur, attaché à la soc. des amis réunis de Strasbourg 1786. 8.

⁽²⁾ Essai sur la théorie du somnambulisme magnetique. Londres 1786, 8.

⁽³⁾ Journal du traitement magnetique de la dem. N.

10. 1.12. Londr. 1786. 8. - Journal du traitement ma gnétique de mad. Braun. Strasb. 1987. 8.

holt, divenmero relaqui difentori del medesimo (1). Quent' ultimo diede alla luce un saggio, d'esperieuze sul maguatismo animale, che danno a dividere, quanto influscano le crisi magnetiche ad occasionare un singolare esaltamento delle facoltà intellettuali, ma non metteuo assolutamente fuori d'ogni dubbio gli effetti salutari del magoetismo (2).

Un certo d'Inarre, avvocato del parlamente e famoso ciarlatano, percorse con una giovina sonnambola alcuni paesi lungo il Reno, e si trattenne qualche tempe a Spira, operande ivi dei prodigi magnetici. Ma gli levò hen presto la maschera Fraecesco Enr. Brinstiel (3). Nà altrimenti accade, mercè le opposizioni di C. L. Hoffmana, a G. Fed. C. Piohler pseudo-magnetista, che si ritirò a Magonsa, dopo d'essere stato disenciato dalla società di Strasburgo (3). Un membre anonimo della medesima 'accinse a difendere l'impostorà dei Puiseguristi e dei Barbarinisti, e a far oredere, che il taumaturgo Gassare resse stato il Maestro di Mesmer (5). Ma sopratututo triconfò il faqatismo negli oracoli di un sonnambolo, che vi-

⁽¹⁾ Magassino magnetistico per la Germania. Fasc. 1. - 8. Brema 1787. 1789.

⁽²⁾ Saggio d'esperienze sul magnet, anim. Amburgo 1787. 8.

⁽³⁾ Notisie e documenti per iscoprine i segreti del così detto magnetismo animale. Marburgo 1787. 8.

(4) Il magnetista, Francf. e Magonzo 1787. 4.

Avviso ai magnetisti 1787. 4. - Il vero magnetista, di G. F. C. Pichler, Francf. 1787. 8.

⁽⁵⁾ L'osservatore del magnetismo animale e del sonnambolismo di A. U, Strasburgo 1787. &

dero in questo aono la pubblica luce (1), dore viene è nunciato l'infelletto come peregativa animale, attribuita ogni forsa ed asione ell'istinto e alla volonta, e spiegato perfino il ministero dei Platoniel moderni fintorno alla trinità. Anche un certo Osvaldo, che vivera con distinsione alla corte di Pederigo Guglielmo II., portò in campo simili fantatsicherie della luce interna, qual fondamento di cognizioni, della fede qual sorgente unica di tutti i rimedi, e della sapienza sovranaturale di Jac. Bom. (2). Nella Svezia poi formossi una società filantropica, onde conciliare le birtarie di Swedemburgo colle magnetiche (3).

Più ragionevoli e fondate riuscirono le ricerche di Eber. Gmelin (4), e di Gio. Lor. Boechmann (5) intorno al magnetimo aoimale, avvegnachè il primo abbla costantemente appalesata una somma propensione a questo genere di fanatismo. Anche Dan. Rahn e Jac. Grist. Scheri accordarono ad effluty i guoti del corpo animale una considevole influenza sulla simpatia e antipatia (6), e Petetin,

(2) PANAX ossia delle cause fondamentali delle malattie e della loro guarigione. Breslavia 1787. 8.

⁽¹⁾ Estratto delli prinale d'una cura magnetica.
France, e Lipse inno 8.

⁽³⁾ Lettera sul magnetismo animale. Halla 1783. 8.
- Lettere sui fenomeni del sonnambulismo e magnetismo animale. Lipsia 1788. 8.

⁽⁴⁾ del magnetismo animale, fasc. 1. 2. Tubinga 1787.8.

⁽⁵⁾ Archivió del sonnambulismo e magnetismo animale, fasc. 1. 8. Strasb. 1787. 8.

⁽⁶⁾ Lettere sulla virtà medicinale del magnetismo animale, fasc. 1. 2. 1787. 1788. 8.

prof. di Lione, derivo de conseguenze magnetighe parte dalla forza delle fontasia e parte dall'impressione che il finide elettrico escretia sullo stomese (1). All'incontre Criss. Meiners (2), Gugl. Josephi (3), Cisti. Goffir. Solle (4) in un con parecchi altri scrittori Tellevel', attributioni qualis soltanto all'immagnizazione e al toccumento motali od degli organi più sensibili quegli effetti, che sono stati attributti per l'addiere al magnetismo aminale.

Mart 1000 de gran est e met antre accepted à eq pàrate. El color est en constant en accepted est en accepted e

The DEL TONO FELTOR. The second of the secon

The state of the state of the section is a second



- (1) Mémoire sur la decouverte des phénomenes ; que présentent la eatalepsie et le somnambulisme 1788. 8.
 - (2) Del magnetismo animale. Lemgo 1788 20: 1 vo
- (4) Gazzetta medica di Berlino. Novembre 1789 p. Febbrajo 1796. p. 147.

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE NEL TOMO VI.

| Continuazione della Sezione XV. | - R |
|--|-------|
| I. Irritabilità Halleriana p. | r |
| II. Nuove teorie intorno a nervi | 40 |
| III. Materialismo, chimico, de' moderni | 68 |
| SEZIONE XVI. STORIA DELLA SCUOI | 4 |
| EMPIRICA DE TEMPI MODERNI | |
| I. Ippocratici posteriori II. Circostanze favorevoli alla propaga | 74 |
| zione delle scuole empiriche | 86 |
| III. Oggetti delle ricerche empiriche | 00 |
| | |
| A. Esperienze intorno a' medicamenti en | |
| agli umori animali | 152 |
| | - 156 |
| b.) Medicamenti minerali | · 186 |
| e.) Applicazione dell' elettricità | 213 |
| B. Osservazioni sopra malattie di | 15.15 |
| a.) Epidemie e malattie nuove | 231 |
| b.) Diversità delle malattie relativamente | |
| a' climi | 300 |
| | 306 |
| c.) Anatomia patologica | |
| Semiotica patologica | 312 |
| e.) Nosologia | 326 |
| C. Storia dell'inoculazione del vajuolo | |
| a.) Prime tracce dell' innesto vajuoloso | |
| in Europa a fuori | 23. |

b.) Perfezionamento e vicende dell'inoculazione da Maitlant fino a Gatti, cioè dal 1721. fino al 1760 c.) Vicende dell'inoculazione dal 1760,

c.) Vicende dell'inoculazione dal 1760.
al 1790.

IV. Taumaturgia medica , e Ciarlataneria 379

AVVISO

Dall' Editore della presente opera si stà pubblicando l' Atlante Anatomico, ossia una collezione delle migliori tavole anatomiche de' più celebri autori, e proprie L'associazione è aperta fin dal mese di Gennajo 1827. Si dù un fascicolo il mese, composto di tre tavole, due delle quali miniate, al prezzo di carlini dodici. Tutta l'opera che conterrà 120 tavole, sarà portata a termine fra 32 mesì. Per i primi 200 associati la spiegazione de' rami è gratis: gli altri pagheranno grami cinque per ogni fogico stampato in carta regale.







